





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2434/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2434/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2434/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2434/A

2434/A
A. XXIX. Fac

The Earl of Westmoreland
1856

146 A

~~63 A+2~~


29458

1 B. 15

autograph d

W Bullen on title

payne
12/1/10



LEONHARTI FVCHSII DE
MEDENDI METHODO
LIBRI QVATVOR.

29458

HIPPOCRATIS COI DE MEDI-
CAMENTIS PVRGANTIBVS LI-
BELLVS IAM RECENS IN
LVCEM EDITVS.

W.



Bncler

-157

PARISIIS
PER CONRADVM NEOBARIVM.
M. D. XXXIX.

Cum priuilegio in biennium.

to mad gonbon

2
ILLVSTRISSIMO PRINCIPI

AC DOMINO ALBERTO MAR-

CHIONI BRANDENBUR-

gensis, stetinæ, pomeraniæ, cassu-

borû, & sclauorû Duci, burg-

grauius Norimbergen.

si, ac Rugiæ prin-

cipi, domino suo clemen-

tiss. Leonhartus

Fuchsius,

S. P. D.

INNO ABHINC VNO scribēdi

Illustrissime princeps, id ip- metho-
sum à me studiosis quibus dum hāc
dam efflagitantibus, meden- occasio.

di quandam rationem per-

breuem admodum conscripsi: non in hoc sa-
nè, vt Galeni quos ea de re posteritati reli-
quit optimos ac absolutissimos, aliorûque
Græcorum commentarios medicinę initiatis
de manibus excuterem: siquidem hoc insti-
tuto quid absurdius ineptiusque aut dici aut
excogitari posset? sed vt iis qui prolixitate ac
difficultate operû Galeni reliquorûmq; Græ-
corum deterrētur, & hoc nomine ad Arabes
atque ineptissimam barbarorû medicorum
turbam deficiunt, consulerem, ac quasi viam
ad Galeni, qui ceteros omnes superauit, scri-
pta facilius assequenda struerem nihil enim

ã ii

æque optamus, atque ut iis nostris commen-
 tariolis adiuti melioris medicinæ studiosi,
 gradū faciant ad ea cognoscēda, quæ plenius
 de curandi ratione Galenus tradidit. Perspe-
 ctum nāque habemus, quā pauci admodū
 sint hodie medicinam exercentes, qui ex Ga-
 leni, optimi sanè authoris, præscripto curādi
 indicationes scrutentur, quū vnusquisque fo-
 re sibi peculiarem quæ in medendo sequatur
 auctorem, cūque nō raro pessimum, propo-
 nat: hūcque sic mordicus teneat, ut ne latum
 quidem vnguem ab illius decretis discedat.
 Qua quidem ratione fit, ut quāplurima quo-
 tidie errata inter medendum admittant, qui
 sincero iudicio destituti temere quosuis se-
 ctantur quæ facile declinarēt, si ex Galeni ma-
 gis quā eius farina indoctorum hominū
 sententia & consilio ægrotis mederi vellent.
 Proinde ut tandē ab errore suo ac temerario
 instituto deducerentur, atque ad eō ad frugē
 bonam redirent, neque haberēt quod subin-
 de desidia suæ & ignorantia prætenderent,
 hanc medendi rationē ex Galeni, & hūc ma-
 gna ex parte sequentiū Aëtii & Pauli monu-
 mentis cōflatam, edere voluimus. Speramus
 enim illam his qui ad veterū medendi ratio-
 nem propius accessuri sunt, adiumento, & ut
 Græci dicūt *πρὸ ὁ δὲ*, futuram esse. Nam ut
 hanc penitus attingant, utcunque etiā anni-
 ratur, hoc præsertim tēpore, fieri minimè po-

test. Quum enim veterum curandi ratio duabus potissimum rebus constet, nempe Preceptis, quæ vnde curandi indicationes petendæ sint, monstrant: ac morbos pellētibus medicamentis, eam quidem quæ indicationes docet, hac etiam tempestate perfectissimè consequi licebit: alteram verò, que medicamēta inquirat, nequaquam. Multa enim cū simplicia tū composita, quibus illi in profligandis morbis vti, esse constat, quæ omniū quotquot hodie viuūt, cognitionem subterfugunt, atque adeò in vsum reuocari haud possunt: ita ut necessitate quadam compellamur, loco illorū nostratib⁹ & vſitatis, iis maximè quorū & formæ & facultates nobis cognitæ sunt, vti. Quod sanè mecū ipse reputans, veterū medendi rationi semper eā etiā quæ hodie vſitata est, quoad eius fieri cōmodè potuit, in iis meis de curādi ratione cōmētariis cōiunxi. Qui enim has temerè separāt, haud dubiè omnia perturbāt, ac cœlū terrę miscunt. Quod itaq; ad curandi indicationes attinet, veteres & Græcos planè imitatus sum, quòd illi eas p̄ ceteris omnib⁹ rectissimè tradiderin. Quare uemo miretur, q̄ ab Arabū ac recentiorū practitorū, ut vocant, placitis multis in locis discefferimus. iudicio enim idipsum, nō errore factū. Nā cū hoc planè nostrū sit cōsiliū, ut rerū medicarū studiosos à barbaris & ineptis autoribus ad optimos, atq; adeò eos qui pri

Veterū
medendi
rationem
hoc tem-
pore exer-
ceri pro-
sus non
posse.

2. Aph. 6

Medico-
tū nostri
seculi blā
ditæ no-
tantur.

stinā medēdi rationem syncerissimē docēt,
reuocem⁹, studio ac data opera eas quas illi
præscribunt curandi indicationes, vtpote er-
roneas, & à veritate prorsus abhorrentes con-
tempnimus. Pleraq; etiā ex Galeni & reliquo-
rum Græcorum sententia, quæ nemo ferē no-
strorum medicorū vsurpare audet, etsi cum
magna laude & ægrotantiū salute illis vete-
res vsi sint, inserere studuimus, vt hac ratione
nostros etiam, quo iisdem confidentius vte-
rentur, inuitarē. Nam cū tantoperē ab iis
quibus veteres feliciter vsi sunt, abhorret, sit
vt itereā paucos, imō propē nullos, magnos
morbos curent. parum certe memores illius
Hippocratici, summis morbis summa exqui-
sitē remedia optima esse. Neq; interim etiā
animaduertunt, quā malē passim ob illas
suas blanditias ac assentationes audiāt: quōd
scilicet mācipiorum ritu, vt Galenus inquit,
contra planē quā veteres illi medici ab Ae-
sculapio oriundi, qui tanquam duces militi-
bus, & reges subditis imperare ægris volue-
runt, egrotis pareant & obsequantur. Verū
metum hunc haud dubiē inscitia, qua prædi-
ti sunt, incutit. neq; enim illis expostulanti-
bus actorum suorum rationē reddere valēt:
tam sunt prosus omniū eorum quæ tradunt
Galen⁹ & veteres medici Græci, ignari: adeo-
que malunt cum multis temerē errare, quā
veterū probē excogitatis remediis vti. Cæ

terum quod ad alteram partem, quae medica-
 menta docet, spectare videtur, ea tantum in iis
 de medendi ratione libris produximus, quo-
 rum hodie est in officinis frequens usus, &
 quibus nos saepe, idque non sine magno egro-
 rum comodo, uti sumus. Quapropter usitata
 & cognita officinis vocabula, parum tamen
 latina interdum admiscere coacti sumus, ne
 si latinis perpetuo uteremur, ab iis non intel-
 ligeremur. vnicum tamen cauimus exotica, pre-
 ciosa, & paratu difficilia medicamenta: quod
 plurima illorum, eo quod neque illis qui ven-
 dunt, neque etiam iis qui emunt, satis cognita sint,
 adulterina esse verendum sit. Mercatores etiam
 in iis extrudendis (tanta est illorum insatia-
 bilis avaritia) maxime student, ut primum de-
 teriora vendant. quod dum faciunt, interea
 etiam quae bona sunt, diutius retenta, carie ac
 vermibus exesa, deteriora euadunt. Pharma- Pharma-
 copolae autem penes omnes, non minus quam copolae
 illi, quaestui inhiantes, ac pecuniam parce & notantur
 restricte erogantes, non nisi pessima emunt.
 Et quum etiam in hoc genere reperiantur vi-
 ri aliquot boni, tamen quia magna ex parte
 indocti sunt, & meliora ignorat, usitata dun-
 taxat, quae ut plurimum adulterina sunt, ad
 conficienda medicamenta sua comparant.
 Quapropter stolidorum & indoctorum me- Medico-
 dicorum consilium probare non possum, qui rum quo-
 in exercenda medendi ratione nullis fere me- rundam

huius etatis stoliditas. dicamentis, nisi ea quæ illorum compositio-
 nē constituunt à quatuor orbis partibus pe-
 tita sint, vtūtur. Neq; enim intelligunt, quàm
 periculosum sit ea vsurpare medicamēta, quæ
 nec ipsi, nec qui eadē vendunt ac præparant
 Sepiasarii satis perspecta habeant. Quòd ve-
 rò illis vtantur, non fit alia ratione, nisi quòd
 eos autores à quibus in medendo toti pēdēt
 vsos esse vident: non magnoperè laborantes
 qualia sint, aut vnde allata. Qui igitur sapiūt,
 nostratibus, & paratu facilibus, cognitisque
 potius quàm peregrinis, paratu difficilibus,
 & incognitis vtentur: quod eorundem, quem
 in abigēdis morbis obtinent, effectus, vt ple-
 runque est exoticum, dubius esse non pos-
 sit. Quod nō eò dico, quasi peregrina & aliū-
 de ad nos delata medicamenta in vniuersum
 omnia ex officinis extermināda putē: in quo
 sanè errore malefanos quosdam nostri seculi
 medicellos versari compertū habeo: cū mul-
 ta sint eiusmodi, quibus etiam si nostratia sin-
 gula perspecta haberem⁹, carere sine magno
 ægorū incommodo non liceret. qualia sunt
 aloë, casia fistularis, myrobalani, scāmonia,
 & id genus non pauca. Sed eorum duntaxat
 damnamus studium, qui cōtemptis nostrati-
 bus propè omnibus, ea tantum vsurpant, quæ
 planè exotica sunt, & neq; ipsis, neq; aliis co-
 gnita. Memini enim me aliquot nostri tēpo-
 ris medicorū, qui in magno habebant precio

vidisse cōpositiones ex eiusmodi medicamē-
tis cōcinnatas, quorū nuda solummodo ex-
tarent nomina, atq; adeò quę nec ipsi, nec Se-
plasiarii nouissent, aut vnquā vidissent. Nec
cur id facerent potui satis diuinare: nisi fortē
ambitione ducti, ceteris quòd peregrina &
nemini nota proferrent, doctiores videri vo-
luerint: aut hac ratione cauere, ne suis alii
quoq; in medendis ægris vterētur. Quid mul-
ta? exoticis ac preciosis parcē admodū vten-
dum esse, neque tamen omnibus, sed iis dun-
taxat quæ nobis iā multo vsu & experientia
cōprobata sunt, iudicamus. Atqui cōstat ple-
rosque esse, qui vtcunque etiā sæpiusq; moni-
ti, in viam redire nolint: quos certē non ma-
gnoperē curamus. Neque enim illis hęc me-
thodum exarauimus, sed iis potius qui cādi-
do animo ad veterē medēdi rationē aspirāt.
Dignū siquidem est, vt qui veritatis lucē in-
tueri dedignantur, in perpetua errorum cali-
gine detineātur. Tibi vero colēdissime prin-
ceps, duas potissimū ob causas hos meos de-
dicatōis cau-
medēdi ratione libros dedicare cōstitui. Pri-
mū, quòd illis ex nominis tui auspicio & cla-
ritate nonnihil autoritatis & gratię accedere
posse sperē. Quis enim est qui nesciat, quām
Marchio
celebris, quāmque nobilis sit Marchionū Brā-
nū Bran-
denburgensium apud omnes nationes fami-
denburg-
lia? neq; id sanē alio nomine, quām ob mul-
nobilis fa-
tas, casque egregias virtutes, & res domi mi-
milis.

litiaque prudenter & feliciter gestas. Nam
 ut reliquis præteritis à proano tuo, à quo tibi
 Albertus nomen inditum est, exordiar, quis vnquam
 Marchio Principum illo prudentior, & ad res bene ge-
 Elector. rendas aptior ac fœlicior? quis denique fa-
 cundior? quis constantior? quis bellicosior?
 Hincque adeò factum est, ut a Pio secundo
 Pontifice Romano, viro eximio ac doctissi-
 mo, mirificè laudatus sit, atque Teutonicus
 Achilles dici meruerit. Sed missas facio alias
 multas & insignes illius optimi Principis
 virtutes: quas si singulas commemorare vel-
 lem, vereor ut epistola capere possit. Ad autē
 Frideri- itaque tuum olim clemētissimum Principem
 chus Mar venio, quem etiam ob singularem belli peri-
 chio. tiam, aliásque multas cum corporis tum ani-
 mi dotes Maximiliano, prudentissimo ac o-
 ptimo casari, constat fuisse charissimum, ad-
 eò ut illius ductu bella quàm plurima non so-
 lum in Germania, verum etiam Italia fœlici-
 ter gesserit. Nec à suis maioribus degenera-
 uit parēs tuus charissimus, Cassimirus, Prin-
 Marchio ceptus propter singularem prudentiam, animi
 Cassimi- moderationem, rerum denique bellicarum
 rus. mirificam peritiam, diutinumque vsum lon-
 giori vita dignus. Hoc enim superstitē, vix
 vnquam Turca immanissimus Christiani no-
 minis hostis Vngariam sic totam inuasisset
 atque occupasset. Neque enim dubitasset se
 (tanta erat illius magnanimitas, & rebus etiā

penè desperatis constantia) viribus eius quā-
 tum vis magnis ac potentissimis Cæsarum
 adiutus auxiliis, opponere. verum è medio
 sustulit deus Opt. Max. tantum Heroa, quo
 Turcæ ministerio nostra delicta grauius pu-
 niret. Quid hic de patruo c. r. duce Borus-
 siæ referā: verum de hoc præstat nihil quàm
 pauca dicere. Tantæ enim illius Principis
 sunt virtutes, vt absolutum aliquod optimi
 principis exemplar, quod tu in primis, ali-
 que omnes principes sequi deberent, dici
 queat. Quū itaque is sit vestræ familiæ splen-
 dor, quī fieret vt patrociniū tuo freti ii no-
 stri labores, non aliquam apud studiosos ini-
 rent gratiam? Dein has meas vigilias c. r. nū-
 cupare volui, vt aliqua saltem ratione ani-
 mum, studium & voluntatem erga te meam
 declararē. Nam etsi, vt olim tibi assistere quo-
 tidie, exclusus locorum interuallis, haud pos-
 sim, tamen non minor est quàm cum præsens
 essem amor erga te meus. Neque enim non
 possum te summè diligere, si virtutes quas in
 te fitas esse perspectum habeo, mecum expē-
 do. Siquidem vt ameris ab omnibus, facit im-
 primis immensa illa humanitas, quæ in te
 puero adhuc elucebat, & quam quisque ipso
 etiam statim conspectu, nedum congressu
 animaduertebat. Nulla enim res est quæ si-
 bi non solum subditorum, imò aliorum
 etiam omnium animos ac benenolētiam sic

Albertus
 Marchio
 dux Bo-
 russiæ.

Humanitas.

Christo-
phorus
Pistorius

conciliat, ac ipsa humanitas, lenitas, & mansuetudo. Quapropter in principe vnice detestanda est inhumanitas, vt quæ efficiat, vt à cyclope illo Homérico non multum absit, & confestim inuidiam comitem habeat. Humanitatis nanque opinione amissa, pro monstro planè ac portento habetur: vtcunque auro gemmis, & serico ornatus incedat. Sed præstat nunc alias tuas virtutes prosequi, quãdo omnibus constet, Marchiones Brandenburgenses comitate reliquos omnes Germaniæ principes superare. Inter plurimas verò alias primum occurrit nobis immensa tua & in Deum & in homines pietas, quam olim dum viueret Christophorus Pistorius, vir ob præcipuam eruditionem perpetua memoria dignus, animo tuo magno studio instillauit. Quæ vta sanè certissima testis est, animum tuum à crudelitate & tyrannide alienissimū esse, ad ignoscendum vero promptissimum. Huic accedit, quòd æquitatis sis amantissimus, neque vt multi hodie solent principes, minus in delicta potèrum ac diuitum quàm infimorum ac pauperum esse animadaertendum putes. Neque omittendum hoc quòd animum tuum, non contentus generis maxima nobilitate, humanioribus etiam literis excolere volueris: in quibus consueque prouectus es, vt subinde ad historias, quæ te indices magis atque magis oblectabunt, atq; simul

instruent, per otium respicere queas. neq; dubito quin in studiis maiores progressus facere voluisses, nisi breui admodum tempore binos tibi præceptores fata ipsa surripuissent, utcumq; vero impeditur studiorum tuorum cursum prout institueras absolueri haud potueris, nihilominus tamen doctos maximo favore prosequeris, cosq; vnice colis: ductus haud dubie quorundam sapientissimorum principum exemplo, quos vides doctrinæ amore & conseruatione illustrius nomē quam finium ditionisque imperii propagatione sibi peperisse. Verum ut tandem laudandi finem faciam, mitto multas alias tuas excellentes virtutes, ne illas adulandi, magis, quam reliquos ad easdē excitandi studio commemorasse videar: atque hoc vnum monco, ut pergas subinde constanter amare doctos, tueriq; aduersus sycophantas studia ipsa: nec vnquam ab hoc laudatissimo instituto pestes illas aulicas, immenso in omnes doctos odio flagrantes, te auocare sinas: nec committas vnquam, ut sirenibus istis, utcumq; suauiter canentibus, aures accommodes: sed doctorum & prudentium potius usus consilio, imperii tui habenas gubernas. sic enim non solum stabilietur tuum imperium, verum etiam apud posterum omni prorsus inuidia carebis, ac celebri fama vere illustris euades. Accipe igitur, illustris princeps, solitam clementiam nostras has vi-


LEONHARTI FVCHSII


gilia, atque ex iis salubria praecepta ad pro-
figandos morbos excerpe, quo salubriter vi-
uere queas. Dignissimus etenim es non modò
prospera, sed constanti & etiam perpetua
bona valetudine, ut amplissima tuae
ditioni diutissime praesse, ac
Christianae reipublicae
prodesse queas.

Vale.

Tubingae, x i i. Calend. Iulii. Anno

M. D. XXXIX.





I
LEONHARTI FVCHSII DE
MEDENDIS SINGVLARVM
corporis partium à summo ca-
pite ad imos vsque pedes
passionibus, Lib. I.

DE ALOPECIA ET OPHIASI. CAP. I.

AΛΩΠΕΚΙΑ passio est, quæ
Latinis Alopecia dicitur. Fit
vbi in capite arceæ deciduus
capillus efficit. Sic appellatam
hanc passionem ferunt, quod
vulpibus frequenter accidat. Siquidē αλωπηξ
Græcis vulpes est. ὀφίσις nomen latinum
non obtinuit: passio est, quæ capitis partem
læsam serpentis modo, quæ Græcis ὀφίς est,
glabram ostendit. Arabes & Barbari medici
primum passionis genus voce parum depra-
uata Alopiciam, alteram vero Tyriam vo-
cant: qua voce omnes serpentes, potissimum
autem viperas, intelligunt. Vtrunque genus
propter vitiatos humores contingit. Quem-
admodum enim plantæ aliquæ ob humoris
alieni ab ipsarum natura attractionem: sic
etiam capilli propter humorum, ex quibus
nutriri consueverunt, prauitatem corrumpun-
tur. Quales autem sint vitiatii humores, scendorū
ex colore cutis capitis dignoscet. Aliquibus succorū
enim mutata albidior apparet, aliquibus ni- notæ.

grior, aut pallidior. Candida pituitam, atra melancholiam, pallida bilem flauam significat. At vitiosi humoris speciē certius agnoscendam, non leue etiam adiumentum præcedens victus ratio cōferet: præsertim intelligenti, quānam ciborum pituitæ, quānā atræ bilis, & flauæ succū colligant. In primis itaq; totius corporis purgationē adhibere oportet, aut pharmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilem flauā aut nigram trahit, coniectura redundantis humoris, vt diximus,

Curatio. ex colore cutis facta. Nā si is albidior, quā pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationē exhibebis: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem: nō secus atque si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahent bilē, offeres. Pituitosos humores Hiera ex colocynthide purgare consuevit, quam describit Paulus lib. 7. cap. 8. sub nomine Hieræ Archigenis. Hiera etiam simplex, quæ lib. 7. Ther. meth. & lib. 2. de Compo. medi. secundū locos cap. 1. à Galeno describitur, mirifice confert: aliquando elleboro nigro adiecto, vbi atræ bilis humorem expurgare volueris: aliquando scammonia, si flaua bilis purganda erit. Quin & ex aloë catapotia commodè sic patientes purgare solēt. Habent autem hæc, colocynthidis partem vnā, aloes & scammonia vtriusq; partes duas, cum succi absinthii parte vna: cōficiantur ex drachma vna cata-

Purgatio

Catapotia ex aloë.

potia vndecim, & deuorāda præbeātur. Vſus hodiernis dieb⁹ Hierę picrę triplex eſt. primus, ſub ſpecie pulueris in vino aut iure galinaceo, aut alio conuenienti liquore aſſumpti. datur ex pharmaco hoc drachma vna. Alter ſub forma catapotiorū, qui tritiſſimus eſſe ſolet. Tertius ſub eclegmatis ſpecie, quod etiā in officinis præparatū habetur. Cæterū poſt totius corporis purgationem apophlegmatifinis, maſticatoria hodie vocāt, pituitam ē capite detrahẽ præſtat. Hęc autē ex ſinapi, hyſſopo, ſtaphyſagria, pipere, origano, pyrethri radice, cubebis, & ſimilibus cōficiuntur, in hūc vel ſimilē modū. R̄ Piperis longi, nucis myriſticę, muſcatā appellant, añ 3 ſ. ſc. ſtaphyſagrię, pyrethri añ 3 ii. ſinapi, origani, añ 3 i. trita in puluerem cum melle aut cum cera quantū ſatis eſt, in formam lupinorū redigantur: quarum vna ad horę ſerē vnius medietatem commanducetur. Poſſunt etiā prædicta contuſa in ſaccū ex ſubtili pāno confectum reponi, & deinceps cōmanducari. Poſt hęc ad localia medicamenta accedendū erit, quę diſcutiendi, attenuandiq; vires habeāt, inter quę calidiſſimū eſt euphorbiū. Eo autē minus calidū thapſia, poſt thapſiā verò ſinapi & naſturtiū. Poſt hęc ſuccedunt ſulphur, nitrum, vterque elleborus, crucę ſemē, oleūq; laurinū. Quin & pix liquida muriū ſtercus, auſerinus adeps, ſed magis vr-

Apophlegmatifini.

Localia.

se, amygdalæ amaræ totæ vstæ, herinacei ter-
restris cutis, & thus aceto acerrimo subactū.
Ante iam commemoratorū medicamento-
rū vsum capillos nouacula tollere oportet:
deinde patientem cutē per linteolum neque
asperum neq; molle nimis, confricare, ac vi-
dere ad quantū ruborem per huiusmodi fri-
ctionē peruenit. Si enim per modicā frictio-
nem statim rubescat, morbum sanatu facile
iudicabis. Si vero vix post longam atq; mul-
tam frictionē rubescat, difficile tū passionē,
tum curationem ominaberis. Porro ad hūc
qui sequitur modum medicamenta compo-
nes. R̄ Seminis crucæ, nasturtii, nitri, añ 3 i.
s. thuris in aceto acri & forti macerati, 3 i.
sulphuris viui 3 i. adipis anserini vrsini añ 3 i.
olei laurini § iii. misce, fiat linimentū, quod
illinatur assidue. Aliud paulo validius. R̄
Euphorbii, thapsiæ, añ 3 i. elebori vtriusque
añ 3 s. nasturtii, crucæ, amygdalarum ama-
rarum cum corticibus vstarum añ 3 i. sinapi
3 s. olei nardini & laurini añ § ii. cerę quantū
satis est. formetur vnguentum, quo caput as-
siduē illinatur. Sunt autem hæc præsidia sub
calido aëre flatu carēte, & in sole adhibēda.
Quo in Si vero hyems fuerit, necesse erit vt in hypo-
lo ap- causto, aut balneo adhibeātur. Prę omnibus
plicanda verò animaduertere oportet, ne in fortium
medicamentorū admotione cutis vltra quā
conuenit cōcaleseat: id quod tum ex colore

Linimen-
tum.

vnguen-
tum.

Quo in
lo ap-
plicanda

ipsius, tum digitorum tactu deprehēdes. Color nanque rufus magis apparebit, & digitorum contactu satis calidam cognosces. Horū itaque animadversionē habere oportet. periculum enim, iterum atque iterū repetito eorum usu, cutē exuri. Quare ad molliora trāseundum est. Plura autem paratu facilia medicamenta habet Galenus lib. i. de Compo. medica. secundum locos cap. i. Caterum cum morbus ex vitiatīs humoribus procreatus sit, necesse erit ut tota vict^a ratio sit ex cibis & potu boni succi. De quibus Galenus in peculiari de his libello conscripto consulendus erit. De aliis passionibus capillorum & cutis capitis abunde scribit Galenus lib. i. de Compo. med. secundum locos: quas nos hic cōsultō prātermisimus, quādo rarō admodū in his eurādīs medicorum opera requiratur.

DE DOLORE CAPITIS. CAP. II.

Cephalalgia Latine dolorem capitis sonat, & cum potissimum, qui non inueteratus est, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma sit. Barbari medici Sodom nominant. Huius autem duæ potissimum causæ sunt. Nunc enim ex sola intemperie simplici citra humorū cōplexum: nunc verò ex humorum copia accidit. Vehementissimi autē capitis dolores fiunt, ob caliditatem & frigiditatem: moderati, ob siccitatem. Humiditas suiipsius respectu nullum

Κεφα-
λαλγία.

Causæ.

Notæ.

planè dolorem inducit, nisi calori, aut frigori, aut humorum copiae adiuncta sit. Simili modo humoribus vel in toto capite, vel in aliqua tantum parte redundantibus calidis quidem ac frigidis vehementior, siccis verò moderatior dolor innadit, si tamen siccitas absque manifesta caliditate fuerit. Humidi autè, quantū in ipsorum ratione est, nullum prorsus dolorem afferunt, multitudine tantum grauantes, si citra obstructionem sint. Cum obstructione enim moderata, moderatè dolorifici cum forti, vehementer dolorosi sunt. Vt autè ordine omnia tractentur, & rectius assequatur, propria iuxta singulos affectus capitis dolores procreantes auxilia describemus, initium à calida intemperie sumetes.

DE DOLORE CAPITIS EX
CALORE. CAP. III.

Causæ. Per calorem hic intelligimus, intemperiem calidam nudæ qualitatis. Hæc autè potissimum generatur ex solis ardore. omnes enim homines in sole æstiuo diutius versantes, capite incalescunt. Ex motu immodico, balneis, flammæ vicinitate, ira, furore, calidis affectibus, odoramentis, cibo calido & acri, cepis videlicet, alliis & porris. **Signa.** Qui ex ardore caput dolèt, eorum cutis tactu calida est, & primo statim manus iniecta aridior apparet, oculi rubent, frigidis tum perfusionibus tum inunctionibus gaudèt & iuuantur.

Euitādus aër calidus, nullum per flatū re- **Viētus.**
 cipiēns, & calidis vaporibus refertus. Deligē **Aer.**
 dus contrā is, qui natura frigidus, aut qui no-
 stra arte sic præparatus sit ex floribus ac ger-
 minibus frigida facultate præditis, per arcā
 proiectis, & humi fufis, rosis nimirū, violis,
 nymphaea, quā Nenuphar hodie nominant,
 vitiū capreolis, ruborū ramis, & similibus. A-
 qua etiā frigida de vasis in vasa trās fusa, aëre
 refrigerare valet. Cibi sint natura frigidi, la- **Cibus.**
 ctuca, portulaca, ptisana hordei, aut alica e-
 iusdem, oua sorbilia, panis ex aqua, pulli co-
 lumbarū cū omphacio (agrestā vocāt) cocti.
 Pisces petrosi, & lac amygdalarū cum fursu-
 rib. decoctū. Potu verò aqua vtendū est, nisi **Potus.**
 quibusdā vētriculus propter aquæ potū sub-
 uertatur: tū enim præstat vti vino aquoso, &
 bene diluto, aut aqua in qua cinnamonū de-
 coctū est, cui itybi domestici (endiuiā appel-
 lant) sirupus, & acetosus simplex, aut oxysac-
 chara admixta sit. Cæterū somni ac quietis
 cura in primis habenda est. coitū euitet: alui **Somnus.**
 excremēta ac lotiū nō retineat, sed ab iis sese **Excremē-**
 suo tēpore exoneret. Exercitationes, frictio. **torū ex-**
 nes, balneāq; fugiat. Irā, furorē, aliāsq; ani- **purgatio**
 mi perturbationes corp⁹ excalfaciētes, pror- **Exerci-**
 sus nō admittat. Virādus igitur clamor, cōtē **tia.**
 tio, omnisq; mētis perturbatio & perculsio. **Animi**
 In bona autē animi habitatione & firmitate affectus.
 degēdū. Dolorē autē capitis ē caliditate cu- **Curatio.**

rant, ea quæ refrigerandi facultatem citra manifestam adstrictionem obtinet. Optima verò censenda, quæ tenuium partium substantiâ prædita sunt. Quapropter in principio quidē nihil præstantius, quàm oleo rosaceo probè apparato caput perfundere. Proximum à rosaceo chamæmelinū locū habet, in iis corporibus, quibus vehementem frigiditatem inducere veremur: qualia sunt foeminarum & eunuchorum ac puerorum, & quicumque carne molli præditi, albūque habentes colorem. Sed si vehementer infrigidari oporteat, semperuiui succum, aut lactucæ, aut psyllii, aut polygoni (corrigiolam appellant) adiacere conuenit. Quin & solani aliquando succum, & pampinorum, & vuarum immaturarum adiacere licebit. Vfus autem hodie sicut olim etiā obtinuit, ut prædictis medicamentis parum aceti, ut nimirum maiorem & penitus penetrantem vim induat medicamentum, admisceatur in hunc modū. R. olei rosacei § ii. aquæ rosacæ § i s. aceti § s. misce. Aliud. Aquarū semperuiui, lactucæ, solani añ § ii. aquæ chamæmeli § i s. aceti § i. misce. In Adhibi. tio medi us medicamētis lintheolū tingito, iuxtaque camento frontē, vbi pilosa eius pars desinit, & iuxta tēpora imponito. Occiput hoc medicamēto tāgi haud debet, neque enim citra molestiā refrigeratia sustinet, propterea quod isthic principū medullæ spinalis existat. At si niciput ob

laxitatē coarticulationis iuxta coronalē suturā, & ob osiū tenuitatē & raritatē, facilē tū caliditatē tum frigiditatē omnium quæ adhibentur medicamentorum intrò distribuit. Refrigerāda autē quæcūque adhibētur medicamenta, in aqua vehementer frigida collocata: quæ si non adsit, niuem aut glaciem vasculo circūpones. Eodem sanē modo oleis aliis uti licebit, ut est cotoneorū, violaceum, & nymphaeæ, nenupharinū hodie nomināt. Interdū adiciere mucilagines, ut vocāt, seminis psyllii, & cotoneorum, ac linimētum conficere in hunc modum. *Rx* Mucilaginis sc. cotoneorum, mucilaginis sc. psyllii añ 3 iiii. succi portulacæ 3 ii. olei rosacei ꝑ i. misce, fiat linimentum. Cum adiectione ceræ, & aliorū medicamentorum vnguenta efficies in eum modum. *Rx* vnguenti populeon 3 i. oleorum violarum, & rosacei añ 3 iiii. florū nymphaeæ aridorū, rosarum rub. añ 3 i. ceræ quantum satis est: fac vnguentum, quod illinatur fronti & temporibus. Proderūt etiā embrochæ ex rosis, violis, florib⁹ nymphaeæ, foliis salicis, hordeo excorticato, portulacæ, vitis, ac similibus. Si somnū conciliare volueris, adde papaveris lactucæq; folia. Hæc quidem, ut diximus, inter initia morbi remedia cōgruent. Postea verò mitigantia ac maturātia medicamenta reprimentibus miscere oportet, in hūc modum. *Rx* Florum rosarū, violarum, añ

Linimen
tum.

Embro
cha.

LEONHARTI FUCHSII

M s. foliorū salicis, herbarū camæmeli, meli-
loti, añ m i. se. maluæ 3 iij. hordei excortica-
ti § i. Coquantur omnia in aquæ fß ii. vsque
ad tercię partis cōsumptionē, fiat embrocha.
Tandem ex discussoriis medicamētis quip-
piam addendū, paulatim detractis iis quę re-
pellunt. Haftenus de iis quę extrinsecus cor-
pori adhibētur. Intra corpus assumi possunt
vsitata hodie medicamēta, Iuleb violarū, ro-
sarum, conseruæ eorundem, confectio quam
manum CHRISTI appellant, & alia eius-
modi, quibus alterandi inest facultas.

DE DOLORE CAPITIS EX FRI- GORE. CAP. IIII.

Causæ. Per frigus intellige intemperiem frigi-
dam nudæ qualitatis, citra alicuius humoris
frigidi confluxum. Hæc contrahitur ab am-
biēte nos aëre frigido, potissimū si quis aper-
to capite in hoc versetur. Cibis & potu frigi-
dis, præcipuē autē frigida aquæ potione, &
in ea natatione: frigidorū medicamētorum
improvida admotione. **Signa.** Signa dolentium ca-
put ob frigiditatē, cōtraria sunt eis quę ex ca-
lore oriuntur. Tangentibus enim caput nul-
lus sentitur calor, incōtracta minimēq; ari-
da & decolor ipsorum facies existit. Oculi
neq; rubēt, sed cōtrā sub tumido pallore de-
formātur. Frigidis neque gaudent, neq; iuuā-
tur. **Victus.** Caueat aërē frigidū, versetur in calido.
Lactis vsum in cibo caueat, ac piscium, alio.

rumque, quæ comesta refrigerare possunt. Ovis sorbilibus, carnibus perdicum & phasianorum similiūq; vescatur. Dandū vinū tenuium partiū, quod tantū abest vt noceat, vt etiam plurimū cōducatur, quod nimirū calefaciendi extenuādīq; facultate præditū sit. Motu corporis vtatur, gestationeq; in equo. Sōnus illi cōfert mediocris. ideōq; plus vigilandum erit illi quā dormiendū. Lauacra calida profunt. Animi perturbationes, tristitiā, Curatio. grauēsq; cogitationes euitet. In admouendis autē medicamētis cerebri natiūū temperamētū cōsiderandū erit. quod tale est, vt neq; vehementer calida, neq; etiā vehementer frigida ferat medicamēta. Cōuenit autem in hoc omnibus, quod oleū rutaceū calidū, sincipiti (vt suprā dictū est) adhibitū, perfectē hominē liberare possit. Si verò vehementiori calefactione sit opus, piper aut euphorbium ad oleum cōiiciatur, aut aliquid olei de piperibus, vel euphorbii rutaceo oleo immisceatur. Conueniunt etiam haud secus atque rutaceū, laurinū, itēq; irinū oleum. quibus non solum frons, verū etiam facies & nares inungendæ erūt. Prædictis oleis alia quædā medicamēta calida adiciere licebit, atq; vnguentum hunc in modū conficere. vnguentum. R^x oleorū irini, rutacei añ ꝑ s. maioranę, betonicę, piperis añ ꝑ i. euphorbii gr. v. cerę quod satis est, fiat vnguentum. Neq; parum proderunt embro-

Sacculus cha ex floribus meliloti & camomille, maiorana, origano, betonica, sambuco, salvia, foliis laurinis, stœchade, & similibus in aqua decoctis. In eundem usum sacculi adhiberi possunt, sic confecti. R̄ Foliorum lauri, serpilli, maioranæ añ m s. florum rosmarini m i. rutę p i. garyophyllorum, stœchados arabicę añ 3 i. pulegii, calamenti añ 3 i s. terantur singula, & fiat sacculus capiti adhibendus. Imponatur autem capiti calefactus in latere, acetōq; prius irrigatus. Nec alienū ab instituto erit, si quis pomum aliquod odoriferum in hunc modum composuerit. R̄ styracis calamitis 3 ii. gariophyllorū, maceris, ligni aloës añ 3 s. lauendulæ 3 i. galliæ moschatæ 3 i s. moschi, ambræ. g. iii. Terantur omnia subtilis simè, & cum aqua maioranæ & stœcæ, (stœracē liquidam vocant) quod satis est, fiat pomum. Intra corpus adhiberi possunt, eclegma diacori, confectio diambæ, diamoschi dulcis, diantos, syrupus de stœchade, & alia calida medicamenta, quorum singulatiū facere mentionem superuacaneum fuerit.

DE DOLORE CAPITIS EX
SICCITATE. V.

Causa. Per siccitatem accipe intemperiem siccam nudæ qualitatis, quæ potissimum ex immodica corporis vacuatione, siue ea per medicamenta, siue aërem ambientem, famem, coitum, exercitia, animique perturbationes

acciderit, euenire solet. Deprehéditur si pau- Signa.
 ca aut nulla penitus ex naribus excrementa
 effluxerint, oculi concaui fuerint, plurimūq;
 vigilauerint. Versetur in aëre humido, vesca Vi&u.
 tūque cibis humectātibus, & boni succi, vi-
 tellis nimirum ouorum, testibus gallorū co-
 rundémq; iure, phasianis, perdicibus, & aliis
 quæ plurimum nutrire possunt. Vinū bibat
 tenue & aquosum, somno vtatur largiori. Ca-
 ueat motū corporis, ac quiete potius otioq;
 vtatur. Coitum, famem, sitim, & omnia quæ
 exicare possunt, fugiat. Lauacra quæ hume-
 ctate valent (vt sunt, Galeno lib. 3, de Tuéd.
 valetu. autore, dulcium calefactarum aqua-
 rum, si tepidiores fuerint) non parum prode Curatio.
 runt. Lætetur, atque omnem animi perturba-
 tionem & percussionem vitet. In hoc morbo
 capiti adhibendum erit oleum violaceum,
 amygdalinum, quod scilicet ex dulcibus cō-
 fectum est amygdalis. Inungendum verò iis
 nō solum sinciput, imò etiam naribus instil-
 landa erūt. Non temerè iam dictis oleis pin-
 guedines ammiscentur, ad eum modū. R& Linimen-
 tum.
 leorum violacci, nymphæ (nenupharium
 nominant) añ 3 iii. pinguedinis vitulinæ, gal-
 linæ, butyri recentis salis experti, añ 3 ii. mi-
 sce, fiat linimentū. Neque à ratione alienum
 erit, si aliis, nempe farina hordei, violis, aut
 nymphæa adiectis vnguēta & emplastra cō-
 feceris. Proderit etiam, embrochas ex violis,

LEONHARTI FUCHSII

similibusq; herbis compositas adhibere. Intra corpus ea adhibenda erunt, quæ tabidis conueniunt, de quibus suo dicemus loco.

DE DOLORE CAPITIS ET PLENITUDINE. CAP. VI.

Plenitudo. Hactenus de curatione doloris capitis quæ ex nuda qualitatū intemperie prouenit, egimus: iā de eo qui ex plenitudine oritur, verba faciemus. Plenitudinē autē vocamus, id quod Græci *πληθωσ* & *πληθώραν*, quæ nihil aliud est, nisi quum quatuor humores ex æquo aucti sunt, aut cū sanguis solus abundat. Idem enim est, quando syncerus sanguis in venis contineri nō possit, quin aliquid bilis, vel pituitæ, aut serosi humoris illi cōmixtum sit. Hoc itaque aucto, ut reliqui etiam omnes humores increcant, necesse est. Atque hinc est, quod recentiores hūc capitis dolorem ex sanguine nominauerint. Fit ab iis quæ plenitudinē in corpore procreare possunt, hoc est, quæ omnes ex æquo humores abundare efficiūt, ut sunt cibi & potus copiosi & boni succi, neglectio exercitiorū, balnei, sudoris, & aliarum vacuationum naturalium & artificialium. **Signa.** Facies & oculi rubent, venæ tenduntur, adeo ut nō maiores duntaxat, sed etiā parue, quæ prius sensum effugiebāt, nūc visu cōprehendātur. Pulsus magnus & vehemens. Urina subrufa ac crassa. Venæ temporū pulsant. Dolor capitis grauatiuus.

Plenitudo.

Causæ.

Signa.

Versetur in aëre frigido & sicco. Vitet car- Victus.
 nes, oua forbilia, & alia quę copiosę nutrire
 possunt. Utatur ptisana hordeacea, aut alica
 hordei. Oleribus frigidis, intybo (scariolam
 & endiuia vocant) portulaca, & similibus
 vescatur. Fugiat vinū, bibat aquā decoctiōis
 cinnamomi, aut hordei. Exercitetur medio-
 criter, fricetur, frequenti utatur balneo, ita ta-
 men ut corpus prius vacuetur, & æger mini-
 me febricitet. Sōnus sit mediocris. Gaudeat
 & latetur, animiq; omnis perturbatio absit.

Primū omnium curādī ratio à sanguinis Curatio.
 missione auspicetur, ac vena in cubito exte- venæ se-
 riore, quam humeralē & cephalicā hodie vo ctio.
 cāt, eius partis in qua dolor potissimū est, in-
 cidatur: quod nimirū hęc vena capiti sit cōti-
 nuata: atque adeo non solum in contrarium
 auellere, verumetiam euacuare partem affe-
 ctam possit. Id quod non solum Galenus, ve-
 rum etiam Razes lib. 9. ad Almāsorem Cap.
 1. faciendum suadet. Quod si ætas, aut virtus
 imbecilla venæ secandæ consiliū interturba-
 rint, cucurbitæ affigendæ erunt: nō quidem
 capiti, sed membrīs ei cōtinuatis, & cū eo so-
 cietatē habentibus. Sic enim Galen. lib. 13.
 The. meth. ca. 13. docet, ita scribēs, Generādis
 adhuc passionib. minime iis partib. quæ la-
 borare incipiunt, sed quæ iis sunt cōtinuatæ,
 cucurbita imponi debet, auellendi in con-
 trariū causā. Post hæc refrigerātia & adstrin. Localia.

gentia medicamenta capiti adhibeantur, de quibus abundè suprà in cap. 3. dictum est. Al uis etià, vt aperta sit, medicus diligenter curet: ideoque si sponte sua excrementa corporis non deiecerit, hoc vel simili decocto purgetur, quod R^x Florum boraginis, buglossæ, violarum, rosarum añ m s. se. quatuor cōmuniū frigidorum maiorum excorticatorum añ 3 ii. myxorū (sebestē appellāt) prunorum damascenorū añ numero xii. passularum, tamarindorum añ § i. corticum myrobalanorum luteorū, (citrinos hodie nominant) cæruleorum (indos appellant) cepulorum (chebulos vocant) empeliticorum (emblicos nuncupāt) beletzicorum (belliricos corrupta voce dicūt) añ 3 iii. glycirrhizæ rasæ, liquiritiæ appellant, § i. fumi terræ, adianti, capillū veneris nominant, añ m i. tamaricis (tamariscū vocant) hemionitidis, scolopendriā dicunt, añ 3 iii. foliorū senæ, polypodii añ § s. agarici 3 ii s. zingiberis 3 s. decoquantur singula in aqua fontana sufficienti, donec medietas eius consumatur. Dein coletur, & saccharo sufficienti dulcescat, clarificeturq; cum albuminib. ouī, & fiat potio depurata. de qua æger in aurora § iiii bibat. Quod si validius requirat medicamentum, tum præstiterit in § iiii. iniicere rhabbari in puluerem redacti 3 i. spicæ 3 s. aut in iis dissoluere casīę fistularis § i s. aut mellis aërii, mannam vocant,

§ 1. Aut eclegmatis diaphenicôn 3 iiii. In eundem vsum exhibebis syrupũ violaceum, & oxyfacharam nominatã. Posthæc adhibenda capiti sunt medicamenta quę reliquias morbi discutere valent, vt est althææ semẽ, fœnũ græcum, chamæmeli melilotiq; flores. Olea denique, chamæmelinum, anethinum, & similia. Ex quibus linimẽta, vnguenta, emplastraque cõponi possunt, ad modum in præcedentibus capitibus monstratum.

DE DOLORE CAPITIS EX BILIOSIS HUMORIBVS. CAP. VII.

Fit ab omnibus iis, quæ corpus præter naturã calefaciunt & exiccãt, adeoq; bilem flammam procreãt, vt sunt vehementia exercitia, ira, victus ratio ex biliosis cibis constãs, vita curiosa, & similia. Signa in hoc similia sunt ei q̃ ex calore oritur, maior tamẽ in hoc morbo, & faciei pallor. Interim etiã oris amaritudo, oculorũ siccitas, linguæ & nariũ est. Acti etiã vigẽti, & temperaturis calidioribus, vitæq; sollicitæ, & his qui flauã coaceruãt bilẽ, hæc passio præcipuẽ accidere solet. Moretur in aẽre frigido & humido, qui arte etiam, vt supra ostensum est, confici potest, si pauimentum ædiũ assiduẽ humore aspergatur: aut flores ac germina, quæ frigida humidæq; facultatis sint, per arẽa proiciantur. Cibi in vniuersum humidi & boni succi sint. Vescatur laetucis, portulaca, piscibus paruis & saxatili.

bus. Potus sit dilutus, aqua decoctionis cin-
namomi. Vino prorsus abstineat. Quiescat,
& somno utatur largiore. Balneū quoque illi
temperatum, & vnctiones cōferūt. Gaudeat,
Curatio. & omnes animi perturbationes fugiat. Curā-
di ratio à biliosi humoris euacuatione, nō vt
loquuntur barbari, digestionē auspicanda.
Biliosi Neque enim tenues humores, qualis est bilis
humores flaua quādoquidē mobiles sunt, vacuationi
nō egent inepti esse possunt: atque adeo vt præparētur
præpara- nō indigent, veluti in cap. 11, libri secūdi Pa-
tione. radoxorū monstrauius. Vacuatur autē bi-
liosus humor per absinthii cremorē, aut per
aloē, & per hieram picram per se datā, aut
catapotia ex aloē confecta. Neq; absurdum
erit, si quis decoctum purgans, cap. 6. descri-
ptum exhibeat, atque in eo dissoluat 3 iiii. cc.
legmatis de succo rosaceo, aut de psilio vo-
cati. Proderit etiam rhabarbari dilutū (infu-
sionem hodie nominant) in hūc modū cōpo-
sitū. R̄ rhabarbari selecti 3 ii. spicæ 3 i. con-
Dilutum cidantur minutatim, & macerentur in succis
rhabar- intybi domestici, cassutæ (cascutā appellant)
bari. buglossi (borraginem nominant) añ 3 i. vini
optimi 3 s. Durent horis duodecim in infu-
sione: dein valide exprimantur & colentur,
adiectis eclegmatum de succo rosaceo, de
psilio añ 3 i s. misce, fiat potio. Vti etiam li-
cebit catapotis aureis, alephanginis, de rha-
barbaro, de hiera simplici nominatis, & simi

libus. In delicatis non temere quis hoc bolo
 utetur. R^x scāmonia præparata ʒ i. maceris,
 cinnamomi, mastichis añ gr. iiii. cōserua vio- Bolus.
 larū, nymphæa añ ʒ i. sacchari quod satis est
 fiat bolus. Proderit etiam clysteribus uti, in
 hunc modum confectis. R^x Maluē, althæa,
 intybi vtriusq; domestici, hoc est, endiuia & Clyster.
 scariolæ, violarum añ ʒ i. hordei integri ʒ i.
 se. quatuor cōmunium frigidorum minorū
 añ ʒ iiii. Coquantur singula in aqua fontana
 ad tertiæ partis cōsumptionem, & colentur.
 R^x colaturæ lb. i. medullæ casia fistularis ʒ i.
 hieræ picræ ʒ s. olei violacei ʒ iiii. vitellos o-
 uorū numero ii. salis ʒ i s. misce, fiat clyster.
 Post biliosi humoris vacuationem, ea medi-
 camenta quæ caput refrigerare ac roborare Localia.
 possunt, adhibeantur, qualia multa cap. 3. hu-
 ius libri commemorata sunt. Quod si vero vi-
 gil supra modum æger fuerit, sinciput oleo
 nymphæa, & de papauere inungedum erit.
 Adiciere etiā interdum necesse est prædictis
 parum opii, ut scilicet somnus hac ratione
 concilietur. Galenus in eum vsum trigoni pa-
 stillum, quem describit Paulus lib. 7. cap. 12.
 commendat, ut eo frons inungatur.

DE DOLORE CAPITIS EX PITUITO-
 SIV HVMORIBVS. CAP. VIII.

Generatur ab omnibus quæ pituitā in ca- Causæ.
 pite procreant, ut est aër frigidus & humi-
 dus, cibi iisdē qualitatib. præditi, pisces, lac,
 b ii

- Signa.** olera, fructusque. item ocium, somnus à plenitudine, & similia. Dignoscitur, si caput grauiatur, facies alba ac tumida fuerit. Si denique aeger somno facile tentatur, piger est, sensib^{us} minime viget, & excrementis capitis redundat.
- Aer.** Aer ægrotū ambiens, calidus & siccus, sit natura, aut arte per odora menta aliqua, cinnamomum nimirum, thus, gariophyllos, agallochon (lignum aloes nominant) præparatus. Carnibus vescatur assis, & odoramentorum accessione conditis. Vinum tenuium partium confert. Motus mediocris, & alia quæ supra Cap. 4. monstrata sunt. Ratio curandi à
- Curatio. præparatio.** pituitosi humoris extenuatione & incisione auspicanda erit, in quem sanè usum mel roseum, oxymeli simplex, compositum, scylliticum, syrupus de stœchade cum succis hyssopi, betonicæ, maioranæ, & saluæ conueniunt. Vel si usus syruporum & succorum displicuerit, hoc decocto uti licebit. R. Radicum fœniculi, petroselini, apii añ ʒ i. radicis pœoniæ ʒ ii. seminum anisi, fœniculi, sileris montani, scfeli Galenus vocat, añ ʒ iii. stœchadis arabici, origani, serpilli, maioranæ, calamenti, betonicæ, saluæ, añ ms. cinnamomi selecti, maceris, añ ʒ i s. Decoquantur iuxta artē in aqua sufficiens, usque ad medietatis consumptionem. colatur, & colatura saccharo quod satis est, dulcescat, atque subinde cū oui albumine depuretur. Adde syrupi de hyssopo,

oxymelitis simplicis añ § iiii. misce, fiat po-
 tio. Præparatis ac extenuatis iā humoribus
 pituitosis, reliquū est vt purgati medicamen-
 to euacuentur. In quem vsum proderunt pi-
 lulæ de hiera composita, coctiæ, & sine qui-
 bus esse nolo. R^x Massæ pilularū coctiarum
 3 i s. pil. de hiera composita 3 i. elephangina-
 rum 3 s. agarici trochiscati 3 ii. myrobalano-
 rum cepulorū, chebulos hodie nominant, 3
 i. turbit optimi 3 s. stœchados arabici, zingi-
 beris, añ gr. v. mastichis gr. vii. granorū pæo-
 niæ numero iiii. castorei gr. iiii. cum succo la-
 uendulæ. fiant pilulæ pro singulis drachmis
 numero xi. Conferunt etiam clysteres, non
 solum propter euacuationem eorum quæ in
 intestinis cōtinentur, sed etiam ob reuulsio-
 nem eorum quæ ad caput feruntur. In quem
 vsum prædictū decoctum præparas compo-
 nentia medicamenta conducent, si colaturæ
 § xii recipiantur, & in ea dissoluantur bene-
 dictæ laxatiuæ § s. eclegmatis Indi 3 iiii. dia-
 phenicōn 3 ii. mellis rosacei § i. oleorum lau-
 rini, rutacei, añ § i s. salis gemmæ vocatæ 3 i.
 misce, fiat clyster. Toto vacuato corpore, ea
 quæ caput expurgare possunt, adhibenda erūt
 ex quorum numero sunt apophlegmatismi,
 de quibus cap. i. abundè dictum est. Purga-
 tur etiam caput per ea medicamenta, quæ ho-
 die Caputpurgia voce barbara nominant.
 Conficiuntur ex succo maioranæ, bliti, bras-
 b iiii

Purga-
 tio.
 Pilulæ.

Clyster.

Capitis
 pu gatio

- Gargarismi.** sicæ, & huiusmodi. Gargarismi etiâ hoc nomine adhiberi possunt ex succis hyssopi, betonicæ, origani, hiera picra, & oxymelite cōfecti, vel in hunc modū. R. Radicis pyrethri, piperis longi, añ 3 i s. sc. staphysagrie 3 s. maioranæ, pulegii, hyssopi, origani, betonicæ, añ m s. Decoquantur singula in aqua idoneę quātītatis, donec tertia eius pars absumatur. Colaturę adlice mellis rosacei ꝑ i s. oxymelitis scyllitici ꝑ s. misce, fiat gargarism⁹. **Sternutamentum.** tamētorū etiâ hoc loco vsus erit, sic cōfectorum. R. Maioranæ 3 i. nigellæ 3 s. gariophyllorū, piperis albi, cubebarū, añ 3 i. nucis myristicæ, struthii (cōditi vocāt) castorii, ellebori albi, añ 3 s. misce, fiat puluis. Ditiōrib⁹ adiciendū aliquid moschi & ambræ, cuiusque scilicet gr. ii. Narib⁹ etiâ adhibere odoramenta calida cōuenit, aut pomū aliquod odoriferum conficiendū erit, quale suprā cap. 4. cōmemorauim⁹. **Errhina.** Errhina etiâ, Nasalia appellāt narib. indita cōmodant. vt R. Seminis staphysagrie, pyrethri, piperis albi, añ 3 s. nigellæ, struthii, añ 3 ii. ellebori albi 3 s. redigantur singula in puluerē, & cū resina terebinthina fiant Nasalia. Post capitis purgationē cōueniunt inunctiones, embroche, sacculi, & similia medicamēta suprā cap. 4. producta, quibus discutiēdi inest facultas. Intra corp⁹ exhibētur cubebe saccharo obductæ, cōfectiōnes diambæ, diamoschi, aromatici rosacei,

diacumini, theriaca, Mithridati antidotus, diacori, cōseruæ maioranæ, rosinarini, betonica, & eiusmodi. Potissimū verū hæc confectio. R. Specierū aromatici ros. diambre, diamoschi dulcis, añ ʒ ii. specierū eclegmatis de gemmis, dianthos, añ ʒ i. cubebarū, maceris añ ʒ s. agallochi (lignum aloës vocāt gariophyllorū, sc. fœniculi, añ ʒ s. cinnamomi electi ʒ ii. stœchados arab. ʒ s. sacchari cādidißimi ʒ vi. in aqua florū pæoniæ & lauendulæ dissoluti, fiat cōfectio ī rotulis aut morsulis.

Morsuli.

Hic practicarum, vt vocant scriptores inferunt caput de dolore capitis ex melancholicis humoribus, præter tamē necessitatē, cum omnia quæ hic ab iisdem dicūtur, rectius in cap. de melancholia sint transferenda.

DE CEPHALAEA. CAP. IX.

Cephalæa, diuturnus & ægrè cedēs capitis dolor Græcis appellatur, qui ex parua occasione maximas exacerbationes habet, adeo vt neque strepitus neque vocem vehemētiorem, neq; splendidū lumē, neque vini potionem, neque caput repletia odoramēta, neque motum tolerare possint: sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere cupiant, vt quibus veluti à malleo feriri caput videatur. Quidam etiam velut contundantur aut distendantur ea, quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis verò vsque ad oculorū radices dolor progreditur. Habet autē

κεφα-
λαία.

b iiii

hic affectus aliquando quidem cōtinuos dō-
lores, aliquando verò exacerbationes, & in-
terualla siue ordinata, siue inordinata. Qui-
dam etiam ex eis cerebri membranas doli-
tant: quidam verò membranam tantum cal-
uariam ambientem. Fit ex vaporum aut
humorū calidorum vel frigidorum multitu-
dine, intra caluariam vel extra cōtenta. Do-
lores cum grauitate, humorū multitudinem
significāt: cum mordacitate verò, aut humo-
rum aut vaporū acedinem: cum pulsu autē,
inflammationē: cum tēsiōe verò, siquidem
citra grauitatem & pulsum fiat, flatus tenuis
& ventosi multitudinem demonstrant: cum
pulsu verò, mēbranosi corporis inflamma-
tionem: Si verò, cum grauitate distētiō fiat,
humorū multitudinem intra mēbranas con-
tentam. Et dolores quidem in superficie hæ-
rentes, membranæ os caluæ ambientis affe-
ctum significāt: Qui verò in profundo sunt,
cerebri membranarum. Quibuscūque enim
affectus intra caluariam est, his vsq; ad ocu-
lorum radices dolores procedunt, propterea
quòd oculorum tunicæ ex cerebri membra-
nis habeant ortū. Si verò humor putrefactus
calidior fiat, cum febri caput dolitant. febri-
citant autē omnino & qui ex inflāmatione
dolent. Viētus. Viētus ratio ex superioribus de ca-
pitis dolore Capitibus petenda erit. Cura-
tio, si humorum aut vaporū multitudo cau-

fa fuerit, à vacuatione totius corporis auspi-
 cabitur. A sanguinis quidem missione, si to Venæ se-
 rius corporis plenitudo fuerit. Incidenda & 10.
 verò vena primùm cubiti externa, eiusdem
 quidem lateris, humeralem nominant. Et si
 amplius sanguis redundare videatur, etiā ex
 naribus aperta vena, quantum satis esse vide-
 bitur, detrahare conueniet. Si verò caput tan-
 quam imbecillū, ad se sublato humores ac
 vapores excipiet, materiam in totum corpus
 reuellerē oportet, atque ita particulæ affectæ
 mederi. Per purgatoria itaque medicamen-
 ta & clysteres, quorū omnium in superiori-
 bus capitibus copia habetur, ligaturis extre-
 mitatum, & pluribus infernarū partium fri-
 ctionibus reuulsio fiat: præcipue autem hie-
 ra, cuius vim (vt cap. primo diximus) exa-
 cues, exhibēda est. Cæterum post totius cor-
 poris vacuationem, caput vacuātibus vtēris,
 apophlegmatismis nimirum, si pituitæ est
 abundantia, & aliis medicamentis quæ nari-
 bus induntur, cap. 2. commemoratis. Deinde
 ea quæ robur addere possunt, adinuenda.
 Repellit igitur oleū ex oliuis immaturis ex-
 pressum, & rosaceum, per se & cū aceto, aliā-
 que quorum in præcedentibus facta est men-
 tio. Adhibēda verò remedia tepida quidem,
 vbi frigidior & crudior fuerit humorū mul-
 titudo: frigida autem, vbi calidior & bilio-
 sior extiterit. Post hæc, discutientia medica-

menta adhibenda erūt: veluti est oleum chamælinum anethinū, & similia suprà producta. Si verò crassior sit humorum multitudo, serpillum, aut pulegii comam, aut calaminthen, aut mentam oleo incoquendo, multitudinem euacuabis. Eadem hæc etiā robur parti affectę addunt, quapropter vsq; ad perfectam curationem eis vti conuenit. Omniū porro lōgè maximè discutit, & perfectè corroborat, verbenaca recta (verbenam appellant) viridis. imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillo, oleo incocta. Reliqua quę accurationem cephalæ scitu necessaria sunt, ex iis quæ antea de dolore capitis dicta sunt, discēs.

DE HEMICRANIA. CAP. X.

Finitio.

causæ.

Hemicrania est passio dolorifica, quę circa dimidiam capitis partem, aliquando dexteram, aliquando sinistram cōtingit, & iuxta futurā secundum longitudinē eius extensam terminatur. Hæc vt plurimū per circuitus exacerbatur: ac quibusdā extra caluariā, quibusdā in profundo capitis, aliis circa temporum musculos dolor sentitur. Fit ex vaporū aut humorum siue multorum, siue calidorū, siue frigidorū per venas, vel arterias, vel per vtrasque influxu, quum scilicet ea sola quæ intra caluam cōtinētur, hoc est, cerebrū eiusque membranæ, quod in ipsis redundat, foras protrudunt: aut cū interdum partes cor-

poris infra caput positæ, vitiatos vapores aut Sgna.
humores sursum mittunt. Notæ quibus hu-
mores multi, calidi aut frigidi deprehendun-
tur, ex præcænentibus capitibus petendæ sunt.
Quo autem in loco capitis passio fuerit, ex
iis quæ in Cap. de cephalæa dicta sunt, co-
gnosces. Quibus hoc adiiciendū erit, si mem-
brana caluam ambiens patitur, tum adeo ve-
hementer dolere, ut neq; manuū contactum
facile ferant, ita ut ne cutis quidē ipsa omni-
no à passione immunis sit. Viçus ratio ex su Viçus.
perioribus de capitis dolore Capitib. petenda
venit. Præcipue autem vitanda erūt, quæ va-
porum copiam sursum mittere possunt, velu-
ti cepe, allium, sinapi, raphanus, & similia.
Qui vero hemicraniā curare aggreditur, pri Curatio.
us nū venæ sectione, aut purgatione eger in-
digeat, consideret. Si enim ob plenitudinem
passio orta fuerit, humeralis (quam hodie ce-
phalicam vocant) vena, quæ ē directio partis
patientis est, incidenda crit. Sin vero propter
vnius humoris redūdantiam hemicrania in-
uaserit, per convenientia medicamēta is hu-
mor purgandus erit, ut superioribus Capitib.
monstratum est. Vniuerso corpore vacuato,
ad capitis ac localia præsidia progrediendū Localia.
erit, ac vel per digitos manus, vel linteam, di-
midia frontis pars. & ea maximè quæ circa tē-
porum musculos est, confricando calefaciē-
da; atq; in ante accessionis irritationis ve tō.

pus faciendū est. Post exacerbationem verò medicamentis hemicranicis à veteribus medicis appellatis vtendum: siquidem multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ aliquid habet refrigeratorium: citra verò hæc, his quæ multum calefaciunt. Vtrisque verò aliquid ex iis, quæ robur addunt, misceatur, quod adstrictoriam videlicet habeat facultatem. Optimum autem in frigido affectu vnguentum erit, quod R^x olei anethini, olei irini, añ s. piperis albi, serpilli, añ ð i s. castorii ð i. euphorbii ð s. ceræ quod satis est, fiat vnguentum, quod dimidiæ frontis parti, & musculo temporis illinatur. Nec parum confert oleum cui exiguum euphorbii cōmixtum sit, tepidum in aurem infusum, vt R^x olei communis § i. euphorbii ð i. misce, & gutta vna in aurē instilletur. Quædam etiā naturæ proprietate euphorbium aceto dilutum, ac lateri dextro, dolente sinistro, applicatum, & cōtrà sinistro dolente, dextro illitum, hemicranicis maximè cōfert. Idem possunt lumbrici terræ triti, & cochlearum carnes lateri affecto illitæ. Sunt qui persicorum nucleos tritos, ac illitos parti patiēti, mirificè prodesse tradant. Si verò à calidis humoribus aut vaporibus dimidiæ capitis partis dolor fit, ea auxilia quæ suprà de capitis dolore ex calore & bibiliosis humoribus orto, memorauimus, conferent.

Vnguentum.

DE VERTIGINE. CAP. XI.

Quod scotoma Græcis est, hoc Latinis σκότωμα.
 vertigo dicitur. Hinc vehementer errant, qui μα.
 inter se differre tradunt. Barbari corrupta vo-
 ce Scotomiā nominant. Est autē, vbi obtene- vertigo.
 bratiōes hebetudinēsq; oculis obuersantur,
 & omnia circumagi & rotari videtur. Oritur
 verò interdū cerebro primogenia passiōe la- Causæ.
 borante: interdū etiam, quū ori ventriculi cō-
 sentit. Cerebrum autē patitur, cum crassus ac
 lentus humor ipsum occupat, à quo vaporoso-
 sus spiritus ab imbecilli calore resolut⁹, in ce-
 rebri partibus inordinatē mouetur. Ori autē
 vētriculi cōsentit, quando propter extremē-
 tā vitiosa in eō aceruata, ad ipsum cerebrum
 exhalatio vaporosa fertur, spiritum animalē
 in illo circumagens. Qui hac passione la- Sigda.
 borant, iis à quacūque leui occasione, præ o-
 culis tenebrę apparēt, adeò vt interdū cadāt,
 maxime si aliquādo in circum rotentur. Si-
 quidē ipsis ab vna rotatiōe euenit id, quod
 aliis à pluribus accidere solet. Proinde hebe-
 scūt siue alium quēpiam, siue rotā, aut id ge-
 nus aliud quippiā, aut ipsos quoq; in aquis
 vortices circūagi viderint. Visibilis enim spi-
 ritus rotæ agitatē aliisq; iam dictis occurrēs,
 eodē motu circumuehitur, atque ita turbulē-
 tus, inæqualis, inordinatúsq; humoris & spi-
 ritus mot⁹ redditur. Vbi ex primaria cerebri
 passione vertigo dependet, tum aurium so-

nitus, vebemēs dolor capitis, grauitasq; præcedunt: item olfactus, atque alterius cuiusq; sensus à capite prodeuntis oblæsiō. Patiūtur autem tum potissimum, cum sub sole æstua-uerint, vel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi verò ab ore ventriculi oritur, stomachi morsionē, cardiogmon Græci appellāt, & nausēā præsentiant. Versetur in aëre puro ac lucido, fugiat crassum ac nebulosum. Cibis vescatur boni succi & concocti facilib. flatuq; omnino carētibus: carnibus perdicū, caponū, phasianorum, gallinarum, vitulinis: piscibus saxatilibus. euaporantia quæuis deuitet. Bibat vinum aquosum, album tenuissimum, & nō valde antiquum, aut hydromeli. Exercitio vtatur mediocri. Somnum diurnū fugiat: nocturno prolixiori vtatur. Caueat sibi ab animi perturbationibus. Non intueatur res in gyrum actas, & rotatas, aut celeriter motas, neq; in præcipitiis ambulet. hæc enim singula passionem exacerbare possunt. Vertiginosos in accessione quidē odoramētis, frictio-nibus, & id genus aliis excitare cōuenit. Vi-
 venæ se- rium autem attestante robore, si nihil aliud
 ctio. obstiterit, vena humeralis secanda est, siue principium morbi fuerit, siue etiā processerit. in sanguinis autem missione obseruandum, ne plurimum confertim vacuetur, propterea quod à quacunq; leui occasione æger facile

concidat. Plurib. itaque ablationib. per certa Purga-
interualla vtentes, congruam mensuram ex-
plebimus. Quòd si verò sanguinis mīssionē
quidpiam prohibuerit, alius subducatur,
semper redundanti humori medicamentum
adaptando. Plurimum verò cōfert, primū
vacuare per acrem clysterem, non solū pro-
pter eorum quę in intestinis continentur va-
cuationem, vt suprā quoque diximus, verum
etiam ob reuulsionem eorum quę ad caput
feruntur. cuius sanē compositionem pete ex
Cap. de Apoplexia. Præmissis hisce vniuersi
corporis euacuationib⁹, capiti localia reme-
dia adhibenda sunt, nempe cucurbitulæ ad
occipitiū cū scarificatione. Postea apophleg-
matismis, gargarismis & sternutamentis vtē-
dum est. In nares deinde anagallidis succus,
aut cyclamini infundendus. Nitrū vero cum
nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per
nares egregie purgat. Deinceps æger ad bal-
neum ducendus erit, ac capiti embrocha ex
medicamentis discutiendi facultate prædi-
tis composita adhibenda. Quod si vero ca-
put in balneo supra modū incaluerit, rosa-
ceo, & aceto sæpe fouendum est, ad refrige-
randum. Si igitur ob hæc præsidia passio ces-
sauerit, deinceps à validioribus abstinēdum:
sin persistiterit, capitis arterias in temporibus
circa aures incidere oportet, ventre tamen
prius aut medicamēto aut clystere purgato.

Localia.

Caute-
rium,

Qualiter verò incidendæ sint arteriæ, docet Paulus Aegineta lib. 6. Cap. 4. Neque absurdum erit cauterium hoc occipiti post aures adhibere, quod R^x cantharidum, abiectis capitibus, alis & pedibus, 3 i. fermenti acris 3 s. cum aceto & vino è sublimi ignis commercio distillato subigatur, & admoueat^r. Vertigo autem à ventriculi oris consensu, vomitu curari potest, qui hoc medicamento mouendus erit. R^x Anethi m i. sc. raphani, sc. rapum añ 3 ii. radicis raphani § s. ebulliat in aqua sufficiens, donec tertia pars absumatur. Coletur, & § iii. colaturæ addantur oxymelitis scyllitici § i s. misce, dentur à comestione. Proderunt etiam pipulæ stomachicæ, & similes. Dentur à cibo ea quæ ventriculi os constringunt, atque adeò ne vapores sursum ad caput ferantur, prohibet: vt sunt diacotoniòn simplex, cotonia ipsa, pyra adstringentia, & eiusmodi, de quibus omni b^o suo loco plura.

DE PHRENITIDE. CAP. XII.

Phrenitis.

prima eius species.

Phrenitis est cerebri, aut membranarum eius inflammatio, Galeno lib. 2. de Symp. causis authore. Sunt autem phrenitidis plurimæ differentiæ, tres tamen præcipuæ. Aut enim imaginatrix sola facultas læsa est, seruata illæsa ratione. id quod Theophilo medico cuius Galen. lib. de Sympto. diff. meminuit, euenisse constat: qui quum alioqui prudenter se gereret, atque eos qui præsentibus erant, ex-

actē nosceret, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubiculi, in quo decubebat, eosq; tibia canere, atque pulsare, & se illos videre putabat: alios quidem stantes, alios autē illic sedentes, atq; ita cōtinenter canentes, ut neque noctu, neque interdum quicquam remitterent. proinde assiduē clamans, iussit eos à cubiculo expelli. Is verò ubi cōtulit, quicquid singuli eorū qui ipsum visitabant, vel dixissent vel egissent, narrabat. Hoc etiam pacto Galenus ipse laboravit, ubi per æstatē ardente febris correptus erat, ut licet videre lib. 4. de patiētibus loc. cap. 1. Imaginatio autē læditur priore cerebri parte patiētē. Aut ratio tātum patitur, salva imaginatione. Sic patiebatur phreniticus ille, cuius mētionem facit Galenus loco iam citato, & lib. 4. de Patientibus loc. Cap. 1. qui quum Romæ domi cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili venit ad fenestram, per quā & ipse videri, & prætereūtes videre potuit. Itaque ex vitreis vasis singula ostēdens interrogavit, iuberēntne ut ea proiiceret? Illi verò ridentes plaudētēsq; ut ea proiiceret, rogabāt. Tum ipse deinceps omnia arripiens, eiecit. at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea iuberēt ne puerū quoq; proiici, quū interrogasset, atque illi iussissent, ilico ipsū deiecit. Hic sanē singula vasa suis nominaturis probē nominavit. unde itelligi potest,

Secunda
species.

- neque imaginationē fuisse laesam, neque nominum memoriam deletam. Media verò cerebri, parte patiēte, ratiocinādi vis evertitur. Aut imaginatio simul & ratio ledūtur. Causa morbi est, vel sanguis exuperans, vel biliosus humor cerebrum occupans. Nonnunquā etiam ex bile perusta nascitur, quæ certe gravissimam phrenitidem contrahit. Febris continua & amētia infestant, plurimāque parte somnus difficilis, & vigiliæ comitatur. Interdum quoque somnus turbulentus accedit, ut consurgant ægri, exilient, furibundè vociferentur, verba sine ordine & sensu effundāt, interrogantibusq; nihil certi respōdeant. Oculos habēt cruentos, & sæpe perfricāt: interim aridos, interim lachrymantes. Lingua corū est aspera, & ex narib⁹ sanguis destillat, floccos festucāsque colligunt. Pulsus ad hæc exiguos, languidos, & quadantenus duros habēt. Spiratio magna & rara. Quibus sanguineus humor morbum fecit, ii cum risu insanunt: Quibus flava bilis, ferociter & tā immaniter sæviunt, ut coërceri nequeant: omnium, quæ dicunt faciuntque obliuiscuntur.
- Tertia species.**
- Causa.**
- Signa.**
- 3. Præ.**
27.
- Victus.**
- Decumbat æger in loco tū aëris, tum luminis tēperati, ac variis picturis libero, in quē amici quidem gratissimi ingrediantur, qui tamen non inopportunè interpellent, & nonnunquam blādè ac leniter alloquantur, nonnunquam acerbius increpent. Cibus primum

esto ptisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis medulla cum aqua mulsa, aut melle rosaceo sæpius lota. Oleribus vescatur, intybo, lactuca & malua elixis, & similibus, quæ refrigerare atque humectare possunt. In inclinatione morbi pisces quoque squamosi, & saxatiles dandi sunt. Mala etiam punica, cerasæque si multus intus cõficiat feruor, offerenda. Potus sit aqua decoctionis cinnamomi, aut hordei, cui admixtus sit syrupus violaceus, rosaceus, aut nymphææ, quem nenupharinû vocant. Hæc autem non confertim, hoc est, copiosè & celeriter ingurgitanda, sed identidem parciùs exhibenda: neque enim sitibundi admodum sunt, ut potum vehementer affectet. Atque hinc est quod Hippocrates lib. 1. Prænotionum, & lib. 6. Epid. par. 2. aph. 6. Brachypotas appellat. Vbi verò cõcoctionis notæ apparent in lotio, & febris non vehemens, sed lenior fuerit, atque vires nõ satis robuste, vinum tenue & dilutum (quod oligophorõ *ὀλιγοφόρον* nominant Græci) dandum. Quod tutius sit *εὐν.* in his qui sani hoc bibere consueverunt, & Vinum. venter natura imbecillum & frigidum sortiti sunt. In quiete denique ægri, quoad eius fieri licet, cõtineantur: si diuites fuerint, à famulis: si pauperes, vinculis. nam inordinata motio vires conuellit. Cæterum ubi morbus se remiserit, gestatione corporis uti conuenit. Balneum quoque aquæ dulcis, si

corpus squalidum aridumque fuerit, cōfert:
modo tepida fuerint. Cum enim humectent
& refrigerēt, non solū siccitatem, verū etiam
immodicas vigilias mētisque alienationem
vnā cū febre profligare possunt. Non sunt ta-
men nisi corpore prius vacuato, vt iam sæpe
monuimus, adhibenda. Officiū phreniticis
supra modum animi perturbationes: proin-
de nihil quod mœstitiam inferat, aut bilem

Curatio. creet, committendum est. Si vires ægri per-
venæ se- mittūt, sanguis protinus mitti debet: quoniā
ctio. non est salubrius aliud, neque præsentiū au-
xilium. Secunda autem cubiti vena, humera-
lis dicta, aut si ea delituerit, media: & quan-
tum tulerint vires, euacuandum. Nō tamen
vsque ad animi deliquium, vt nonnulli arbi-
tratur. præstat enim minus demere quā o-
portet, ob plurimā vehementis motus agita-
tionem, plurimūque laborē quo ægri affli-
ctantur. Prospiciendum etiam, ne clām eger
brachii vinculū soluat. Dein rectam in frōte
Auerſio. venam etiam incidere licebit. Quod si ætas
venæ sectioni obstiterit, tum cucurbitulæ cū
scarificatione occipitio & spinæ admoūdæ
erunt: quæ etiam hoc nomine conferre solēt,
quod à capite humorū defluxum in contra-
Clyster. rium auellunt. In hūc sanè vsum præstat cly-
steribus vti, hoc modo cōpositis. R. Foliorū
maluæ, violarū, intybi (quod scariolā vocāt)
laſtucæ, añ m. i. hordei decorticati § i. myxo.

rû (sebesten nominant) numero xi. Decoquã-
 tur in aqua sufficienti ad tertias. R̃ Colaturę
 lb̃ i. casię fistularis recens extractę § i s. mel-
 lis rosacei § i. olei violacei § iii. salis 3 i s. mis-
 sce, fiat clyster. Si volueris vt validius purget,
 adicienda erit hierę picrę, aut eclegmaris de
 succo rosaceo § s. Auertendi etiã à capite hu-
 mores, ligaturis extremitatum, frictionibus
 pedũ cum sale & aceto, ac similibus. Caput Localia.
 verò rosaceo vel oxyrhodino, tepidioribus
 irrigari oportet. Inflammato enim cerebro vel
 membranis eius, frigiditas tuta non est, sicut
 neq; vehemẽs caliditas. Frigiditas enĩ mea-
 tus constringit, neq; finit excrementa è capi-
 te discuti: at ingens caliditas feruorẽ conge-
 minat. In hunc vsum etiam conueniunt succi
 plantaginis, solani, & alia quorũ suprà facta
 est mentio. Si passio vehemẽtior fuerit, caput
 faciẽmque assiduẽ oleo in quo capita papa-
 uerum decocta sunt, fovebis. Odorẽ quoque
 naribus obiciemus, rosas, violas, flores nym-
 phæ, caphuram, camphoram hodie nomi-
 nãt: ac nares ipsas intus, vel frontẽ, ex iis aut
 similib. medicamẽtis illinemus. Nam sopire
 ac stupefacere principẽ facultatem oportet,
 cerebrum scilicet, quod supra modum inca-
 luit, refrigerando. Si vigiliã etiam vehemen-
 ter vrgent, quæ somnum conciliare possunt, Somni-
 qualia multa quæ suprà dicta sunt, huc transf-
 ferenda adhibebimus. Conferet autem inter

Vnguentum. cætera hoc vnguentū, quod R̄x vnguenti potest
 pulcōn 3 ii. olei violacei 3 iii. se. hyoscyami,
 corticis mandragoræ, añ 3 s. opii gr. ii. croci
 3 s. aceti parum, cerę albę quod satis est. Em-
 brocha. brocha etiam hæc tepida capiti adhibenda,
 quæ R̄x Florum violarum siccarum, rosarum
 rubearum, nymphææ, añ m 1 s. hordei excor-
 ticati 3 i. se. papaueris albi 3 ii. se. lactucę 3 iii.
 Decoquantur in aqua fontana sufficienti, &
 Digestio fiat embrocha. Postremum, vbi morbus iam
 resedit, mitiorq; factus est, id quod tertio die
 plurimum accidere solet, digerentia quæ re-
 liquias morbi discutere possunt, medicamen-
 ta admoēda erūt. In quem vsum priori em-
 brochę flores chamæmeli, anethi & melilori
 admiscere licebit. Sunt qui gallinas aut catu-
 los per medium fissos capiti apponant. Simi-
 liter sunt qui calidum pulmonem arietis, vel
 recens ex animali exceptum, vel aqua feruē-
 ti calefactum admoēcant. Si autem diuti-
 num iam malū fuerit, in oleo serpillum de-
 coquere cōuenit. Galenus lib. 11. & 13. Ther-
 meth. castoreo vtēdum esse phlegmone iam
 inclinante docet, quoniam non continuo lo-
 cis circa cerebrum, sed oīsibus interueniēti-
 bus occurrat. Inest autem ei medicamento
 & partium tenuitas, quod ipsum iis quorum
 per dēsa propugnacula transmitti vim oportet,
 est accommodum.

DE LETH'ARGO. CAP. XIII.

Lethargos passio phrenitidi cōtraria est. *ληθαργος*
 est enī marcor, & inexpugnabilis penē dor-
 miēdi necessitas. Hoc vitio correptis omniū
 rerum obliuio accidit, vt verbis nulla suppe-
 ditetur materia: hinc etiā nomen natūm *ληθκ.*
 est. Lethe enim Græcis obliuio est, Arge autē *ἀργκ.*
 captura, vel Arge iners: vt Lethargos non sit *ἀργή.*
 aliud, nisi iners obliuio, vel morbus obli-
 uionē inducens. Causa eius est pituita, quæ *Causæ.*
 frigore nimio & humiditate cerebrū imbuit.
 Lethargicos comitatur febris lenta. putrescit *Signa.*
 enim humor pituitosus in hoc morbo, Gale-
 no lib. 13. The. meth. teste, cum profunda in-
 somnum delatione. Pulsus his magni rarīq;
 sunt, & vndosi. spiratio nimis rara, & imbecil-
 lis. Somnolēti perpetuò sunt, desidiosi, igna-
 ui. Vix & tardē quocunque modo interpel-
 lentur, respondent. Oculos quandoq; ad vo-
 ciferationem aperiunt, & denuo claudūt, ad
 soporēmq; reuertūtur. Omnium veluti amē-
 tes obliuiscuntur. Oscitant crebro, & hiante
 ore aliquandiu persistunt, tāquam claudere
 id obliu. Ad meiendum vocati, porrectā ma-
 tulam manu tenentes, meiere obliuiscuntur.
 Deiciunt per aluum magna ex parte liqui-
 diora. Nonnullis contrā venter indurefcit.
 Urinam reddūt iumentis similem. Quidam
 ex eis tremiscunt, & sudoribus vndiquaque
 madent. Cubile, in quo decumbit æger, *Viētus.*

- Viſus.** ſpléndidum, lucidum & tepidum ſit. Gibi ſint attenuantes, incidentes, exiccantes, qui con-
diantur apio, anifo, cymino, pipere & ſimilibus. Ex auibus, montanæ auiculæ, pullus domesticus, perdix: olerib. porri, aſparagi, petroſelinum. Cremor auenæ, vel alica eius cum oxymelite, vel ſalibus, vel pulegio, conueniunt. Potus ſit hydromeli, aut vinū aquoſum, tenue & albū. Si vires permittunt, & nihil aliorum obſtiterit, Galeno lib. 13. Ther. meth. autore, ſanguinē ſtatim ab initio mittere expedit. Sin minus, clyſteribus acribus alius eluenda, de quibus in cap. de apople-
- Localia.** xia dicemus. Dein oxyrhodinum capiti ad-
mouendū. Nam repellendus à capite humor eſt, quiſquis is fuerit, eodem Galeno teſte. In quem uſum etiam friſtiones cū pyrethro, pipere, ſale, & aceto, ligaturęq; extremitatū cō-
ferunt. Odoramēta quoque excitatoria ad-
mouenda, veluti caſtoreum, funiculus extrin-
- Excitato** **ria.** **ſæ lucernæ, pix humida, bitumē, chalbanū,**
ſulphur, ſagapenum (ſerapinum vocant barbari) cornu ceruinum, abrotonum, & peucedanum. Extrema crurāque pungere, nonnūquam pilos etiam in ipsis vehementius euellere oportet, quò excitetur. Licebit etiam in aceto thymum, pulegium, & origanū, aliāque id genus incoquere, ac narib. ægri ad-
mouere, quò vapor ad cerebrū delatus, craſſitudinem humoris diſſecet. Palatum etiam

valentibus & acribus medicamentis, verbi gratiâ sinapi cum melle, antidoto Mithridati, theriaca, & puluere & pyrethri inungendū. Conariq; oportet, pituitam indidem affixā digitis eiicere. Ab his vero etiam sternutamētis vtetur: & si admittantur, apoplegmatis-morum vſus erit. At si iis affectus non discutitur, caput radēdum, deinde fouendum est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis. Ad hæc sinapismo vti in capite prodest, ex caricis & sinapi ex aceto contritis confecto. Postea cucurbitulas occipiti affigere cū plurimo igne oportet, circa primam & secundam vertebraſ. Caſtorio etiam caput illinendum. Quinetiam, vt Alexander Trallianus lib. i. cap. 20. docet idipſum potui dare cum oxymelite expedit. Nam vno hoc medicamento nonnulli miſerrime toto corpore impediti, ſanitati reſtituti ſunt. Præterea ad naturæ excretionē frequenter ſollicitare oportebit, tum clyſteribus, tum iis quæ vrinā mouent: pubem oleo rutaceo, cui ſit adiectum paululum caſtorei, aſpergere. Caterum vbi morbus inclinare inceperit, geſtatio ſtatim continua vtilis eſt, & balneum, quod ſuprà modum conferre ſolet. Siquidem Alexander Trallianus ſe cognouiſſe quempiam ſcribit, qui lethargo grauiſſimo laborauerit, adeò vt ſe leuari non ſentiret. Is poſt duodeuiginti morbi dieſ balneum ingreſſus, tantum ſenſit

Historia.

auxilii, ut à somno statim expergisceretur, aliosq; attente intelligeret, & ipse verba expedite faceret, familiares oēs agnoscens. Quod si verò æstū balnei, ob vires imbecillas ferre haud possit, saltē domi in solio aquæ calidæ lauādus erit. Cauendū tamen, ne aqua caput egrotātis perfundatur. Smegmate autē mordaciore in balneo detergēd^o, ut vini fece vsta sinapi, pyrethro, pipere, lauri baccis, calce viua, & similibus: quib^o duplū nitri addendū.

Kāgor.

DE CARO.

CAP. XIIII.

Subet.
Differen
tia cari
ab apo
plexia.

Alethar
go.

Causa.

Signa.

Viētus &

Caros est passio, quam sensuum vniuersarūmq; motionum priuatio, spirandi facultate manente illæsa, consequitur. Arabes Subet appellant. Differt ab apoplexia, quod in hac spiratio vehementer opprimatur, sic ut quis vel magno conatu vix spirare possit: In illo autem spirandi facultas, Galeno lib. 4. de patientib. loc. cap. 2. teste, haudquaquam lædatur. Distat etiam à lethargo, quod lethargici interrogati respondent, neq; omnino morti decumbunt. Caro verò laborantes, somni profunditate occupantur, ut si stimulentur, sentiāt quidem, nihil tamen dicāt, neq; oculos aperiant. Huius passionis frigidus ac crassus, aut omnino viscidus humor, causa est. Signa ex iis quæ dicta sunt, innotescēt. profunditate namq; somni occupantur, oculique in hac passione perpetuò conueniunt. Horum viētus & curatio cū lethargicis cō-

uenit, ad maiorem tantum incisionem at-
tenuationemque declinamus. Stomacho etiam
quæ calefaciant & corroborent, medicamen-
ta adhibenda, de quibus suo dicemus loco.

DE CATOCHA ET CATA-
LEPSI. CAP. XV.

Catocha & catalepsis Græcis, detentio
& deprehensio Latinis dici potest. Recentio-
res medici congelationem nominant. Est au-
tem detentio subita & occupatio tū mentis,
tum corporis, sensu ac motu priuati, ægro in
ea corporis figura permanente, in qua fuerit
correptus, siue sederit aut iacuerit, siue clau-
sis siue apertis oculis fuerit. Fit haud secus
atque priora mala, à frigido pituitosq; hu-
more, cerebri posteriora potissimū molesta-
te. Inuadit hoc mali hominem subito: vo-
ce præterea sensuque priuatur, nihil audit,
nihil respondet, respiratio nulla apparet, sed
quasi mortuus decumbit. Pulsus est paruus,
languidus, ac vehementer densus. Aluus &
vrina detinentur, nō quidem siccitatis ratio-
ne (plurimo enim humido eger abundet) sed
propter insensibilitatem. Differt à caro, quia
ut in hoc palpebræ perpetuò clauduntur, sic
in illa interdum apertæ manent. Viæ
ratio eadem est quæ lethargi. ægros enim
similiter nutrire confert, interim diebus sin-
gulis, interim vno interposito. Passio sanè
hæc periculosa est, si aut cibo aut potu erre-

Κατοχή.
ἢ κατὰ-
ληψις.
Conge-
latio.

Causa.

Signa.

Catoche
discrimē
à caro,
Viæ.

Curatio. tur. Huic etiam malo, præsertim si facies rubescit, & vires validæ fuerint, sanguinis missione securritur. Secunda autem in cubito vena exterior superiorve. Clysteribus etiã venter soluendus erit, aliãque omnia quæ de lethargi curatione suprâ diximus, adhibenda.

DE APOPLEXIA. CAP. XVI.

Apoplexia quid.

Apoplexia est, ubi patiente cõmuni nervorum principio, omnes corporis particulae motum simul & sensum amiserunt. Vel est

Causa.

priuatio sensus & motus in vniuerso corpore, cum functionum à volutatis imperio prodeuntium læsione subito superueniens. Fit à fridigo, crasso, lentoque humore, ventriculos cerebri principalissimos vna vice & cumulatim replere, quæ nimia cruditates ebriatatesq; frequentes potissimum procreant. Fit etiam ob causam aut ictum, cerebrum concutientes, atq; ut illuc confluant humores efficientes. Aëris etiam frigidi occursum, qui cerebri humiditates & supernacua coarctat, &

Signa.

constringendo exprimit. Qui in hanc passionem incidunt, sensu omnino carentes, mortui viuunt. Quapropter clausis oculis instar dormientium decumbunt, atq; stertunt. Interrogati, nihil respondet. Si stimulenter, nihil sentiunt. Discernitur verò passionis magnitudo ex noxæ, quam spirationi infert, vehementia. ubi enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: ubi autem paulum

Apoplexia magnitudo.

hil sentiunt. Discernitur verò passionis magnitudo ex noxæ, quam spirationi infert, vehementia. ubi enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: ubi autem paulum

impedimenti est, paruum in cerebro noxam
 esse conicere oportet. Omnium vero pessi-
 ma spiratio putanda est, quæ & intermittitur
 & magna cum violentia trahitur. Passio hæc
 nequaquam, aut raro curatur. Neque enim
 temere ab Hippocrate dictum est, Apoplexiā
 fortem soluere, impossibile: debile vero, non
 facile. Qui eius discrimen effugerint, in diu-
 turnam subinde passionem incidere solent,
 aut quibusdam membris, aut vniuerso corpo-
 re resoluti, sæpe etiam ratione violata. Qui
 igitur quoquo modo curationem recipiunt,
 iis statim sanguis ex vtrisque humerariis, mo-
 do plenitudo adsit, & virium robur, detrahē-
 dus est. Alius denique clysteribus acerbis du-
 cendus, qualis est qui R^x saluæ, origani, be-
 tonicæ, rutæ, añ m i. calamenti, hyslopi, pu-
 legii, añ m s. se. fœniculi, fœfeli (filer monta-
 num nominant) ammi, añ 3 iiii, centaurii mi-
 noris m i. polypodii 3 vi. agarici 3 iii. medul-
 læ colocynthidos 3 ii. Decoquantur in aqua
 sufficiens, vsq; ad medietatis consumptionē.
 R^x Colaturæ § xiii. hieræ picræ, benedictæ
 laxatiuæ, añ § s. eclegmatis Indi 3 iii. mellis
 rosacei § i. oleorum rutacei, costini, de casto-
 reo añ § i. salis gemmæ 3 i s. misce, fiat cly-
 ster. Cōmendatur etiam vsus glandium (sup-
 positoria nominant barbari) ex colocynthi-
 de, agarico, elleboro, & similibus confecta-
 tum. R^x pulueris colocynthidos, agarici, el- Glandes.

Curatio.

2. Aph.

42.

Clyster.

Glandes.

- lebori, añ 3 ii. salis gemmæ 3 i. mellis cocti
 3 ii. fiant glandes longitudinis sex digitorū,
 appenso filo vt ad arbitrium extrahi possint.
 Post hæc totum corpus oleo copioso calido
 inungendum. Extremis etiam corporis par-
 tibus ligaturæ, & frictiones vehementes, cū
 decocto radicis iridis adhibendæ. Cucurbi-
 tulæ etiam humeris affigendæ. Caput deniq;
 prius rasum, irrigandum oleo anethino, ru-
 taceo, aut eo in quo prius serpillum, aut cala-
 mintha decocta sit. Naribus admouenda ea
 quæ odore suo excitant, vti est opopanax, ca-
 storeum, sagapenum, galbanumq;. Sternuta-
 mentorum etiam ratio habenda erit, quæ ex
 struthii (cōdisi appellant) ellebori albi, & ca-
 storei puluere naribus indito constent. Em-
 brochæ. Embrocharū etiam vsus conueniet, quæ ex cha-
 mæmeli, meliloti, saluiæ, pulegii, maioranæ,
 origani, calaminthæ & saturciæ decocto cō-
 ficiētur. Sinapis mis quoq; vtendū (emplastra
 hodie rubrificantia vocāt) in hunc vel simile
 modum confectis. R. olei costini 3 i. oleorū
 castorei, euphorbii añ 3 iii. sinapi 3 ii. casto-
 rei 3 i. sagapeni, euphorbii añ 3 s. aceti 3 i s. ce-
 ræ q. s. ad incrassandum: fiat emplastrum. Sar-
 tago præterea, vt docet Razes, calefacienda,
 & capiti calida admouenda. Oportet autem
 & ori per vim aperto digitum vel pennam
 oleo irino madefactam inferre, vt ea quæ in-
 sunt eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis quæ

flatus educunt, ruta, cumino, nitro, & melle
illinenda. Vbi passio se remiserit, cibis mol- **Viſus.**
lis, distribui facilis, & succulētus assumetur.
Si vox nondum redit, & vires permittunt, cu-
curbitulæ occipiti cum scarificatione affigā-
tur. Si fieri possit, etiam hypochondriis. AÆ-
gri deinde gestabuntur curru, lectica, aut le-
cto pensili. Potus sit hydromeli. Post vigesi-
mum primum diem, ægroti balneo creden-
tur. Sed de reliqua curandi ratione in capite
sequenti plura.

DE RESOLUTIONE. CAP. XVII.

Paralysis Græcè, Resolutio latine, est, Ga- **παράλυ-
σις.**
leno lib. 3. de Patiētib. loc. cap. 10. autore, vbi **Resolu-
tio.**
alterum latus, aut dextrum aut sinistrum, sen-
sum & motum amiserit. Interdum etiam in
vna duntaxat parte, manu scilicet, crure, lin-
gua, accidit. Quum verò per resolutionē in-
terdum sensus duntaxat, interdū motus, nō.
nunquam ambo simul pereant (cuius rei cau-
sam reddit Galenus lib. 1. de Symptomatum
causis, cap. 4.) nervorū resolutio potissimum **Causæ.**
dicitur, vbi motus deperditus est. Generatur
quidem à multis crassis & viscidis humori-
bus, nervos obstruentibus, impredientibúsq;
ne animalis facultas è principe parte ad mē-
bra delabatur. Hac ratione refrigeratio ex ni-
ue, cōpressio nervosorū corporū, resolutionē
efficere possunt. Ad eius passionis noti **Signa.**
tiam non opus est multis indiciis. si enim

Viſtus.

motu pars aliqua corporis deſtituitur; reſo-
lutione affectam eſſe nemo non videt. A qua
verò cauſa factus ſit morbus, partim ex ægri
relatione, partim etiam ex notis ſuprà de do-
lore capitis ex pituitofis humorib. orto com-
memoratis, deprehendere licebit. Viſus ratio
in vniuerſum attenuatoria ſit, & ſiccans. Ver-
ſetur igitur æger in aëre calido & ſicco, pri-
misque tribus dieb. tenuiſſimo vtatur viſtu.
hoc eſt omnimodā in ediam ſuſtineat, aut ſo-
lius melicrati exhibitione, aut ptisanæ ſucco
paucō contentus ſit. Dein cibi boni ſunt, i. &
concoctum faciles, aſſi que exhibēdi, cuium
potiſſimum carnes mōtanarum, & perdicū,
oua ſorbilia, amygdalæ, & pinæ. Vtatur
etiam fœniculo, petroſelino, hyſſopo, ma-
iorana, ſaluia, & ſaturcia. Viter piſces, fru-
ctus, & omnia frigida & humida. Potus ſit
modicus ſitimq; quā poſſunt maximā ſu-
ſtineant. Bibant autem hydromeli, cui ſaluia
aut cinnamomum admixtum ſit. Aut vtatur
potione quæ hodie Hippocras nominatur;
ſic confecta. R. cinnamomi ꝯ ii. zingiberis
ꝯ s. piperis longi, granorum paradifi, acori
(galangā vocāt barbari) añ ꝯ i. cardamomi ꝯ i
s. nucis myſticæ, gariophyllorū, maceris añ
ꝯ i. Decoquatur in aquæ fontanę lb. vi. quoad
quarta pars, hoc eſt lb. i s. fuerit abſumpta.
Refrigerata colentur & exprimantur, ac ſac-
chari lb. s. dulceſcat liquor colatus, & fiat po-

Hippo-
cras.

tio. Vino nō vtatur, donec morb⁹ ex integro
 deficiat. aut si fieri vix possit, vt tanto tēpore
 æger vini potione careat, detur quidē, at nō
 nisi modicū aquosūmq; & in morbi inclina
 tione. Mot⁹ & exercitiū, si iis vti poterit, sum
 mē cōferūt. Somnum fugiat diurnū, noctur
 nus sit mediocris. Gaudeat & animi perturba
 tiones euitet. Curandi ratio, si iusserit etas, **Curatio.**
 habitus corporis, tēpus anni, & similia, à san
 guinis missione aspicietur, potissimū si ple
 nitudinis signa affuerint. Oportet tamē abla
 tionem esse moderatam, ne corpus refrigere
 tur, sanguisq; à partibus incolumioribus au
 ferēdus. Quibuldā verò dieb. post sanguinis
 missione trāfactis, alius primò clysterib. ir- **Clyster.**
 ritetur huiusmodi aut similibus. R̄ Maluē, al
 thææ, mercurialis, camomillæ, saluicæ, betoni
 cæ M i. stœchadis arabicæ § i. rutæ, calamin
 thæ, añ M s. se. fœniculi 3 iii. Decoquātur in
 aqua, quoad tertia pars absumatur. R̄ colatu
 ræ lb. i. benedictæ laxatiuæ § s. electu. Indi 3
 iii. mellis rosacei § s. oleorū laurini, irini, ru
 tacei, añ § i. salis 3 i s. misce, fiat enema. Dein **Prepara-**
 decocta & syrupos, pituitosos humores ad **tio hu-**
 expulsionem præparantes, exhibebis, quo **morum.**
 rum copia suprā cap. octauo habetur. Præ- **Purgatio**
 paratis ad educationem humoribus, quæ illos
 euacuent, propinanda medicamenta erunt:
 qualia sunt, præter ea quæ cap. iam citato cō
 memorauimus, pilulæ azaiaret, arabicæ, fœ-
 d

Capitis
purga-
tio.

tidæ, quibus nunquam non agaricum admi-
scendum erit. Non autē semel, sed iterum at-
que iterum purgandi sunt ægri, diebus qua-
tuor vel quinque interpositis. Post purgatio-
nes verò, theriaca & Mithridati antidot^{us} vti-
lissima est. Post totius corporis euacuationē,
sternutamentis, apophlegmatissimis, gargari-
smis, odoramētis, & aliis cap. octauo produ-
ctis vtendū. Capiti denique, vnde totius mor-
bi radix exoritur, calida medicamenta illi-
nenda erunt: vt sunt castorium, peucedani ra-
dix, menta, baccæ lauri, irino oleo, cui parū
aceti adiectū sit, incocta. Quòd si itaq; aëris
ambientis frigiditas non impediat, caput ra-
datur, totūque vsq; ad frontem inūgatur.

Discutiē-
tia.

Cæterū ea etiam quæ discutiunt medicamen-
ta, iis locis vnde nervi ad patientem partem
sensum aut motum, vel vtrunq; deferentes o-
riuntur, admouenda erūt, quemadmodū Ga-
lenus lib. 3. de Affec. lo. cap. 10. elegātī histo-
ria de Pausania sophista docet. A leuioribus
verò semper auspicandū, nēpe ab oleo cha-
mæmelino, anethino de spica, liliaceo, & iri-
no, quibus etiam membra ipsa affecta fouen-
da sunt: quæ etiam hoc nomine vt calefiant,
lintheis, aut pelle vulpina, & similib. operien-
da erunt. Aut cum decocto saluiæ, maioranæ
chamæmeli, hyperici, stæchadis & rosinari-
ni fouenda. Progrediendum deinceps ad va-
letiora, oleum costinum, vulpinum, ruta-

ceum, laurinum, de vermibus, de castoreo,
 de laterib. (quod etiā philosophorum nomi-
 nāt) & de euphorbio. Quib⁹ interdū adiciū-
 tur vnguenta Agrippæ, marciatōn, arragōn:
 & alia medicamenta simplicia calida, vt est
 betonica, saluia, rosmarini flores, radix aco-
 ri (galangam nominant) verbasculum odo-
 ratum (herbam paralyfis vocant) ruta, cala-
 mintha, pyrethrum, piper, castoreum, & eu-
 phorbiū, in hunc aut similem modum. R̄ vn Vnguen-
 guentorū arragōn, marciatōn añ § i. vnguen-
 ti Agrippæ § s. oleorum costini, vulpini añ 3-
 v. olei de vermib. § s. olei de castoreo 3 i s.
 pulueris betonicæ, piperis, saluiæ añ 3 i. ca-
 storci euphorbii añ 3 s. radicis galangæ 3 ii.
 ceræ quod sufficit. fiat vnguētum. Vel sic. R̄ Aliud.
 oleorum costini § ii. de piperib⁹ § i s. olei de
 euphorbio 3 ii. vini sublimati (aquam vitæ
 aliās vocant) § ii s. succorū saluiæ, verbasculi
 odorati, hoc est herbæ paralyfis, añ § i s. ra-
 dicis galāgæ 3 iii. stœcbadis arabicæ, florum
 rosmarini, añ 3 ii. pyrethri, piperis, añ 3 i. eu-
 phorbii 3 s. Contundantur contundenda, &
 omnia simul quoad vinum & succi absumā-
 tur, decoquantur. Dein exprimantur olea, &
 addatur ceræ quod sufficit, fiat vnguentum
 molle in modum linimenti. Eadem etiam ra-
 tione emplastra cōponi possunt, in cū vel si- Empla-
 milē modum. R̄ Baccarum lauri, pyrethri, strum.
 piperis añ 3 ii. galangæ 3 i, stœchadis arabi-
 d ii

Cucurbitulæ. cæ, betonicæ, sambuci, añ 3 i s. sinapi, nigellæ, añ 3 i. euphorbii, castorei, añ 3 i. olei costi-
ni 1 s. olei de piperibus 1. olei de euphor-
bio 3. iii. cum cera & resina, quod satis est, fiat
emplastrum. Porro mēbris affectis cucurbi-
tulæ sunt applicandæ, citra tamen scarifica-
tionem. Et si cucurbitulis idonea nō fuerint,
vincinis imponendæ. Post cucurbitulas præ-
dictis vnguentis & linimentis, sic tamē vt prius
Balneū. fricentur membra affecta, vtendum. Neque
paruam vtilitatem præstabit laconicum: & si
haberi possunt, thermæ sulphuræ, alumino-
sæ, & saluginosæ supra modū cōferent: qua-
les sunt in Germania nostra Badenix, Fering
iuxta syluam Martianam, & Cellenses. quas,
gestatiōes in curru, vehiculo, aut lectica præ-
cedere debent.

DE MORBO COMITIALI.
CAP. XVIII.

Επιληψία. Epilepsia Græcis dicta est hæc passio, q̃
nimirum sensum capitis, atque mentem pa-
riter apprehendat. Comitialis autem, quod
hac passione correpti, in comitiis maxime
manifestabantur, comitiāq; quo die aliquis
concidisset, interrumpēbatur. Est autem, Ga-
leno lib. 3. de Patientib. loc. cap. 5. teste, con-
uulsio omnium corporis partium, non per-
petua, sed quæ ex tēporum accidit interual-
lis, cum mentis ac sensuum obliuione. Gigni-
tur hæc passio trifariā. Primū, vbi cerc-

**Comitia
lis mor-
bus.**

Causæ.

brum primogenia passione patitur. id quod fit, ubi crassus viscosusque pituitæ vel atræ bilis humor spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruit, nervorum principio seipsum quatiente, quod excutiat id quod noxium est. A crasso autem humore hanc passionem induci, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Secundò fit per consensum oris ventriculi male affecti, dum scilicet cerebrum excutere nititur, quicquid ad illud à stomacho elevatur. Sic Galenus lib. 5. Cap. 5. de Patientibus. locis, Grammaticum quendam iuvenem fuisse scribit, qui quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceret, comitiali passione corripiebatur: idque non alia ratione, quam quod os ventriculi, utpote quod facile sentiebat, pateretur: ac deinde per consensum & totum cerebrum, & corpus uniuersum conuulsione concutiebatur. Tertiò fit, sed rarò, cum à parte aliqua veluti quædam frigida aura sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit. Hoc genus passionis comitalis, Galenus lib. 3. de Patientibus. loc. cap. 7. scribit se vidisse in puero, qui tertiumdecimum ætatis annum agebat. Cum enim adolescens etiam dum cum optimis eius tempestatis medicis conuenisset, ad idoneam inueniendam curationem, audiuit tum narrante puero, affectum ipsum à crure initium capere, mox illinc rectè ascendere per

d iii

Signa.

femur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrū perueniret. quod cum primum tāgeret, ipsum haudquam sibi constare. Præcedit hāc passionem corporis animiq; status minime volūtarius, tristitia, eorum quæ perceperūt obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiúsque repletio continua, iracūdia, pallor faciei, & linguæ inordinatus motus. Quum primū inuaserit malum, ægri concidunt, conuellunturque, stertunt, ac vociferantur interdum. Nonnulli tremunt, atque circumaguntur Sed peculiaris admodum morbi nota est oris spuma. Non desunt etiam, quibus vrina & stercus præter voluntatem excernitur, nonnullis & genitura. Quibus ab ore ventriculi vitiū oritur, palpitatio ipsius præcedit, turbatio & erosio. Ex inedia seu cibo tardius assumpto, excandescunt, & affliguntur. Occupat hoc passionis genus maximè pueros, eosque adhuc paruulos, quòd videlicet humidior cerebri tēperamēto præditi sint: quam ob causā Pædicos, hoc est infantilis seu puerilis morbus nominatur. In quibus acutissima est passio, statim iugulat, & crebris accessibus, & symptomatū vehemētia. Plurisque autē longa esse solet. Nā si non pubertate, vel mēstruorū initio, vel puerperio solutus fuerit, sepe vsque ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem fuerit

Puer cur
passione
comitia.
li corri-
piantur.

παιδι-
κός.

5. Aph. 7

affectus. Ratio victus utilis est, quæ incidit, **Victus.**
 & extenuat. Aëris itaque constitutio, in quo
 æger versetur, sit calida & sicca, potissimū si à
 pituitoso oriatur humore. Caparis esus miri-
 ficè prodest. Fugere oportet carnes omnes,
 præter auium montanarū, legumina, pisces,
 & vinum, præsertim antiquum crassum & co-
 piosum. pro quo bibat hydromeli, aut vinū
 aquosum & dilutū. Exercitia prosunt, & fri-
 ctiones, sed capiti post omnes reliquas cor-
 poris partes adhibitæ. In balneo mora diu-
 turna obest. Deuiter coitū liberaliorem, mo-
 deratus autem prodest. Somnus sit nocturn⁹
 & mediocris, caueat impensè diurnū. Fugiat
 sinapi, allia, cepas, & eiusmodi, potū statim
 à balneo, potissimum vini meracioris. Si in-
 fans ægrotus fuerit, non admodum medica-
 mentorum præsidii subuenire studebimus.
 nam ætate ad calidiorem sicciorēque sta-
 tum vergente, & victu moderatiore, sua spō-
 te plerūque morbus finitur, Hippocrate qui-
 dem teste, qui sic scriptum reliquit: Quicun-
 que iuvenes passione comitiali laborant, mu-
 tatione maximè ætatis, & temporum, & lo-
 corum, & victuum quoque liberātur. Proin-
 de solius nutricis ratio habenda erit, ac lac il-
 lius emendandum, utq; calidius & subtilius
 efficiatur conandū. Quapropter nutrix boni
 succi cibis vtatur, ante cibum exerceatur, coi-
 tum vitet: à viri siquidem consuetudine lac

Curatio
 infantium.

2. Aph.

45.

Curatio
adulto-
rum.

odoris gratiam in deterius mutat, & humi-
dius efficitur, ac menstrua eliciuntur: & præ-
scripta paulò antè victus ratiõe vtatur. Capi-
ta tamen infantium assiduè oleo anethino &
irino inungenda, neque vnquam vel calida
aqua frigida vel lauanda, multo minus tota
immergenda, madefaciendaque. Dato etiam
ad elingendum mel despumatum, ac collo su-
spēdito radicem pæoniæ viridem. Qui post
annos pueriles in passionem hanc prolabun-
tur, eorum partes cōuulsæ ac distractæ inun-
gi, irrigari, & in rectum dirigi debent. Dein-
de os aperiendum, cuncusque dētibus inter-
ponendus, ac penna oleo irino illita, pituitę
extrahendæ gratia, vomitus prouocandus.
Odoramentis etiam sensum excitare conue-
nit, peucedano videlicet, ruta, & bitumine.
Perseuerante exacerbatione, medicus auda-
citer & violenter illorum maxillas distrahat,
infundatque in os castoreum cū oxymelite.
Clysterem etiam acrem excitatis iam iniice-
re oportet. Qui conualescunt, viribus antea
recreatis, hiera Galeni, aut ex colocynthide
purgandi sunt. Hęc saue noui & acuti morbi
comitialis curatio est. deinceps quomodo
inueterato succurratur, trademus. Oportet æ-
gros diu aquā bibere, atq; initio curationis,
nisi quid prohibeat, sanguinē ex vena popli-
tis mittere. Interpositis quatuor aut quinque
diebus corpus reficere, ac medicamēta exte-

Curatio
comitia-
lis inuete-
rati.
Præpara-
tio.

nuātia propinare expedit, syrupū de absinthio, de hyssopo, de stœchade, oxymeli scyliticum, decoctum hyssopi, radicis pæonia, & alia quæ suprà Cap. 8. cōmemorauimus. Dein purgantibus medicamentis vacuandi sunt, nempe pilulis cocciis, de agarico, & similib. loco iā citato productis: idq; si pituitoso humore passio orta fuerit, faciendum. Si verò ab atra bile cœperit, ea quæ humorē hunc vacuare possunt, exhibēda, quæ in cap. de Melancholia recēsebuntur. Vbi satis purgatus est æger, ad balneum ducendus. Tercio die hypochondriis & scapulis cucurbitulæ cum scarificatione affigendæ sunt: tū quibusdam diebus corpore reficiendo interpositis, rursus hiera Galeni purgandus erit. Post ea capiti & occipitio cucurbitulæ admonendæ. Sequenti die panis in mulsa coctus, additis amygdalis amaris, aut serpyllo, aut calaminta, aut menta, aut ruta, cataplasmatibus instar capiti applicandus. Atq; id tribus diebus efficiēs. Mox caput de rasis capillis, peucedani succo in aceto diluto, in quo serpillū aut iris incocta sit, perungendum. Rursus interea corpore recreato, purgandus æger erit. Quo peracto, sternutatoria, apophlegmatismos, & ea quæ per nares purgāt, adhibebis. Tempore interposito, si necesse videbitur, Discutiē: clystere aluus eluenda erit. Tandē vnguentia medicata, linimenta, & emplastra, quibus discutiē: camenta.

di vis inest, applicanda: quorum in præcedē-
ti cap. mentio facta est. Quædam deniq; sunt
medicamenta, quæ naturæ quadam proprie-
tate comitiali morbo aduersantur: vt est ra-
dix pæoniæ, visc⁹ quercinus, cornu ceruinū,
ossi humana cōbusta, & alia multa, quæ recē-
sentur à recentioribus. Si verò ob passionem
Curatio epilepsie
ex stoma-
chi vitio. primariam stomachi passio comitialis con-
tingat, sollicitudo habenda est, vt eger probè
concoquat. Panis igitur diligenter confectus
ex vino antiquo tenui & albo, cū aliquo co-
rum quæ leniter adstringūt temperato, circa
horam tertiam diei assumendus. Item hieram
picram bis tēve singulis annis dare expedit,
Si à parti-
cula qua
dā oritur
morbus. vt copiosè cum de stomachi morbis agetur,
dicemus. Vbi autem ex particula quadā hæc
passio inuadere percipitur, siue ea manus, si-
ue pes fuerit, fune excipi debet quæ superpo-
sita est. Cum remittit, peracta totius corpo-
ris inanitione, prius inunctionibus excalfa-
cere corpus oportet: deinde medicamenta
quæ rarefaciunt, & malam temperaturā par-
tis, vnde malum oritur, emendāt, apponēda.
Succedente etiam tempore sinapismis locus
irritandus erit. Post quæ theriaca, & natura-
lia balnea locum obtinent.

DE INCUBO.

CAP. XIX.

ἑφιάλ.

της.

Incubus.

Ephialtes Græcis passio, quam Latini
Incubum & incubonem nominant, vbi ali-
quis noctu se grandi mole opprimi, inua-

diſque ab alio credit. Fit id vitii ex crapula,
 & continua ventriculi cruditate, vnde vapo-
 res craſſi & frigidi eleuati, cerebri ventricu-
 los replent, prohibētes facultates cerebri per
 nervos diffundi. Comitantur eo detentos
 difficilis mot⁹, torpidus in ſomno ſenſus, ſuf-
 focationis imaginatio, & veluti ingruentis
 alicuius occupatio. Ad hęc vox ſupprimitur,
 aut incerta indiſcretāq; editur. Quidam ita
 inanibus imaginibus afficiūtur, vt in ſe graſ-
 ſatos audire credāt. Cum plurima tandē an-
 xietate attenuato ſpiritu & diſcuſſo, atq; aper-
 tis meatibus, repente excitantur. Occurren-
 dum igitur huic malo per initia. Nā perſeue-
 rans, & aſſiduē inuadēs, grauius aliquod ma-
 lum, vt apoplexiā, morbum comitiale, aut
 maniā prænūciat ac inducit, craſſo humore
 in ventriculis cerebri ſenſim collecto. Vi-

Signa.

Viſus.

Curatio.

Localia. localia adhibere medicamenta oportet, vt in
 precedentibus monstratū est. Succurrit eisdē
 semen pronia nigrū. Dāda verò sunt potui
 grana quindecim, trita ex aqua. Caput etiā
 fouendum anethino oleo calido, & pileo te-
 gendum, dum cubitum eūt. Intra corpus ex-
 hibenda, quæ caput corroborant, aromaticū
 rosaceum, diamoschi dulcis confectio, pliri-
 farcoticon, diambra, dianthos, & eiusmodi.

DE MELANCHOLIA. CAP. XX.

Melācho Melancholia mētis est alienatio, seu de-
lia quid. sapientia, sine febre. Fit interdum quidē vni-
Causa. uerso in venis sanguinē melācholico effecto,
 ob commune sanē vitium, cerebro quoq; ip-
 so simul læso. Nōnunquam verò, quādo re-
 liqui corporis sanguinis prorsus innocu^s est,
 solus autem is qui in cerebro contentus est,
 alteratur. idque bifariam cōtingit. Aut enim
 aliūde in ipsum deriuatur, aut in ipsomet ge-
 nita est, quum videlicet internus calor aut fla-
 uam bilem, aut crassum atrūque sanguinē
 superassauit. Interdum etiam ob inflammata
 & malē affecta circa ventriculum hypochon-
 dria prouenit, quæ modò auram quandā ma-
 ligniorem, modò substantiæ humoris partem
 ad cerebrum sursum transmittunt. Quemad-
 modum enim aliqui frequēter eleuata à ven-
 triculo fuliginosa quadam aut fumosa exha-
 latione, aut omnino crasso vapore quidpiā
 suffusioni simile præ oculis obici sentiūt: sic

ascendente ad cerebrum melancholica exhalatione, tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentem accidunt. Atque adeò tres sunt in vniuersum melācholiæ species. Vna, quando totum corpus melancholico sanguine abundat: Altera, quādo idem cerebrum ipsum solū occupat: Tertia, quando hypochondria ipsa primò male affecta, in consensum cerebrum ducunt: & hæc melācholiæ species hypochondriaca & statiosa dicitur. Cōmunia omniū signa sunt, metus, tristitia, odium, & auersio hominum, iuxta hoc Hippocraticū: Si timor atq; morositia longo tēpore habentes perseverent, ex eo, atra bilis significatur. Item alii se credunt animalia bruta esse, & voces ipsorum imitantur. Sic Galen. lib. 3. cap. 6. de patientibus locis scribit fuisse quendam, qui se gallum esse putauit: ideòque gallos cantare audiens, ut hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatiens, gallorum sonum imitatus est. Alii vasa fictilia & testas se esse arbitrantur, atque idcirco obuiantibus, ne collidantur, cedunt. Hi mortem expetunt, illi eandē expauescūt. Nonnulli semper ridēt, Democritūq; agunt: aliqui Heraclitū, semper plorātes. Alii putāt se numine afflatos esse, & vaticinantur futura. Peculiares autem notæ illorum hæc sunt.

Qui ex totius corporis consensu melācholia laborant, iis gracilis corporis habitus, ni-

Tres melācholiæ species.

Signa cōmunia.

6, Aph.

23.

Melācholicorū variæ imagines.

Signa peculiaria.

ger, hirsutus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel ex acquisito per solitudines quasdam, aut vigilias, aut prauorum ciborum usus, aut hemorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex hypochondriis vitium contraxerunt, eos sanè cruditates, acidi ructus, ardor, hypochondriorum grauitas argunt: hypochondria quoque sursum conuelluntur, & nonnunquam inflammatione conflictantur, idque potissimum circa mali exordium. Deinde ubi id ipsum accreuerit, atra bilis comitatur symptomata, quæ utique concoctione, vel excretionem, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu leuantur. Quum verò nullum ex iis, aut certe pauca circa ventriculum eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum per se & primaria passione vexari, atraque bilis humore affici declarant. Hi autem inter cetera, vnam aliquam rem fixis ac intentis in eam prorsus oculis, diutius intuentur. **Vitus.** Vitus ratio talis sit, quæ atram bilem minime procreet: quapropter in aëre versetur calido & humido. Cibis vescatur boni succi, humidis & temperatis, pane in clibano cocto ac probe confecto, carnibus caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum, piscibus saxatilibus & eiusmodi. Vitet cibos qui melancholicum efficiunt humorem, quos diffusè Galen. lib. 3. de patientibus. loc. cap. 6. commemorat. Vinum bibat tenue, album, neque valde antiquum: crassum verò & nigrum vi-

tet. Exercitium sit mediocre, equitatio aut
 deambulatio per loca amœna & viridia, aut
 nauigatio. Balneo aquæ dulcis, quo se vno
 præsidio cū victu humido, Galenus morbum
 hūc vbi nondū in longū esset protractus, cu-
 rasse scribit, frequenter vtatur. Somnus illi su-
 pra modū confert, veluti etiam coitus, at mo-
 deratus. Gaudeat & lætetur, in hocque habe-
 at qui cātu aut aliis musicis instrumentis hi-
 laritatem excitent. Vbi vniuersum corpus
 sanguine melancholico abundauerit, curan-
 di rationem à venæ sectione auspicari oportet. Secunda autem est, Galeno loco iam cita-
 to teste, cubiti vena: præcipuè autem me-
 dia, quæ scilicet communis est & ei quæ hu-
 meraria nominatur, & ei quæ per axillam ad
 manum fertur, iecoriæque dicitur. Vbi verò
 solum cerebrum sanguinem melācholicum
 continet, eger sanguinis detractione non in-
 diget, nisi fortè multum sanguinis sit, ac præ-
 seruationis gratia venam incidamus. Quum
 itaque ex primaria cerebri passione melan-
 cholici efficiuntur, frequentibus balneis, vi-
 ctu boni succi, & humido, & minime fla-
 tuoso, vnà cum decenti animi delectatione,
 sine alio potentiori remedio curandi sunt.
 cum humor qui molestat, nondum ob tem-
 poris lōgitudinem vt excernatur contumax
 est. Si enim malū aliquādiu durauerit, tū va-
 lētiora magisq; varia medicamēta adhibere

Curatio.

Decoctū
præpa-
rans.

oportet. Siue igitur ex totius corporis cōsor-
tio, facta prius, vt diximus, sanguinis detra-
ctione: siue solius cerebri primario affectu-
melancholia orta fuerit, medicamenta quæ
per inferna purgāt, exhibere oportet. Inter-
positis tamē aliquot à venę sectione diebus,
hoc decoctum in aurora bibat, quod R^x Flo-
rum boraginis, buglossę, violarum M^r. passu-
larum mundatarum § i. hemionitidos (scolo-
pendriam vocāt) M^r. fumiterræ M^s. corticū
radicum capparū, tamaricis, añ. 3 iii. radicū
fœniculi, petroselini, glycyrhizæ añ 3 i. thy-
mi, epithymi añ 3 s. Decoquantur singula in
lb iii. aquæ, donec tertia pars absumatur: de-
in colentur, atque saccharo sufficienti dulce-
scat colatura, & adiiciantur syrupi de fumo-
terræ, syrupi de epithymo añ § ii. & fiat po-
tio. In eundem vsum hodie exhibent syrupū
violaceum, de buglossa, adiectis aquis scolopendriæ,
lupi salictarii, intybi domestici (en-
diuiam appellant) & buglossi. Ego tamen a-
quarū distillatarū & ignis cōmertio expres-
sarum vsum, vetriculo potissimū, noxium
esse arbitror. atque adeò multo consultius ef-
se puto, vt prædictarum herbarum decoctis
vtamur, ac syrupis in hunc modū admiscea-
mus. R^x Syrupi de buglossa § i. syrupi de epi-
thymo § s. decocti scolopendriæ, fumiterræ
& endiuicę § iii. misce, fiat potio. Post hæc cor-
pus purgetur eclegmate hamech appellato,

& diasenæ: catapotiiis Indis, de lapide armeno, & similibus. Proderit autē hoc decocto purgante vti. *Rx* Florū buglossi (boraginē hodie appellant) florum violarum & rosarū añ m i. passularū mundatarum, tamarindorū añ § i. myrobalanorū cēruleorum (indos vocāt) luteorū (citrinos nominant) empeliticorum, beletzicorū añ § s. folliculorū senæ, polypodii añ 3 vi. prunorū damascenorū numero x. Coquātur in aqua sufficienti, ad tertias. deinde coletur, & saccharo dulcescat colatura, & de ea exhibeantur § iiii. In quibus, si non satis purget, licebit dissolvere 3 ii. eclegmatis diasenæ Mirificè etiam cōferet dilutum epithymi, in eum modum compositum. *Rx* Epithymi § s. maceretur in § iiii. feri caprini, horis 24. deinde validè exprimatur & coletur, atque in aurora propinetur. Et hoc, quod *Rx* Foliorū senæ § ii. prunorum damascenorum numero xii. Contundantur & macerentur in sero caprino horis viginti quatuor: deinde exprimantur & colentur, vt suprà. Licebit & hoc puluere vti, q̄ *Rx* epithymi § s. lapidis armeni, agarici añ 3 ii. scāmonia præparata 3 i. gariophyllorum numero xx. Redigātur singula in puluerem, & detur singulis septimanis 3 i. vel 3 s. Neq; temerè etiā quis à purgatione interiectis quibusdam diebus clysteribus vtetur, vt qui à capite auertere possint. *Rx* Fumiterræ, lupi salictarii, thymi añ m i. *Clyster.*

Decoctū
purgās.Dilutum
epithymi.Dilutum
foliorum
senæ.

Puluis.

epithymi m s. senæ polypodii añ 3 vi. carta-
 mi § s. seminū anisi, fœniculi, ammi, cumini,
 añ 3 ii. Coquātur vsq; ad tertias. R̄ colaturæ
 lb̄ i. Cui e fistularis recēns extractæ § i. ecleg-
 matis diasenę § s. oleorū, violacei, camomille
 añ § i s. salis cōmunis 3 i s. misce, fiat clyster.
 Porro si hæmorrhoidibus aut mensibus sup-
 pressis malum fuerit cōcitatum, horū quoq;
 purgationem moliemur, Hippocrate sic præ-
 cipiente. ait enim, Atra bile vexatis, hæmor-
 rhoides superuenientes, bonum. Et rursus,
 6. Aph. Insanētibus si varices vel hæmorrhoides su-
 11. peruenerint, insanix solutio. Ceterū danda
 6. Aph. 21. „ Corrobo etiam sunt medicamenta, quæ lætitiā pariūt,
 rantia. atque vires reficiunt: vt sunt cōseruæ buglos-
 si seu boraginis, intybi domestici, violarum,
 Balnea. lætificans Galeni vocatum, dianthos, & simi-
 lia. Nulla denique ratione, vt antea quoque
 monuimus, balneorum dulcis aquæ vsus ne-
 Embro - gligendus. Embrochæ etiam, quæ caput hu-
 cha. mectare possunt, adhibeantur. R̄ Maluæ, al-
 thææ, violarū añ m i s. camomillæ, stœcha-
 dis arabicæ añ m i. florū nymphææ m s. se. la-
 ctuæ 3 i. Bulliāt in aqua sufficiēti, & fiat em-
 brocha, quæ raso capiti admoueatur. In hūc
 etiam vsum conuenient inunctiones ex oleo
 violaceo, nymphææ, & similib⁹. Studiose de-
 niq; annitēdum, vt imaginationes peruersæ
 & immēsa mœstitia, quacunque fieri potest
 ratione, propulsentur. In hunc sanè modum

Alexāder Trallianus lib. i. cap. 22. mulierem *Historia.*
 quandam sanitati restituit: quæ melancholie
 malo correpta, inter dormiendum anguem se
 deglutisse putabat. Ciens enim ei vomitum,
 anguem extinctū pelui, qua vomitionē exci-
 piebat, clandestinē inseruit: quem simul atq;
 conspexisset melancholica, euomisse rata, om-
 nem suspicionē falsam posuit, & talua eua-
 fit. Præterea si ob hypochondriorum offen- *Hypo-*
 sionem passio constitit, & horum habenda *chōdria*
 sollicitudo erit. Fouebuntur itaque rutæ, ane- *cæ melan*
 chi, absinthii, pulegii, agni seminis, baccarū *choliæ*
 lauri, & similiū decocto. Hæc etenim dolo- *Curatio.*
 res quoque leniunt, & discutiunt flatus, po-
 tissimum si oleo incocta affectæ parti cata-
 plasmatis instar applicantur. Præter hæc tamē
 cataplasmatibus insint etiam ea, quæ flatibus
 discutiendis conducunt, nempe apium, ani-
 sum, cuminum, vel ligusticū, leuisticum vo-
 cant. Cum hæc admoues, longo tempore per
 diem & pasto & ieiuno adherere fines. Vbi
 ademeris, aliud quoddā operimentū super-
 accommodato, lanam scilicet latiore. Cucur-
 bitulis etiam ad flatus digerendos leuibus,
 hoc est, citra scarificationem utitur. Videbi-
 tur enim cibi præsidium hoc, Galeno lib. 12.
 Ther. meth. autore, in huiusmodi affectu in-
 cantamenti cuiuspiam simile quid efficere. il-
 lico enī cucurbita admota, qui spiritu flatuo-
 so cruciantur, tū à dolore liberi, tū omnino

vomitibus ut concitandus. sani redduntur. Porro ad dolores inflammationesque, cum scarificatione. Quibus vitium inueterauerit, presentissimum est remedium per vomitum purgatio. Non tamen validis vomitoriis utendum: talia enim infesta sunt, stomachoque anxietatem afferunt. Concitetur igitur vomitus cum aqua tepida, cui oxymeli sit admixtum. Quod si tamen neque hoc modo possunt euomere aegri, digitos aut pedinas demittendo irritare oportet. Proderit autem iis vnicui vomitus, qui per elleborum album fit, in hunc modum. R. Ellebori albi 3 i. concidatur in minutas particulas, & raphano satis magno indatur. transactis tribus diebus iterum eximatur, raphanusque fortiter exprimitur. dein accipe succi ex raphano expressi 3 vi. aquae calidae 3 iiii. oxymelitis 3 i. & totum calidum aegro propinato. Vel in hunc, qui R. ellebori albi optimi 3 iiii. & raphano prius perforato inferatur infiganturve, ac ibi noctem unam integram dimittantur. Postridie ubi in raphanum vires ellebori migrauerint, amoto elleboro raphanus in minutas partes dissectus, in oxymelite exhibeatur, diligenter cauendo, ne ellebori quidpiam in raphano relinquatur.

DE CONVULSIONE. CAP. XXI.

σπασμός Spasmos Graece, conuulsio Latine, est, ubi nervi atque musculi praeter voluntatem conuulsiuntur, in eamque dispositionem veniunt, quam

etiam in motibus secundum arbitrium factis
 assumpserunt. Vel breuius, ut definit Galen.
 lib. 2. de Symp. causis cap. 2. conuulsio est, que
 ueruos musculosque ad eundem cogit affe-
 ctum, in quem ab animalis facultate, quum na-
 turalem habitum seruarent, ducebantur. Eius
 autem tres sunt species. Tetanos, quum ceruix *τῆτανος*
 una cum reliquo corpore immobilis manet,
 & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in
 utranque partem recta intenditur. Latini vo-
 cant distensionem, Celsus rigorem. Empro. *ἐμπροσ-*
 sthotonos, quum caput, ceruix, reliquumque cor- *θότονος.*
 pus in pectus contrahitur: latinè tensio ad an- *ὀπισθό-*
 teriora dici potest. opisthotonos, quando ca- *τονος.*
 put in scopulas conuellitur: latinis tensio ad *6. Aph.*
 posteriora appellari potest. Hippocrates con- *39.*
 uulsione duas duntaxat esse causas statuit,
 repletionem nimirum, & inanitionem neruo-
 rum corporum. Sicuti enim in exterioribus
 videmus lora & chordas extendi, ubi aut mul-
 ta madent humiditate, aut vehementius ex-
 iccantur: sic & in corporibus animalium, par-
 est non raro fieri conuulsione. Animaduer-
 tendum autem, hic Hippocratem loqui de con-
 uulsione ea quæ primò fit, aut, ut apertius di-
 cam, quæ propria passio est. Fit enim conuul-
 sio etiam per consensum, quum scilicet ali-
 quid à parte primò patiente ad cerebrum ipsum consen-
 effertur, quod ut à se expellat, huiusmodi sin-
 motu concutitur. Iuniores medici barbaram se-

Spasmus Stantes medicinam, spasmū non proportio-
 non pro- natum ad materiā nominant: quia scilicet nō
 portio- accidat ob materiā, quæ implere aut inani-
 natus ad re partes nervosas possit: sed à qualitate qua-
 materiā. dam, alteratis per continuationem partibus:
 aut substātia, vel spiritali veluti aura vel flui-
 da ad nervorum principium delata, sicut cō-
 tingit in iis qui à scorpione aut alia fera ve-
 nenata icti sunt. Quando aliquem sanū re-
 pentē Galeno. 2. Aph. cōm. 26. teste, aut non
 multō postea à morbi initio convulsio corri-
 pit, à repletiōe fieri necesse est. Vbi verò post
 plurimos sudores, aut vomitū, aut deiectiones
 alui, aut sanguinis eruptiōes, aut vigilias, aut
 famem, aut motus tum multos tū vehemen-
 tes subsequitur, inanitio in causa est. Convul-
 sio per consensum facile ex ægri relatione di-
 gnoscitur. **Victus.** Victus ratio in convulsione quæ
 fit à repletionē, eadem est huic quæ in resolu-
 tione, calida nempe & sicca. In ea verò quæ
 ab inanitione fit, humida sit oportet. Nutriē-
 di enim sunt sorbitionibus & iuribus pingui-
 bus, & carnibus concoctu facilibus & probè
 nutrientibus. Vino utatur tenui & inaquoso,
 quod facile per omnia corporis mēbra distri-
 buit: nisi febris affuerit. tunc enim ptisanæ
 cremor utilis erit. Somn⁹ etiam accersendus
 erit. & victus in vniversum talis sit, qualis est
 eorum qui hectica laborant febris. **Curatio**
 convul- convulsione à repletionē ortæ, à sanguinis

sione auspicāda, modò nihil adfit quod ean- sionis a
dem fieri probibeat. Liberaliter autem san- repletio-
guinem auferre conuenit, modò non confer ne.
tim id fiat, sed pluribus vicibus. Detrahendus
autē sanguis ex cubiti vena media. Dein cly-
stere acri, si ita visum fuerit, alius eluenda.
Partes autem quæ conuelluntur, valenter cō-
tinendæ sunt, & inordinatis moribus resistē-
dum. oleo quoque rutaceo aut irino, aut alio
quodam ex hoc genere perfricandæ: aut la-
nis oleis eiusmodi imbutis contegendæ Vel
vesicam latā calido oleo repletam, superim-
ponere oportet. Si verò à pituitosis humori-
bus conuulsio euenerit, ii primum omnium
extenuandi & incidendi, utque idonei sint
ad expulsionem, præparandi præparati, me-
dicamentis in capitibus de Resolutione &
morbo comitiali dictis euacuandi. Cucur-
bitulas etiam cum scarificatione admouere
prodest: leues enim lædunt. si quidem cru-
ra contrahantur, coxis, & postremæ verte-
bræ: si manus conuellantur, dorso, & pri-
mæ ipsius vertebræ, tum ei quæ humeros su-
periacet. Caput præterea apophlegmatismis,
gargarismis, & similibus medicamentis pur-
gandum. Procedente tempore balneo uti cō Balneū.
fert. Singulis itaq; dieb⁹ bis aut ter in aquas
sulphureas, vel aluminosas, vel salsas descen-
dat: non tamen diutius, ne vires cōuellāt, im-

5. Aph.
21.

Conuul-
siois ex
inanitio-
ne & sic-
citate cu-
ratio.

Curatio
conuul-
sionis à
cō sensu.

moretur. Aut si thermarum nullus vsus esse poterit, laconico vti licebit, aut aqua cui incocta sint folia lauri, abrotanum, pulegium, absinthium, ruta, salvia, hypericon, maiorana, & betonica. Conuulsæ quoque partes pel libus luporum & vulpium vestiuntur. Inunctiones denique, quæ in cap. de Resolutione dictæ sunt, adhibere conuenit. Frigidæ superfusione, cuius Hippocrates meminit, cum sit periculosa, non facile vti licebit, nisi singula quæ ab illo requiruntur, adsint. Cæterum calida medicamenta, vt est theriaca, antidotus Mithridati, deglutienda erunt. Omnium tamen securissimum & optimum est castoreû dilutum, ad cochlearis parui mensuram, hoc est, drachmam vnā. Conuulsio, quæ ex inanitione & siccitate fit, maximum sanè malum est, & propemodum insanabile. Eos autem qui sic conuelluntur, oleo vel hydrelæo calido fouere oportet. Ad lauacrum etiam deducere oportet, temperatōque solio vti, cū oleo & frictione lenissima. Et in vniuersum ferè curentur, vt hætica correpti. Curatio conuulsionis ab icu feræ venenatæ, eadem est cum ea quæ adhibetur iis qui à cane rabido morfi sunt. Annitendum enim vt venenū extrahatur, vulnus latius efficiendo, locūque totum in circuitu scarificando, superimpositis cucurbitulis. Confert & marubii & anagallidis folia illinere. Theriaca etiam cū

rosaceo diluta, & vlceri apposita, cò q̄ vene-
num à profundo attrahat atque euacuet. hæc
enim alexiteriorum, [teste Galeno libro. 5. de
simpl. med. facul. cap. 17. actio est. vt hinc to-
to cælo errare Gentilem, & qui hunc sequun-
tur, constet, quum theriacam admotam ve-
nenum magis intrò & in profundum pelle-
re garriunt.

DE TREMORR. CAP. XXII.

Tromos Græcis, tremor latinis dicitur: & *τρόμος.*
est passio, quæ duob⁹ perficitur motib⁹. vno,
dum cogitur membrum ob morbum atque
grauitatem, ad inferiora repere: altero, dum
fursum à facultate fertur. Eius origo⁹ commu- *Causa.*
niter ex neruorū imbecillitate est. Priuatim
verò, frigidius naturæ temperamentū, frigi-
dæ potio, & præsertim in febrib. intempesti-
uè assumpta: frigidi, crassi, & lenti succi, vini
multi meracioris vsus, senectus, timor. Signa *Signa.*
quibus causæ dignoscuntur, nulla sunt neces-
saria, quòd partim ex ægro, partim etiam ex
iis quæ suprà dicta sunt, deprehendi queant.
Vicus ratio sic instituat, vt causis planè cō-
traria sit. Cibus verò diductu facilis offera- *Vicus.*
tur, & boni succi: primū sorbilis, mox vo-
latilium & piscium molli carne præditorū.
Si autem crassorum viscosorumq; succorum
copia fuerit, vti cōuenit iis quæ incidunt ex-
tenuantque. Vitent in vniuersum omnia quæ
neruos offendere possunt, vini potionem, po-

tissimū meracioris. Bibant dilutum & aquo-
 sum, aut hydromeli. Qui ex erroribus com-
 missis manifestè tremunt, à noxiis deinceps
 abstineant. Qui igitur ex vini potu tremunt,
 iis vinum circuncidendum est, quoad in to-
 tum morbo fuerint liberati. Bibāt intercā hy-
 dromeli, cū decocto saluiae aut betonicae. Si
 à frigidis & crassis humorib⁹ tremor accidit,
 curandi ratio eadem erit adhibenda quæ re-
 solutioni & conuulsioni à repletionē factæ,
 sanguinis dūtaxat missione excepta. Extre-
 mæ autē corporis partes oleis calefacientib.
 præunctæ, lanis mollibus contegantur. Dein
 cucurbitulae citra scarificationē à priori ver-
 tebra vsque ad spinam lumbosque affigan-
 tur, vt scilicet crassi & lēti humores vertebra-
 rum foramina obstruentes, ad cutis superfi-
 ciem trahantur, atque adeo subinde facilius
 discutiantur. Proderit etiā, vt eger quotidie
 piperis grana quinque ex mulsi cyathis, hoc
 est § i s.umat. Simplicia quoque hæc præ-
 sumpta tremētes adiuuant, castoreum, lepo-
 ris cerebrum comestum, althææ radicis deco-
 ctum, & eupatorii. Quid multa? medicamen-
 tis, vñctionibus præsertim, ad resolutionem
 conscriptis vtendum est.

Destilla- DE DESTILLATIONE. CAP. XXIII.
 tio quid. Destillationem hoc loco communiter ac-
 cipere oportet, vt sub se cōplectatur omnes
 ex capite in subiectas partes defluxus. Hui⁹,

autem tria sunt genera: quorum primum est
 catarrhoos, qui destillatio propriè Latinis *κατάρρῳς*
 dicunt. Fit, Galeno lib. 3. de Symp. caus. teste, *ρῳς*.
 ubi ad os ac fauces humor delabitur. Alterū
 coryza Græcis, Latinis grauedo appellatur: *κόρυφα*.
 fit, dū ad nares decūbit humor. Tertiū Bran- *βράγχος*.
 chos, Latinis rauedo vocatur: accidit, ubi *χῶς*.
 ad asperā arteriā humor destillat. Ob varias *Causæ*.
 causas accidere solet. Vel enī calor ambiētis
 qui in cerebro sunt humores dissoluens, vel
 eiusdem frigiditas eosdem cōstringens, vt iis
 potissimum qui aperto capite balneum egre-
 diuntur, accidere solet, destillationem conci-
 liat. Frigida etiam cerebri intemperies, quæ
 cur eius alimentum nō probè concoquatur,
 & calida, quæ aliunde vt trahantur ad ipsū
 humores efficiunt, destillationem procreare
 possunt. Causæ extrinsecæ facilè de ægrotō-
 rum sermonibus agnosci possunt. Qui ex ca- *Signa*.
 lore destillatione corripuntur, his particule
 incalescunt, acris tenuisque humor destillat
 tum per nares, tum per os, facies rubescit &
 nasus. Hos etiā vt plurimū febris comitatur.
 Qui ex frigore, iis caput vndique & frons di-
 stenditur, meatusque (quos ethmoides nomi-
 nāt) claudūtur, ita vt ne vox deorsum per na-
 res trāsmeare queat. Pituita & crassius humor
 ē naribus stillat. Fugiant aërem impensè ca- *Viētus*.
 lidum & frigidum, præsertim à balneo, ven-
 tos austrinos & aquilonios, laconicum, &

omnia quæ dissolvere humores in cerebro possunt. Utantur cibis concoctu facilibus & boni succi. deuitet eos qui vaporum copiam ad cerebrum trāsmittunt, cepas, allia, sinapi, raphanum, & odora menta suprà modum calida. In cœna ii minus quàm in pradio comedant. Potus sit hydromeli, aut decoctū hordei vel cinnamomi. Fugiendus somnus diurnus, & supinus. Vbi calida intēperies passionem effecit, iis pugnādum præsidiis, quæ dolori capitis ex tali causa cōtracto cōueniunt. Præsentiſſimum autem remediū est, capitis irroratio, maximè in æstate. Quod si frigida intēperies afficiat, caput calefaciētibus subtilibusque oleis, irino, rutaceoque perungendum. Irinū verò nō solūm illinitur, sed etiam naribus instillatur, aliaq; quæ suprà de capitis dolore ex frigore orto dicta sunt, adhibentur. Si autem calidus humor à capite destillauerit, simulque febris inuaserit, ac totius corporis plenitudo fuerit, sanguis è venâ exteriore cubiti mittendus erit. Sin sanguinis missione vti non licuerit, clystere aluus eluēda, atque à capite exuperātes humores deorsum trahendi. aut medicamentis bilem per inferna ducentibus corpus purgandū, catapotis nimirū aureis, alephāginis, & similib. Auerſio. tendi etiā à capite sunt humores frictiōibus extremitatū, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Proderunt etiā medicamēta in-

tra corpus sumpta, quib. alterādi inest facultas: ut est syrupus violaceus, nymphaeae, de papauere, & similes. Embrochae etiā, & odoramēta suprà in cap. de Dolore capitis commemorata adhibeantur. Emplastrū quoque ex terra sigillata, aut bolo armenio & plantaginis succo confectum, raso capiti imponatur. Si verò frigidus humor sit qui à capite destillet, per ea quae pituitam purgant, corpus vacuabis. In quem usum nō parum proderit validi clysteris iniectio. Quo peracto, à capite auertere atque retrahere humores cōueniet. Dein ubi materia concocta fuerit, apophlegmatismis, gargarismis, & similib. medicamentis caput purgandum. Sacculi etiam capiti ad mouendi sunt, hunc in modū cōfecti. R̄ Florū chamæmeli, meliloti, stæchadis arabicæ, foliorū lauri, pulegii, origani, añ m s. cinnamomi, gariophyllorū, añ 3 s. maceris 3 ii. nucis myristicæ, galliæ moschatae, añ 3 i. Terantur omnia, & fiat sacculus capitalis, qui futuræ coronali imponatur. Cōfert etiam caput oleis calidis, irino, anethino, & rutaceo perungere. Destillationem verò reprimunt omnia quibus exiccandi inest facultas: potissimum verò nigella, aut cuminū deustum paniculo inditum & illigatū, præsens auxilium affert. In hūc usum suffimēta adhibere oportet, sic composita. R̄ thuris, mastichis, añ 3 i. ligni aloës 3 i. cinnamomi, gariophyllorum

Si frigidus humor.

Sacculi.

Destillationē reprimētia.
Pastilli
& suffitu.

Pastilli añ 3 s. galliæ moschatae ð ii. foliorũ lauri, san-
 pro suffi talorum luteorũ añ 3 s. moschi, ambar añ gr.
 tu. 1. Teratur singula, & cũ styrace liquido quod
 satis est formentur pastilli, quorum vnus pru-
 nis inferatur. Aliud. R̄ saluiæ, maioranæ, ros-
 marini añ 3 i. maceris, gariophyllorum, cin-
 namomi añ ð ii. ligni aloës, thuris añ ð i. mi-
 sce, fiat puluis, qui carbonibus ignitis ini-
 ciatur.

DE LIPPITVDINE, SIVE OPH-
 THALMIA. CAP. XXIIII.

ὀφθαλ-
 μία.
 Ophthalmia Latinis lippitudo dicitur, est
 inflammatio tuniciæ vel membranę adnatæ,
 quam cōiunctiuam hodie vocāt. Adnata au-
 tem dicta propterea, quod aliis quæ oculum
 ipsũ constituunt, tunicis forinsecus adnata
 sit, ligamentum existens toti oculo ad circũ-
 iacentia ossa: ideoque ambientes oculorum
 partes vsque ad malas nonnunquam in vhe-
 mentiori lippitudine simul attolluntur. Fit
 Causæ. vel ex plenitudine vniuersum corpus aggra-
 uante, ob quam adnata etiam humoribus re-
 ferta tenditur. Vel ab influetium acrimonia,
 vehementer erodẽte: vel propter aliquã cras-
 sorum humorũ, aut spirituum flatulentorum
 intensionem. Dignoscitur, quando adnata
 Signa. oculi membrana, quæ natura alba est, ob san-
 guinis cõfluxum rubea esse videtur, & ex o-
 culis lachrymę resudant, atque in maioribus
 oculi angulis sordes quædam colliguntur.

Locus in quo decumbit æger, obscurus & te- **Viæus.**
nebrofus sit, & pro cauſæ diuerſitate aut frigi-
dus aut calidus. Si in propatulum egreditur
æger, panniculo atro aut viridi oculos obdu-
cat. Tenui vtatur viæu, & cibo parciore. deu-
tet carniū lactiſq; eſum. Vino haud vtatur,
præſertim inter initia. Bibat itaq; decoctum
cinnamomi, aut hordei, donec vigor præter-
eat. Quod ſi tamē craſſi humores tenſionem
procrearint, hydromeli aut vinum tenue &
aquofum bibere conueniret. Exercitari haud
prodeſt, ſed quieſcere & dormire. Perturba-
tiones animi procul abſint. Si ex plenitudine
cōtracta fuerit inflammatio (id quod digno **Curatio.**
ſcitur ſi cum ingenti dolore oculos affigente
plurima tenſio, rubedo, renitētia, & calor af-
fluxerit) à ſanguinis miſſione curandi ratio
fuerit, feruidarūque lachrymarū copia de-
auſpicāda erit. Venam autem ſecare oportet
cubiti ſuperiorem, quam humeralem vocāt.
atque eam potiffimū, quæ ē directo eſt. Et
ſi vehemens ſit inflammatio, ad animi deli-
quiū vſque ſanguinem auferre conueniet. Si
verò à rodentibus, aut craſſis humoribus lip-
pitudō orta fuerit, id quod lachrymæ tenues,
ſalſæ, acres, calidæq; aut contrariæ monſtra-
bunt, atque adeò totum corpus cacochy-
mum fuerit, prauisq; humorib. abundaue-
rit, quæ noxios humores vacuare & purgare
poſſunt, medicamenta propināda, quæ certè

pro redūdantiū ac infestātiū humorū varietate immutāda veniūt. Corpore inanito, humorū impetus qui ad oculos fertur, deorsum ad alias corporis partes ignobiliores frictionibus infernarum partiū, ligaturis artuū, & cucurbitulis reuellendus erit. Posthac adhibenda sunt medicamenta repellētia, quæ nō exasperent, hoc est, non vehementem sortita sint adstrictionem: sed quæ tum propriā sua substantiā sint moderatiora, tū lenitiui liquoris admixtione adhuc magis talia fiant. Lenitiui autē humores sunt potissimum, Galeno lib. 13. Ther. meth. cap. vlt. teste, oui candidū, & fœnigræci decoctū, & ad hæc amplius ipsum lac. In quo prouidū esse cōuenit, vt iuuentulæ simulq; boni succi fœminæ ex istat, vberibus ipsius in cotē, in qua collyriū teritur, expressis, quò calidū adhuc oculis infundatur. Hoc autem præcipuè in vehemēti dolore afflitis, aut propter inflammationis magnitudinē, aut ob influentium humorū acritudinem faciendum. Fronti itaque illinendi succi rosarum, plantaginis, solani, foliorū fœlicis, cū oui albo & aceto. His ammiscere oportet bolum armenium, thus, acatiam, sanctalos rubeos, balauſtia, & similia, ex quibus pefacien adiecto oleo rosaceo & farina hordeacea emplastrum componendum erit. Emplastica & mere adanodyna, vt est cerussa & amyllum, nō temere adhibēda. hæc enim etsi sensum tor-

pescere faciant, tamen vehemētes fluxiones,
 Galeno 6. Aph. com. 31. teste, non reprimūt,
 sed excerni prohibent: atque adeò si humo-
 res fluentes acres fuerint, corneam erodi cō-
 tingit. Si verò multi, magis irritari, ac vehe-
 menter extendi. Pariter vehementer stupefa-
 ciētia, nisi maxima doloris necessitas vrgeat
 non sunt admouenda: quòd scilicet faculta-
 tem visoriam offendant, adeò vt cessante in-
 flammatione, vel debiliter vel nihil omnino
 videāt. In principio itaque medicamēta quæ
 refrigerant, adstringūt & repellunt, adhiben-
 da. In incremēto, repellentib. nonnihil ex iis
 quæ discutiunt admiscēda. At in vigore miti-
 gatoria applicanda. In declinatione, ea quæ
 tantum discutiendi facultate pollēt. Vbi igitur
 concocta iam phlegmone ipsa fuerit, &
 simul corpus vacuū, tum utiq; lauationes in
 balneo his sunt aptissimæ. nā Galeno vbi su-
 prà autore, & dolorem statim sedant, & flu-
 xionem quæ ad oculos fertur, sistūt, maxima
 quidē eius parte inter lauādum per totū cor-
 pus excreta, reliquo verò cōtemperato miti-
 gatōve. Fomentū præterea omnino adhiben-
 dum est ipsis oculis per spongiā, si quidem
 mediocris sit dolor, semel aut bis in die: si ve-
 ro vehementior dolor vrgeat, præstat ter aut
 quater, & iæpius vti, in lōgis præsertim æsti-
 uis diebus. Fiat autē fomentum per meliloti
 & fœnigræci decoctū. Est namq; hoc medi-
 f

Balneum

Fomen-
tum.

camentum maxime omnium quæ oculis ad-
mouentur, sine offensa discutiens. Lauandum
tamē prius curiosè fœnogracum, ne quid illi
vel pulueris vel sabuli adhærens clàm lateat.
Aloë etiam per se, vel aqua aut succo fœnicu-
li diluta mirabiliter confert.

DE SVFFVSIONE. CAP. XXV.

ὑπόχυμα
καὶ
ὑπὸ χυ-
σισ.

Causa.

Sgna.

Hypochyma & hypochysis, Latinis suf-
fusio dicitur, barbaris cataracta. Est, vbi hu-
mor lentus & glaciæ modo concretus, inter
corneam & crysallloidē circa pupillā subit,
quo visus eatenus saltē impeditur, vt nō pos-
sit discretas rerū species & colores oculus ap-
prehendere. Accidit potissimum ex refrige-
ratione, ac imbecillitate spiritus visorii, Pau-
lo lib. 6. capite 21. autore. Fit etiam ex vomitu
violētius cōcitato, & ex ictu, & humore pi-
gro in cornea mēbrana iuxta pupillam col-
lecto. Ichoante morbo tanquam pusilli cu-
lices, vel alia lucētia, caliginosæque quædam
corpuscula assiduè præ oculis obuersari vi-
dentur. Quibusdam veluti lanarum filamen-
ta, & telæ araneæ, quibusdam circa lucer-
nas circuli offeruntur. Hæc autem nonnun-
quàm propriæ noxæ oculi, nonnunquam ven-
triculi passioni ferūtur accepta. Quare inter
hæc duo discrimē habendum est. Si quidem
visa ob humorum in ventriculo cōtentorum
vitium oborta fuerint, vtriq; oculo similiter
accidūt. Quæ verò per propriam passionem

apparent, neque incipiunt simul in utroque, neque similiter apparēt. Deinde ex tempore quoq; distinguuntur. Si enim tribus quatuorve aut etiā pluribus mēſibus ſuffuſionis ſymptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, nihil tenebroſum videatur, ab ore ventriculi paſſionem procedere inuenies. Si verò non ita multum tēporis interceſſit, querendum eſt in primis, utrū ex quo incepit affectus, ſingulis diebus perpetuò huiusmodi apparitio perſeuerauerit, nullo ſcilicet interueniente die qui omni querela caruerit, an diebus quibuſdam laborans exactè videatur conualuiſſe. Nam continuitas ſuffuſionem portendit: intermiſſio verò, quod malum à ventriculo prodierit, ſuſpicionē excitat. Idq; magis, ſi ubi perfectè quis concoquens, nulum ſibi viſum apparere fatetur. Sed multo magis, ſi quum apparuerūt viſa, mordicus in ore vētriculi doluit: maximè verò, ſi poſt hęc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint ſymptomata. Vbi verò altera pupilla tenebroſior, aut turbidior, aut nō exactè pura videtur, ſuffuſionis eſſe initium cenſendum eſt. Viſus. Viſus ratio ſit attenuatoria, & exiccatoria. A vino abſtineat in tota medicatione, & pro eo decoctum cinnamomi, aut hydro-meli bibat. Fugiat omnia caput replentia. A balneis abſtineat, niſi vel laſitudinis vel cruditatis cauſa ſint neceſſaria: atq; ne tū quidē

EONHARTI FVCHSII

in aëre balnei diutius immorari. neque in so-
lio persistere, sed sensim quidem ingredi, cō-
festim verò egredi oportet. Vident pisces, fru-
ctus, & quicquid corpus humectare potest.
Suffusi in principio, nisi quid obstat, venę cu-
Curatio. biti exterioris sectione, & acibus clysterib⁹
purgationib⁹que curantur. Deinde cucurbi-
tula occipitio cū scarificatione affigenda est,
utendūque per intervalla apophlegmatif-
mis, & iis quæ per nares purgāt. Cauterium
etiam quale suprà cap. ii. descripsimus, post
aures apponendū erit. In oculis autē medica-
mentis est primum simplicib⁹. utendum, puta
melle cum oleo & succo fœniculi: postea cō-
positis, quale hoc est, quod R^x succi fœniculi
℥ ii. aquæ chelidonii maioris, euphrasie añ ℥
i s. sagapeni 3 i. misce. Fellis etiā genera per
se, aut cū fœniculi succo illita proderūt. Aut
myrrhæ & piperis partes equales cum melle,

DE AURIUM DOLORE

CAP. XXVI.

Cause. Auriū dolor aliquibus ex refrigeratione,
in peregrinatione à frigidis ventis facta, ori-
tur. Aliquib⁹ verò ex balneis frigidis, & qui-
busdā ex aquis medicatis excitatur. Fit &
auris dolor ex inflāmate, interdum qui-
dem solius circa meatum cutis, interdum ve-
rò in profundo, quando videlicet nervus au-
ditorius ad inflammationis affectum perue-
nerit. Qua verò ratione inflammatio, partes

inflammatas distēdens, dolorē parit eodem modo etiam flatulentus spiritus transitū non habēs, dolorem efficit. Saniosi denique & ferrosi humores in corpore aurium generati, con- similiter vt mordaces humores qui extrinsecus illabuntur, dolorem conciliant. Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, de a- gri sermonibus facile cognoscitur, & inde quod dolor altē citra grauitatē vel distensio- nem vel ardorem, fixus sit. At qui ex calida ortus est intemperie, ex eo quod in illo fer- uoris cuiusdā sine grauitate seu tensione sen- sus est, deprehenditur. Si grauitas, distensio, simulq; calor & dolor pulsabilis, aut etiā fe- bricula oboritur inflammatione aurē laborare censeto. Sola autē citra grauitatem distē- sio, spiritum flatulentum, cui exitus nō patescit, indicat. Vt ratio ex superioribus iuxta causā diuersitatem faciliē institui potest. Cæ- terum dolorem à sola refrigeratione obortū, calefacientia quā celerrime curant, nempe oleum rutaceum, laurinum, nardinum, cici- num, anethinum, & liliaceum. Oleum etiam in quo allium decoctum est vel cepa, instil- latū mirificē confert. Sunt qui magnas cepas exsculpētes, deinde oleo explentes, & in fer- uēte cinere moderatē calefaciētes, ita aurib⁹ infundāt. Galenus euphorbio perquā exi- guo ad multū vetus olenm ammixto vsus est: vlti etiā pipere exquisitissimē trito. Mani- f.iii.

Signa.

Vt⁹ cu-
ratio do-
loris fri-
gidi.

Doloris calidi. festum verò est omnib⁹, quicquid adhibetur, mediocriter calidum esse oportere. Quñ autem à calida intemperie dolor obortus fuerit, tum contrariis medicamentis propulsandus erit, Mirificè igitur cōfert rosaceum oleū in aurem demissum, vel acetū, vel succus solani, oleūq; nymphææ. Vt R^x olei rosacei, succi solani añ^{ss} s. acetⁱ 3 i s. misce. Magnificè etiā eos dolores mitigat oui cādidū, itēque lac muliebre. Vbi verò aqua medicata circa auditoriū meatum cōtineatur, oleū asidue infundere conuenit, quo ipsum eluamus: dein lana molli extergere, rursūque infundere. Plurimum etiam prodest adops anserinus, atque item vulpinus. Sed nihil ad aquam euocandā præstantius quàm oris exutio, quæ etiam per calamum ceu canalē exugⁱ potest. Si quis etiam alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declinui saliat, aquam faciliè excutiet.

A flatib⁹ & humo rib⁹ crassⁱs. Si vero à flatibus, aut crassis viscosisque humoribus dolor excitatus fuerit medicamentis quæ obstructions auferunt & inicidunt, vtendum: cuiusmodi sunt omnia amara, quæ sine erosione expurgant exterguntque. Ex quo genere est albū item ac nigrum veratrū, amygdalæ amaræ, ex aristolochiis quæcūq; fuerit ad manū, iris illyrica, vitis albæ radix,

Ab inflā- matione. centaurii minoris coma, cinnamomū, & polium. Quòd si inflammatio adsit, statim san-

guis ex humerali vena eiusdem lateris, mittendus est. Deinde oxyrhodinum tepidū instillandum. At si vehementior fuerit inflammatio, ad sedandos dolores albumen oui cū lacte mulieris tepidū infunditur. Cogēte verò dolore, necessarium est etiam his quæ sensum stupefaciant vri. Neque enim mediocre periculū est, ne cerebrum nervo per quem facultas audiendi distribuitur vicinū, per consensum afficiatur. Miscetur autem pauculum opium muliebri lacti, & oui cādido, quæ & ipsa per se aurium inflammationibus p̄sunt. Castoreo etiā opium miscetur. Verum multo ante vsum tempore, Galeno lib. 3. de cōp. med. cap. 1. autore, siue pari pondere, siue duplo castoreo ammisceatur, præparatū id esse conuenit. Et miscetur quidem in vehementissimis doloribus pari, in minoribus verò duplo. Liquor verò quo prædicta medicamēta diligenter prius trita & leuigata, diluuntur, sapia sit. Opio etiam oleum rosaceum & violaceum miscetur in hunc modū. R̄ opii ℥s. oleorum rosacei & violacei añ. 3 i s. misce. Philonis antidotū frequenter etiā sic laborātib⁹ profuit, dissolutū lacte muliebri, & instillatum. Extrinsecus verò aurē assidue siue oleo cōmuni, siue ex quodam calido fomento oportet fouere, lanāque hoc imbutā in aurē cōicere, sed ita vt partes inflammatione tentatæ quàm fieri potest minimè attingātur. Vbi
f.iiii.

Stupefacientia.

autem dolor inueterauerit, & iam in suppu-
rationem conuerti cœperit, medicamento è
succo lini Teminis vtitor, quod vnà cum rosa-
ceo aut chamæmelino solutum instillabis.

DE PAROTIDIBVS. CAP. XXVII.

πρῶτι-
στis.
causa.

signa.
victus.

curatio.

Adstrin-
gentia &
reprimē-
tia medi-
camenta
in paroti-
de nō ad-
hibēda.

Parotides sunt inflāmationes, quæ in glā-
dulis auribus adiacentibus fiunt. Causa eius
non est alia quàm reliquarum inflāmatio-
num, quæ in glandulosis accidunt partibus.
Signa nulla ad agnoscendas parotides requi-
runtur: oculorū enim iudicio subiact. Vi-
ctus ratio talis, qualis in aliis inflāmatio-
nibus, instituenda venit. Curādi ratio à ve-
næ sectione, si ætas aliāque permiserint, au-
spicanda erit. Incidenda vero humeralis eius-
dem lateris vena. Non tamen ad eas, quem-
admodum alias inflāmationes, in principio
reprimentibus vtimur, sed contra attractoria
medicamenta adhibemus. Atque si hæc nihil
notatu dignum effecerint, etiam cucurbitu-
las affigemus, aut fomenta assidua adhibe-
bimus. Annitendum enim, vt affligens hu-
mor ex profundo ad cutem attrahatur, præ-
sertim vbi in capite affectus sit firmatus, hu-
morib. in eo pertinaciter herentibus. Quin
& quum citra capitis affectum, in febribus
acutis natura superuacuos humores ex vasis
effundens, ad regionem inter cutem & sub-
iecta corpora deponit, quando sanè & glan-
dulæ ex effusis humoribus opplentur: me-

lius esse utique etiam tunc videtur, naturę per humorum decubitus seu ex loco in locum impetuosum illapsum febres curanti, opitulari. At verò quum vehementi impetu influxus irruit, nihil nos tentabimus, sed omnia naturę permittemus. Si enim vel cucurbitā vel medicamentum humores ex alto ad cutē attrahens admouerimus, vehemens dolor hominem apprehendet, unde & vigilię suboriętur, febres intenduntur, ac vires exoluentur. Mitigare itaque tunc nō humorū influxui opitulari conuenit, per cataplasmatum maxime lenientium vsum. Eligenda vero, quę cū humiditate moderata calorem habeant, doloribus mitigandis sedandisve, atque influentibus humoribus concoquendis & maturandis idoneum. veluti est quod ex farina hordeacea, aut triticea, aut seminis lini cū mulla, aut fœnigræci, aut althęę, aut chamæmeli decocto paratur. In hunc etiam vsum valet butyrum assidue illitum, & ouorum vitelli. Si illis etiam adeps cum butyro liquatus, cetera exigua addita. Si itaque tumor nō discutitur, suppurantibus medicamentis vtendum est: velut est farina triticea, cum caricarū decocto, & oleo. Si vero suppuratę fuerint parotides, tūc aut per sectionē pus elicere oportet, vlcusque velut in eiusmodi moris est curare, aut sanē per acre medicamentū abscessum rumpere: quale est quod ex alliis cōstat.

ant tentare, ut ipsum per medicamenta attractoria tenuiūq; partiū discutiamus, bis per diem ablati, & fomentis admoti, donec remiserint & laxati fuerint dolores. Quando verò iam plurimum puris fuerit discussum, tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: deinde verò neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere oportet, ut siquid reliquū in profundo hereat, id ipsum discutiāt. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque molliēda est. quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus attractoriis ammixtis. Manifestum autem est q̄ moderatæ parotides, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit tanta, ut vehemētes dolores excitet, neq; caliditas cum humore adest, facile per medicamenta emollientia & discutiētia, quale est emplastrū diachylō, sanari possint.

DE SANGVINIS EX NARI-

BUS ERUPTIONE. CA. XXVIII.

Causæ.

Causæ profluvii sanguinis ex naribus externe multe sunt, nempe casus ab alto, ictus, exercitiū vehemens, mora in sole. Multę etiā sunt internæ, nimirum copia sanguinis, vel eiusdem tenuitas. Omnes autem causæ sub iis tribus complecti possunt. Sanguis enim profluit ex naribus, aut reserato venarum vel arteriarum quę in capite & narib⁹ sunt, ore,

aut tunicâ earundem rupta ac diuisa, aut sudoris instar transcolatus. Porro, reseratur venarum & arteriarû os propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad eos earû impetu ruit, copiam: ad hæc acrem quampiâ, quæ illi extrinsecus incidit, qualitatem. Diuiditur autê tum ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris instar transmittitur tunicâ quidam ipsâ rarefactâ, sanguine vero tenuato. Causæ externæ de sermonibus ægrotantis cognoscuntur. Plenitudinis notæ dictæ sunt suprâ cap. 6. huius libri. Decretoriû sanguinis ex naribus p-fluium, ex morborum, qui præcesserunt, cõstitutione deprehenditur. Viçtus ratio talis sit, quæ infrigidare & incrassare sanguinem queat. Tenuis etiâ sit. Aëre itaque vtatur frigidiore: cibus boni succi, & concoctu facilibus. Feruente sanguine, vescatur lactucis, endiuiâ, scariola, pyris, cotoneis malis, pullis gallinaccis assis, aut cû omphacio decoctis. Bibat vinum crassum ac rubeû, fugiat verò tenue & album: Aut in potu vtatur aqua frigida, vel decocto cinnamomi. Parû loquatur animique perturbationes (iram potissimum & similes) deuitet. Caput præterea sublime habere conueniet. Curandi verò ratio ab iis q̃ sanguinẽ ad alias corporis partes auerre possunt, auspicâda. Primû itaq; si plenitudo corporis adsit, aut etas pmiserit, egerq; re-

Signa.

Viçtus.

Curatio.

frictio.

Ligaturę
cucurbi-
tę.medica-
mēta re-
frigeran-
tia & ad-
stringen-
tia.

solutus adhuc non sit, vena in cubito incidenda est, qui profusioni ē directo respōdet. vbi paululum detraxeris, mox vnā horam inter mittens, rursus detrahes: pōst iterum atque iterum pro laborantis viribus. Frictio etiam infernarum partium, brachiorum videlicet, manū, femorum, inguinū, ac pedum potissimum, per ea medicamenta quę calefaciūt, adhibenda. Pręterea vincula valentius adducta, iis remediis, quę reuellunt, adnumeranda sunt. Sanguinem denique ē naribus erumpentem retinent magnę in hypochondriis defixę cucurbitę. Infigendę autem sunt, si ex dextra nare profluit sanguis, super iocinore: sin ex sinistra, super liene: si ab vtraque nare, super vtroque sunt imponendę viscere. scapulis etiam cum scarificatione applicandę sunt. His peractis, medicamenta quę refrigerant & adstringunt, intra & extra corpus adhibenda erunt. Extrinsecus itaque apponenda fronti & cōmissurę coronali sunt, epithe mata ex succo plantaginis, lactucę, acetosę, burse pastoris, polygōni, & similibus. Mirificę vero cōfert, si lintcolū in aceto madefactū frigidum, iterum atque iterum fronti & ceruici admoueris. frons etiā spongiis ex aqua frigida fouenda. Proderit etiam hoc epithe mate iocinori & fronti imposito vti, quod ex aquarum rosarū, solani, oxalidis (hoc est acetosę) plātaginis añ ʒ iii. aceti ʒ is. specie-

rū diatrifantali, diarhodō abbatis, añ 3 s. boli armenix, eboris vsti, lapidis hæmatitidos, añ 3 i. misce, fiat epithema. Hoc etiā obstruēti medicamēto, quod Galen. li. 5. The. meth. optimum esse inter omnia alia asserit, vten- dū, quod R̄ thuris 3 ii. aloës 3 i. Redacta in puluerem cū oui candido subigantur, donec ad mellis crassitudinem redeāt: de hinc lepo- ris mollissimo pilo excipiātur, & admouē- tur. Licebit etiā linamentum cōtortū hoc medicamento imbutum naribus indere. Mē- tam porrò tritam in nares cōiicere proderit aut spongiam in acre & feruidum acetū con- iectum, forinsecūs ad sanguinem profundē- tem narē apponere. Aliud. R̄ putaminis oui 3 ii. gallē omphacitidis 3 i. trita linamēto tor- to aqua aut aceto madefacto excipito, & in- dito. Frontem verò & nasum gypso albumi- ne oui madefacto integro cōfert: aures quo- que validè linteis & cera obturare, & in ore aquam pluuialem frigidā continere. Succus etiā foliorum vrticæ linamēto impositus, sanguinem ex naribus erumpentē reprimi- t. Idem etiā potest caudæ equinæ succus, aut ipsam & trita applicata. Cochlearum carnē cum aceto tritam, aut easdem cum suis domi- liis vstas tritāsq;, fronti ac naribus ex aceto admonere conuenit. Supra omnia cōfert san- guis, qui ex ægrotantis promanauit naribus, si i vase figulino tostus fuerit: de quo R̄ 3 iii.

boli armenie, gypsi añ 3 i. caphure 3 i. cū oui
cādido & exiguo aceto reducātur ad mellis
crassitudinē, & fronti imponātur. Necessita-
te urgēte, grana duo aut tria opii adicere li-
cebit. A tota substantia stercus asininū exic-
catū, & in puluerē redactū, conducere vi-
detur. id quod porcinum etiam efficere po-
test. Intra corpus adhibēda ea quę in frigidat
Quæ ad- & adstringūt medicamēta, vt sūt syrapi, ro
hibenda & adstringūt medicamēta, vt sūt syrapi, ro
intra cor faccus, myrthinus, & nymphææ, & de papauc
pus. re. Cōseruæ rosarū, nymphææ, & oxalidis. Pa
stilli de terra sigillata, de succino, de ebore
seu spodio, cū succis paulò antè cōmemora-
tis. Porro si quid interea ex sanguine absor-
ptū esse videatur, etiam id ipsum, vbi multa
cius sit copia, per medicamentum, quod va-
cuare potest, educito. In vētre enim & intesti-
nis in grumos coactū, incensionem facit.

DE DOLORE DENTIVM.

CAP. XXIX.

Causa. Fit interdum ab intemperie vel frigida
vel calida, interdum verò propter defluxum
humorum ex capite in radices eorundē: qui
sua acrimonia illos aut erodunt, aut consimi-
lem in eis passionem sua copia excitāt, qua-
Signa. lis est circa carnosas partes inflammatio. Si
à nuda qualitatis intēperie dolor ort⁹ sit, mi-
nimè grauati⁹ erit: sin ab humore copioso
influēte, non solū grauati⁹ dolor in denti-
bus sentitur, verū etiā in reliquis partib⁹ quas

pertrahat. Calidus autē humor, vehemētior ē:
frigidus verò, remissiorem mitiorēq; do-
lorem excitat. **Viētus ratio,** quæ maximè, **Viētus.**
ne dolor accidat, efficere potest, talis sit, vt su-
pra modū calida aut frigida deuitentur: po-
tissimū verò cauendū, ne statim sese sequan-
tur. Vitanda acida, acerba, & viscosa omnia.
Lactis etiam frequens vsus dentibus mirificè
obest. Studiū & diligentia assidua sit in puri-
ficatione dētiū, quæ sanè res eos à corruptio-
ne omniū maximè tutos reddit. Utēdū cibis
boni succi, & concoctū facilibus. Dolorē au-
tem infestāte, iuxta causę diuer sitatē, viētus
instituitur. **Curādi ratio,** si à nuda sit qua- **Curatio.**
litatū intemperie, solis iis quæ alterare pos-
sūt, medicamētis perficitur. Si à frigore, pro-
derit vino tepido colluere dētes: extrinsecūs
maxillę calefaciētibus oleis, chamæmelino,
rutæceo, irino & similib⁹ inungātur. Ad oris
etiā collutionē in aceto decoquēda erūt ori-
ganū, calamintha, hyssop⁹, pulegiū, satireia
verbenacę rectæ radix, & similia. Sin à calo-
re dolere dentes cœperint, in aceto decoque-
re cōuenit portulacam, parietariam, semper-
uiuum minus, & glycyrrhizam. Quod si in-
tolerabilis existat caloris sensus, vtendum
est seminibus lactulæ, intybi domestici, &
papaueris hortensis, decoctis in aceto: forin-
secūs oleis frigidis partes inungendæ. Porro
si à redundātia humorū dolor excitatus fue-

rit, si ætas, tempus anni, & alia permiserint, plenitudoque corporis affuerit, à sanguinis missione curatio inchoanda erit: Derrahéd⁹ autem sanguis ex humerali vena, quæ è directo affectum locū respicit. Quo peracto, venas sub lingua incidere oportet, aut scapulis cucurbitas affigere. Si verò vnus dūtaxat humor exundauerit, medicamento quod cū humorem purgare consuevit, euacuetur. In quem vsum clysteres etiam, qui ad inferiora auertunt humorum impetum, adhibere licebit. Vacuato corpore, ea quæ reprimūt medicamenta admovebis: vt sunt succi plātiginis, rosarū, portulacæ, lactucæ, intybi domestici vtriusque, aut prædictarum herbarū decoctum cum modico aceto. Prodest verò mirificè, dolentes dentes acri aceto calido cum galla immatura colluere. Adiicienda etiā interdum erit caphura. Emplastrum quoq; ex farina hordeacea, cum decocto solani, halicacabi, & lactucæ confert. Inungendę etiam vicinę partes extrinsecus oleo rosaceo, nymphææ, exiguo caphuræ adiecto. Principio morbi iā transacto, reprimētibus admiscēda erunt discutientia: vt est decoctum scēnigraci, seminis lini, pyrethri, & hyssopi. Ad stupefacientia, nisi summa vrgente necessitate, nō est perueniendum. In hunc autem vsum adhibebis decoctum seminis aut foliorum hyoscyami cum aceto. Philonii etiam drachma

vna in aqua aut vino diluta, non parum auxilii cōferet. Inter ea tamen, quæ à tota essentia conducunt, egregiè facere fertur ranæ in aqua & aceto probè coctæ decoctū, diutiùs ore retentum. Præclare prodest etiam senecta serpentis, in vino aut aceto cocta. Eadem quoque vsta ac trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, dentique imposita dolenti confert. Ipsa denique non vsta dētibus adfricta, non parum conducet. Origanum prætereà dentium dolorem lenit, & protinus tollit, si redactum in puluerē cum nitro insparatur. Quòd si verò prædicta nihil contulerint, dens aut ferro aut medicamentis auferendus erit. Quæ autē sint medicamenta ea quæ citra dolorem & absq; ferro dētem extrahere queunt, docet Aërius lib 3. cap. 34.

DE APHTHIS CAP. XXX.

Aphthæ, vlcerações quæ in superficie oris accidunt, igneæ caliditatis quidpiam habentes, Græcis appellantur: quæ nunc subalbide, nunc subrubræ sunt: aliàs cruste modo nigrescunt, & hæ omniū periculosissimæ existūt. Barbari hunc affectum alcolam nominant.

Fiunt vt plurimū infantibus puerisq; lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutriticis, aut nō probè ipsum cōcoxerit infans. Fiūt etiam aliquando in his qui ad perfectā ætatem peruenerunt, tum propter vitiosorū humorum ad os defluxum, tū propter acri-

Que à tota essentia cōducunt.

ἀφθαί.

Causæ.

Signa.

moniam eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote visui aut tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quam conuenit partes sunt, tumoresque & citantur. Visu verò, ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albidiores, pituitæ:

Curatio
infantiū.

liuentes verò & nigrefactæ, bilis atræ. Quæ infantibus accidunt, facile curantur, utpote quæ ex moderatè adstringentibus sedantur. Infantibus verò ea potissimum conueniunt, quæ in cibis offeruntur. Oportet itaque miscere cibis aliquid ex malis cotoneis, & aliis acerbis, pyrisque ac mespilis. Aliquando etiā lactucæ quiddam & intybi, ac portulacæ cibo admiscendū est, inflammata videlicet ulceratione existente. Conuenit etiā lens cum aceto & aqua decocta, cum modico pane cōmanducata. Quòd si infans ipse cibum capere haud possit, nutricem eius huiusmodi victu curare oportet: necnon infantium ora medicamentis cōuenientibus illinire. Si quidem subrubæ infantium ulcerationes fuerint, à principio his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant, est utendum. Si verò subflauæ fuerint, iisdem quidem utendum, sed magis refrigerantibus: Si pituitosiores, adstringentibus: Si nigrescentes, iis quæ generosiùs discutiant. Sufficit itaq; pro iis rosarum flos, ipsa

que rosarum folia sicca cōtusa, galla, & thus, cum mulsō aut melle rosaceo illita. Collutio-
 nes etiam oris ex succis rosarum, plātaginis, solani, aut decocto gallarum, balauſtiorum, rhoë obſoniorum, admixto Rob de ribes, aut confectiōe diamorōn, profunt. In eis Curatio
 qui iam perfectæ ætatis sunt, durioraq; cor- adultorū
 pora habent, efficacioribus remediis vtimur. Viſtus.

Primum itaque, quod ad viſtus rationem attinet, qui in hac ætate constituti, ab omni-
 bus quæ salsa & acria sunt, quæque vitiosos succos progenerare possunt, abſtineant. In plenitudine totius corporis, primum venæ Venæ se-
 humeralis, & dein earū quæ sub lingua sunt, ſectio fiat. In cacoſchymia, humoris redundā ſectio. Purga-
 tis purgatio conuenit: Qua peracta, medica- tio.
 menta quibus adſtringendi & reprimēdi facultas ineſt, adhibenda erūt: Deinde verò ea quæ citra mordacitatem diſcutiunt, vt eſt fœ-
 numgræcum, glycyrrhizæ radix, melilotum, & alia prius ſæpe commemorata. In his ve-
 rò omnibus corporum naturas contemplari oportet, num molles ſint & humide, velut in pueris, eunuchis, & mulierculis: an duræ & aride, velut in piſcatoribus, nautis, venatori-
 bus, atq; agricolis. Fortioribus enim corpo-
 ribus fortiora adhibēda medicamenta, molliorib⁹ imbecilliora. Atqui ſi exulcerationes putreſcere incipiāt, maximè ī infantib⁹, præ-
 clare facit ex decocto gallarū & melle illitio.

Gallas itaque contusas aqua decoque, & cū decocto percolato parem mensuram mellis permiscens, rursus decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoque ut maximo remedio vtere, ita ut locis illitum satis diu digitis adfrices. Nec minùs egregiè facit cētaurii minoris exusti cinis illitus cum melle. Cornu etiam ceruinum vstum, tritū, & adfrictum, mirificè conducit. Ad aphthas quæ proserpunt, summè efficax est fœniculi radix vsta per se & cum melle illita.

DE FOETORE ORIS. CAP. XXXI.

Causæ.

Molestus oris odor primū ob putrescentes gingiuas, dentes, aut ciborum reliquias illic detētas accidit: deinde propter cutis oris calidam intemperiem, humiditatem, quæ in eo multa est, corrumpētē: interdum etiam ob humorem corruptū aut putrefactum, in ore vētriculi hærentem: Nonnunquam vero oris aut pulmonis exulceratione fit, ut molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes vel gingiuas, vel dentes, vel ciborū reliquias oris fœtor accidit, facilè visu aut de egroti sermonibus deprehendi potest: Si ob calidā cutis oris intemperiem, tum calor in ore sentitur, ac sitis adest: Si propter os ventriculi, tūc ante cibi sumptionē præcipuè oris odor molestus esse solet. Oris & pulmoris exulce-

Signa.

rationes, visus etiā agnoscit. totius enim corporis extenuatio phthisicos concomitatur.

Victus ratio talis sit, vt omnia quæ facillè in ore aut ventriculo corrumpuntur, euitet ægrotus, lac, pisces, fruct⁹ oēs, medullas, & pin-
guia, aquas prauas, & similia. Utatur potius cibis boni succi, potissimum verò assis. In cœnæ & prandii fine adstringentibus, pyris, cotoneis malis, & eiusmodi. Potus iuxta causæ diuersitatē sit vel vinum, vel cinnamomi aut hordei decoctum. Somnum statim à cibo fugiat. Si propter gingiuarum aut dentiū corruptionem fœtor oris acciderit, corporisquē plenitudo fuerit, ex vena humerali primū sanguis mittendus erit, & dein cucurbitulæ ceruici affigendæ: Sin cacochymū fuerit corpus, medicamento idoneo humor redundans ac molestans vacuandus erit. corpore vacuato, localibus vtēdum: in quem vsum collutiones mirificè conferunt, qualis hæc est, quæ R^x rosarum rub. plantaginis añ m i s. gallarum, balauft. nucis cupressi añ 3 ii. corticum granatorum 3 i s. aluminis liquidi, rochē nomināt, 3 i. decoquantur in aqua sufficienti, vsque ad tertiæ partis absorptionem. colaturæ adde mellis rosati colati, rob nucum viridum añ ʒ s. diamorōn 3 ii. fiat collutio: cū a qua calida dētes & gingiua colluantur. Proderit etiā frequens collutio ex aqua, cui acetum sit permixtum, manē, & statim à cibo. Non parum

victus.

Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio

Localia.

Collutio

g iii

LEONHARTI FUCHSII

si à cali-
da intem-
perie.

etiam confert commanducatio pyrethri, ta-
maricis & rutæ: collutio item ex aceto scyl-
litico, aut decocto saluie, aut cum solo vino.
decoctum mētæ ex aceto & aqua iuuat, si il-
lo assidue os colluatur. Si à calida intempe-
rie fit oris fætor, contrariis curetur medica-
mentis. Sin ab humore in ore ventriculi cor-
rupto accidit, per ea quæ humorem illum va-
cuare possunt, sanetur. Commodè autem per
vomitum vacuabitur, qui iis quæ cap. 20. di-
ximus, concitandis medicamentis venit. Dein
confectiones stomachum roborantes, vt est
aromaticum rosaceum, diambre, miuâq; co-
toneorum exhibenda. Medicamenta verò,
quæ in omni causa competere solent, sunt
gariophylli, mastiche, macer, lignum aloës,
cinnamomum, rosa, santali, nux myristica,
cubebæ, & alia eiusmodi.

LIBRI PRIMI FINIS.

LEONHARTI FVSCHSII DE

MEDENDIS SINGVLARVM

corporis partium, à summo capi-

te ad imos vsq; pedes, passio-

nibus, Lib. II.

DE COLUMELLAE INFLAM-
MATIONE. CAP. I.C A R N O S A quædam parti-
cula in summo ore apparetcolumel-
la.

C

dependens, si quis aperto
plurimum ore toto linguam
deprimat. Hæc veteribusGræcis duobus appellatur nominibus, γαρ-
γυρίων & κίων, id est, gurgulio & columna.Posteriores autem ferè oēs κιονίδα, hoc est, co-
lumellam vocat. Sepe admodum inflàmatio-

causa.

ne afficitur, id quod ex influxu humorum ad
illam contingere solet. Visu apprehenditur

signa.

potissimum passio, acceditque in deglutiendo
difficultas, dolor, tumor partis patiens, & fe-bris. Viçtus ratio talis sit, qualis in cæteris
ferè inflàmationibus. conuenit autem præci-

viçtus.

puè quies inediaq; . Curadi verò ratio si ple-
nitudo affuerit, atq; & alia permiserint, à

curatio.

venæ sectione auspicanda erit. Incidenda autem
primùm vena in cubito exterior, quæ hume-venæ
sectio.ralè vocant, deinde ea quæ sub lingua est. Alius
etiã clysteribus subducenda, vt hac ratione

Auerisso.

non tantum vacuentur, verum etiam auertan

g iiii

tur à loco patiente, humores confluentes. In quem vsum etiam conuenit scapulis affigere cucurbitulas. Neque hic negligenda sunt auxilia quæ fluxum reprimunt, qualia sunt quibus adstringendi facultas inest. vtendū itaq; hac collutione, quæ R^x succi rosarum, plantaginis, prunellæ, oxalidis, solani añ ʒ ii. diamorôn, rob de ribes añ ʒ s. rob de oxyacantha, quam berberim vocant, 3 ii. aceti in quo rhus, hoc est sumach, maceratus sit, ʒ i. succi malorum granatorū ʒ s. misce, fiat collutio. Vel hoc gargarismo, quod R^x rosarū rub. rubi, añ m i. balauft. corticis malorum puniceorum, gallarum, glandium, añ 3 iii s. rhois, hoc est sumachⁱ, hypocythidos añ 3 i s. se. oxalidis, se. citoniorum añ 3 i. Decoquantur in lb i. aquæ fontanæ, dum altera pars absumatur. colaturæ adice diamorôn ʒ i. rob nucum viridium ʒ s aceti optimi 3 vi. misce, fiat gargarismus. Et iis quidem in principio vtendum: & tum maximè, vbi affectus nō habuerit maiorem causam, nec ægri corpus multis humoribus refertum fuerit, aut particula affecta, naturâ debilis. Sin contra acciderit, sæpe quidem in principio, sæpe verò paulo pōst, id est, in tertio die, quippiam ex diffusoriis cōmiscendum erit, vt est semē lini, foenigræci, & althææ, radix iridis, atque mel. Omnia autem hæc tepida sunt exhibēda: frigus enim nō tolerāt inflāmata. Si verò in vi-

gorem puenerit passio, gargarizet decoctionem furfurum calidam, aut decoctum glycyrrhizæ, hyssopi & ficuum. hæc enim non solū discutere, verumetiam mitigare malum possunt. Extrinsecus proderit, spōgiis oleo amygdalino madefactis & expressis fouere ceruicem: Aut lana mollis oleo tincta, collo circumponenda. Cataplasmata quoque ex farina hordei, aut semine lini, aut scenigræci, aut ex iis simul mixtis admouenda.

DE ANGINA. CAP. II.

Cynanche & Synanche Græcis, Latinis verò angina, propriè est inflāmatio, quæ in gutture vel faucibus fit: sic dicta ἀπὸ τοῦ κυνάγχης ἢ συνάγχης, hoc est, à suffocando. quoniam pestiferū & acutissimum sit malū, quod strāgulatu præsentaneū vitæ discrimen inferre solet. Hippocrates tamen & alii veteres, omnes passiones iis locis accidētes, quas spirandi difficultas comitatur, angine nomine appellant. Sūntque eius propriè loquēdo, quatuor differentiæ: vna, vbi fauces inflāmantur: Altera, quum neque fauces, neq; reliquæ oris partes, neque etiam externarum partiū vlla inflāmata videtur, æger tamen suffocationis periculū in gutture sentit. Tertia, vbi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter inflāmantur. Quarta, vbi ad anteriorem regionem ceruicis vertebræ luxātur, unde cauus apparet locus, & dolorem quū tan-

κυνάγχης
καὶ συνά
γχης.

gitur, eger sentit. Recentiores, ut Paulus lib. 3. cap. 27. & alii quidam, inter cynanchen & synanchen, item paracynanchen & parasynanchen, discrimen fecerunt, quod tamen Galenus lib. 4. de Locis patientibus cap. 5. reprehendit. His itaque synanche dicitur inflammatio, quæ in interioribus faucium musculis oritur. Quæ verò in exterioribus earundem musculis fit, parasynanche iisdem nominatur. Eodem modo & in gutture se habet. si enim interiores eius musculi inflammatione conflantur, cynanche: si autem exteriores, parasynanche his ipsis appellatur. Oriuntur à sanguine copioso ac calido præter naturam ad loca iam commemorata confluyente. Cognoscuntur iis notis. spiritus non nisi recta ceruice, aut difficulter trahitur. nonnullis febris oritur, dolor, faciei rubor, & colli. Ad hæc tumor etiam in quibusdam superuenit. Aeger ore hiat: cibum non deuorare, non potionem potest. In principio itaque præceptum ac compendiarium auxilium omnis angina requirit. Protinus igitur cubiti venam externam eiusdem lateris incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur. Parce autem, & pluribus interpositis vicibus, non vniuersim, sanguis auferendus. quippe cumulata vniuersimque facta euacuatione, anima ipsis deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia in affectam partem vbertim prorumpit. Curandum etiam ut

συνάγχη
παράσυν-
νάγχη.

causa.
signa.

curatio.

venæ
sectio.

modica fiat venę diductio. Nam quum in aliis, tum in magnis venę diductionib. acerrimum animi defectus irruit. Neq; tamen angustiores facere venę incisionem conuenit, ne sanguis velut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat. quę causa huius passionis existit. Si per hęc parum proficitur, eas quoque venas incidere cōuenit quę sub lingua sunt, idque primo statim die. Quod si quid venę incisionem fieri prohibeat, alius acriore clystere, qualem in cap. de apoplexia descripsimus, subduci debet. Post vniuersales autē euacuationes, cucurbitas apponere oportet. Et si quidem tumor circa maxillas, aut sub mento persistat, in ipsum tumorem, & cum scarificatione plurimum sanguinem extrahere, salēq; respergere scissuras, & cōfricare. Quod si nullus extrinsecus appareat tumor, retro in collo iuxta primā vertebra cucurbita infigenda erit, & cōstanti attractione vtendum, frequentiusque cucurbita auellenda. Auertendi etiā humores, ne ad locū affectum cōfluant. in quē vsum pedes aqua calida foueri debēt, extremę partes validē deligari & fricari. collum quoq; lanis oleo calido imbutis cōtegatur. Gargarizandū etiam statim per initia ex iis quę cap. i de columellę inflammatione dicta sunt. Cū morbus vrget consistitve, iis quibus discutiendi vis inest, vtendū properē presidiis. vt est decoctū fœnigræci, ficuum, pas-

clystes.

cucurbitę.

auersio.

gargarismi.

Gargarisma.

fularum glycyrrhizæ: vel valentiorum iridis radicis, hyssopi, nigellæ, abrotani, cum oxymelite. Tale itaque gargarisma proderit, quod R^x glycyrrhizæ decorticatæ § i. passularum § s. ficuum aridarū numero vi. fœnigræci 3 ii. hyssopi, abrotani añ ms. Coquatur in lb. i. aquæ fontanæ, vsque ad medietatis cōsumptionem. colaturę adiice mellis rosacei colati § i s. oxymelitis simplicis § i. misce, fiat gargarisma. Item stercus caninū aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum est remedium, atque huius generis album maximè: tum hirundinū similiter cinis

Cataplasma.

efficax est. Foris cervici etiam adhibeantur, quæ discutere valent cataplasmata & emplastra, quale est quod R^x farinę seminis lini, fœnigræci, hordeaceę añ § i. se. althææ 3 ii. maluę flor. camomillę, meliloti añ m i. ferueant in aqua, donec mollescant: dein in mortario cōtundantur, adiectis oleorum chamęmelini, liliorū alborum añ § i s. fiat cataplasma. Non inutile est, si collū oleis, chamęmelino, anethino, liliaceo inungatur, aut decocto fœnigræci, meliloti, chamęmeliq; foueatur. Qui

Vicius.

angina infestantur, triduo aqua mulsa pro cibo vtatur: inde ptisanę cremore per se, aut cum suavi quadā portione. Pręditus enim est is succus facultate extenuandi, discutiendi, alendi, & refrigeradi. Deinde vbi inflammatio imminuta fuerit, & ægri melius iā deglu

tire cœperint, ouorū lutea perliquida, ac for-
bitiones ex alica exhibebis. In summa, cibi
aegri viribus respondeant. ideóq; immodica
alimenta vitanda. Somnus quoque, vt in o-
mnib. aliis inflammationibus, sic in angina
omnium maximè fugiendus. nam Hippoc.
teste, sanguis in somno intrò magis repit.

DE TVSSI. CAP. III.

Tussis variæ sunt causæ. Nam intemperies *Causæ.*
frigida respirationis instrumētorum, tussim
efficit. Humor etiam à capite in asperā arte-
riam distillans, & sola asperitas mēbranæ as-
peram arteriam intrinsecus ambiētis, tussim
irritant. qui præterlabūtur etiam potus & ci-
bi, tussim mouent. Lumbrici quoque stoma-
chum infestantes, tussiculas paruas excitant.
Acris deniq; humor stomachum perturbās,
ac irritatiuam aliquam qualitatem ad fauces
demittens, tussim producit. Humor etiam in
pulmone & thorace detentus, in morbo late-
rali, inflammatione pulmonis & tabe, maxi-
mæ tussis causa existit. In summa, quicquid
asperam arteriā exasperare potest, veluti fu-
mus, puluis, & eiusmodi, tussis causa esse po-
test. Signum autem ob solam intemperiem *Signa.*
frigidam tussientium est, si per crebras inspi-
rationes irritentur, frigiditate videlicet exin-
de intensiore facta & aucta. Facile deniq; sūt
pallida, siui nulla premuntur, calidis optimè,
frigidis malè afficiuntur. Moderatè & mini-

me violenter tussiūt. Id quod 6. Epid. 2. par.
 „ Aphor. 12. sic scribēs testatur Hippocrates:
 „ Tusses siccae, leuiter irritantes, nō à maligno,
 „ sed vento potius accidūt Id verò hinc mani-
 „ festum sit, quando loquuntur, aut os aperiūt,
 tunc tussiunt: cum verò nō, minimè. Quæ ve-
 rò cum titillatione partium ab vtraque pala-
 ti parte contingunt tusses, palàm ostendunt
 defluxum à capite ad asperā arteriam defer-
 ri, itémque ad pulmonem. Id quod ex diffici-
 li, quæ comitatur, spiratione deprehenditur.
 Quòd si sic affecti nihil expuāt, tenuem de-
 fluxum indicat, qui expulsionē spiritus disse-
 ctus, præ tenuitate sua rursus fluxū reflectit.

Victus.

Ratio victus iuxta causarum diuersitatem
 variabitur. Si enim ex frigida intemperie in-
 strumentorum respirationi deseruientium or-
 ta fuerit tussis, aër & ventus, cibi & potus fri-
 gidi vitandi erunt. Sin ob humorem à capite
 destillatē excitabitur, talis sit victus ratio,
 qualem suprà in cap. de Destillatione descri-
 psimus. In vniuersum verò falsa, acria, & que-
 cunque arteriam exasperare valent, vitanda.

Curatio.

Tussis ex frigiditate orta, per ea quæ instru-
 mēta respirationis calefaciūt curabitur. Cer-
 uix itaque lanis calidis vestiatur: rarò inspi-
 randum, adeò vt non solum per spiritus com-
 pressionem retinere queant ægrotātes & im-
 pedire tussim, sed sanare etiā sæpissimè, per
 respirationis inhibitionē frigefactas parti-

culas calefaciēdo. quapropter si hi leniter in-
spirant & aërem attrahūt, ac in calida domo
versantur, parum vel omnino nihil tussiant.
Thorax etiam calidis vnguētis, vt est oleum
iirinum, liliorū alborum, anethinum, & eius-
modi. Si verò humor tenuis & acris ex capite Tussis à
in thoracē destillans tussim excitauerit, tum tenuibus
per cibos potiss. boni succi, & per medicamē & acrib.
ta quæ refrigerant, spissant, & acrimoniam humori-
mordacitatēque arcent & obtundunt, cura bus cura-
bitur. In hūc sanē vsum cōuenit exhibere sy- tio.
rupū violaceum, nymphae, de papauere cō-
fectiones diatragacathē, diapenidii sine spe-
ciebus, pilulas, bechicas, & eiusmodi. item ea
etiam medicamenta, quæ à veterib. dolorem
leuantia & arteriaca dicuntur. de quibus Ga-
len⁹ copiosissimē scribit lib. 7. de cōp. med.
secundum locos. Potissimum autem hoc cō-
feret, quod R̄ cōseruæ violarū, & nymphae Ecleg-
mā 3 s. diatragacathē frigide, diapenidii sine ma.
specieb⁹ añ 3 vi. succi glycyrrhizæ 3 ii. pilula-
rum bechicarū 3 i. styracis calamitidis 3 i s.
myrrhæ, rosarū siccarum añ 3 i. tragacanthæ,
nucum pinearū añ 3 s. cum syrupo violaceo
quod satis est, fiat eclegma. Conueniunt etiā Tussis à
quæ suprā in cap. de Destillatione dicta sunt. crassis &
Si autem crassus aut viscosus fuerit affligens viscosis
humor, per ea quæ extenuant & incidunt, me- humori-
debimur. Exhibebimus itaq; syruos de gly bus cura-
cyrrhiza, de hyssopo, de prasio, de calamin. tio.

Decoctū tha, & similes. Aut decoctū hoc, quod R^x radicum iridis, petroselini, glycyrrhizæ añ § i. radicis inulæ campanæ vocatę § s. caricarum numero vii. passularum mundatarum § i. se. vrticæ, anisi, fœniculi añ 3 ii. hyssopi, adiāti, scabiosæ, prasii, añ m i s. agarici optimi 3 iii. Decoquantur in aqua fontana iustę quantitatis, donec tertia pars absumatur. Dein colētur, & colaturę adiciātur syrupi de hyssopo, de prasio añ § ii s. misce, fiat potio. Posthæc, si videbitur vtile, corpus per ea quæ crassos & glutinosos humores purgāt, vacuandū. Inter alia verò multa, quę suprà dicta sunt, vnicē cōfert agarici dilutum, quod sic fit. R^x agarici electi 3 ii. zingiberis 3 i salis gemmæ gr. iii. macerētur per noctem in vini albi odoriferi § ii. succi absinthii & fœniculi añ § i. Mane colentur & exprimantur, & dissoluantur in iis eclegmatis indi 3 ii. oxymelitis scyllitici § s. & fiat potio. Vacuato corpore, eclegmata (quę officinis Loch appellātur,) exhibenda, de pino, sanum & expertū, de scylla, diairis solomonis cōfectio, & similes, quę singula in hunc modum coniungenda sunt. R^x loch de pino, sani & experti, de scylla añ 3 ii s. diairis solomonis § i. trochiscorū pectoralium 3 i s. pulueris diapenidi cum specieb. 3 i. pulueris radicis inulę, iridis añ 3 ii s. succi glycyrrhizę 3 i s. cum syrupo de prasio quod satis est, fiat eclegma. Thorax extrinsecus inūgatur oleis

Purga-
tio.

Agarici
dilutum.

Loch.

calidis liliorum alborū, irino, amygdalarum
dulciū, adiectis pinguedinib. & aliis, in hunc
quidem modum. R. oleorum liliorum albo- Vnguen-
rum, amygdalarum dulcium añ 3 iiii. pingue-
dinis gallinæ 3 i. butyri recentis 3 ii. mucis fœ-
nigræci, radicis althææ añ 3 i s. styracis cala-
mitidos 3 s. pulueris radicis inulæ, iridis añ
3 i. croci 3 s. cum cera, quod satis est, fiat vn-
guentum. Reliqua quæ ad tussis curationem
requiruntur, ex capite de Destillatione petē-
da crunt.

DE ASTHMA. CAP. IIII.

Qui citra febrem crebrò respirant, quem-
admodum solent qui citatiore cursu fatiga-
ti sunt, eos medici Græci Asthmaticos, Lati- Asthma-
ni Anhelosos & suspiriosos vocare consue- tici.
rūt. Eosdem etiam propterea, quòd thoracis Suspirio,
corpus penitus rectum habere coguntur ob si.
suffocationis timorem, orthopnoicos nomi- Ortho-
nant. Fit autem Asthma, quum aut crassorum pnoici.
humorum ac viscosorum multitudo pulmo- Causæ.
nis bronchiis fuerit infarcta, aut tumor quis-
piâ abscessui similis in ipso constiterit. Simi-
liter autè difficulter spirant, qui asperam ar-
teriâ à multa destillatione habent repletam.
Facile autem inuicem hæ passionēs distin-
guantur. Nam destillatio etiam sanis ex ma- Signa.
nifesta causa repentè accidit, in totum ferè
citra febrem, concomitantibus etiam pro-
priis destillationis signis. Si verò tumor abs-

Vitus.

cessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur: neque ita diu post, inflammatione in pus trāsmutata, pus reiicitur cum tussi. Si autem crudum tuberculū gignatur, hi neq; gravitatē magnā sentiunt, neq; difficultate spirādi admodū infestātur. Qui propriē asthmatici & orthopnoici appellātur, in totum febrem non habēt, gravitatis verò sensus eis cōtingit, neque quippiam purulētum per sputum reiiciāt. Vitus ratio in vniuersum calida & sicca sit. vitandus itaque aer frigidus & humidus. vtendum carnibus perdicum, auicularum montanarum, gallinarum, caponū, & similibus. Fugiēdi pisces, fructus, item legumina, & omnia alia quæ crassos ac glutinosos humores procreare possunt. vitendum frequenter hyssopo, oreoselino, & foeniculo. vini autem potio ambabus cōuenit affectionibus, saltem tenuis substantiæ. In vniuersum autem paucus potus cōuenit, quibus abscessus oboritur: multus verò, quibus brōchia tenacib⁹ & crassis humorib. sunt obstrueta. Etenim hos humores repurgantia medicamenta necessario tusses commouēt. verū non facilē per sputum reiicitur ob crassitudinem, id quod repurgatum est: humectatione igitur multa indiget, quò facilius efferatur. Exercitio vtendū ante cibum, aut nō subito, quòd multi hac ratioē extincti sint. Frictiones etiam thoracis prosunt. Fugiat ager irā,

mororē, & alias animū vehemēter perturbā
 tes affectiones. Porro curatio prædictarum Curatio.
 passionū quiddam cōmune habet, quiddam
 etiā propriū: commune quidē virisq; vt redū
 dantia humoris has passiones generantis cō
 sumatur & aboleatur. Proprium autem, vt si
 à crassis ac tenacibus humoribus fiat passio,
 per extenuantia & extergentia medicamēta
 sanctur. Si verò à tumorib. abscessui similib⁹
 oriatur passio, per extenuantia & exiccātia.
 Quæ sanē curandi ratio omnibus in profun
 do corporis abscessibus cōmunis existit. In
 crassis itaq; & tenacibus humoribus, conue
 niunt extenuantia & abstergētia citra vechē
 mentē calefactionē. ab immodico siquidem
 calore, quemadmodū etiam frigore, prædicti
 humores magis crassescūt, cogūtur, & cōtra
 hūtur, ita vt subinde difficulter auelli abster
 gīve possint. Quapropter maximē prodest Præpara.
 eis oxymeli scylliticū, ipsaq; scylla assa, cum tio.
 melle trita & delincta. Syrupus itē de glycy
 rhiza, de prasio, aut hyssopo, & decoctū quod
 supra in cap. de Tussi commemorauimus.
 Quod ad euacuationē attinet, si necessitas vr Venæ se.
 geat, vena in cubito media, aut interna ante ctio.
 hęc omnia incidēda, & tantū sanguinis quā
 tum vires patiūtur detrahendum. Sin corpus
 plethoricum non fuerit, facta humorum ad
 euacuationem præparatione, medicamenta, Purga.
 quæ crassos & tenaces humores vacuare pos tio.

sunt, frequēter exhibēda. Cōueniunt in hūc
vsum pilulæ de agarico, & coccię. Confectio
diaturbit cū rhabarbaro, eclegma indi, dia-
phenicōn. Dandū etiam dilutū agarici, quod
præcedenti cap. descripsimus. Alius quoque
clysteribus fortibus eluēda. Vomendū etiam
per iterualla ex sumpta radícula, & aliis quæ
vomitum mouent, de quibus diximus lib. i.
cap. 20. Interea dum frequētiōr sit purgatio,
exhibenda etiam medicamenta quæ sensim
& paulatim extenuare ad discutere humores
in thorace possunt. Intra corpus quidem, ari-
stolochia rotūda, inulę & iridis radix, semen
urticæ, hyssopus, nigella, calamintha, & eius
modi, ex quibus decocta vel eclegmata con-
struenda. In hunc vsum loch, quæ in cap. de
Tussi recensuimus. conuenient. Thoraci fo-

Catapla-
smata.

Vnguen-
tum.

Abscess-
curatio.

rinsecūs cataplasmata ex ficub. & hordeacea
farina, cui adiecta sit resina, cera & mel, im-
ponēda. Vnguēta etiam & olea magis calefa-
cientia, irinū, anethinū, & rutaccū admouen-
da thoraci, in hūc cōfecta modū. R. oleorum
anethini, rutacei añ 3 iii s. adipis anatis, galli-
næ añ 3 ii. radices iridis, inulæ añ 3 i. sc. lini 3
i. styracis calamitidos 3 iii. cū cera, quantum
sufficit, fiat vnguentum. Thorax tamen nun-
quam non antea fricandus pāno aspero, quō
apertis meatibus facilius vis medicamento-
rum ad profunda penetrare possit. Ceterū
abscessus qui attenuantib. & resiccantibus in-

digent, ut diximus, maximè aromatum gaudent facultatibus, quas omnes cōstat esse tenuium partium & resiccatorias, nec non calefacere. Conuenient itaque tum theriaca, mithridatis cōfectio, diamoschi dulcis, aromatici rosacei, & similes.

DE PLEVRITIDE. CAP. V.

Pleuritis est inflammatio membranę, intrinsecus costas succingētis. Fit ex sanguine copioso calido, ut alię inflammationes, ad membranas prædictas præter naturam confluente. Huic accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor vehementer pungens, pulsus durus, & serræ modo asper. Et si sputum rubrum & cruentum fuerit, sanguinem superare significat: sin flauum & subpalidum, flauam bilem. Quemadmodū rursus, si album fuerit, & leuiter spumofum, pituitā: nigrius verò, melancholiam in sanguine præualere monstrabit. Succo ptisanę primis duob. dieb. contentus in cibo sit æger: deinceps ptisana amygdalę mundatę & tritę decoquantur, idque matutino potissimum tempore, vespere sumat lac amygdalarū, aut panis puri micæ cum iure gallorum, maximè ubi ægri vires imbecillas videris. Pisces etiā saxatiles in declinatione potissimum morbi dare conuenit. Acerba & adstringentia omnia vitanda. Potus sit, aqua decocti cinnamomi. Frigidam aquam, quod sputum in crude-

πλευρίτις
causa.

nota.

viētus.

curatio. affectum, iramque & mœrorem fugiat. cu-
 randi ratio cōfestim à venæ sectione incipiē-
 da. secunda verò vena cubiti interna in bra-
 chio è directo posito. hæc enim non solum à
 loco affecto retrahit, verùm etiam euacuat,
 vt in nostra apologia ea de re conscripta fu-
 issimè demonstrauius: id quod in pleuri-
 tide & aliis inflammationibus internis ma-
 ximopere requiritur. Eousque autem detra-
 hédus sanguis, donec vel multo rubicūdior,
 teste Hippocrate, vel pro puro rubidóque li-
 uidus effluxerit. Dein clyster aluo infunda-
 tur leuis, si non vt conuenit, sua sponte deii-
 ciat. qualis est qui R̄ malue, foliorum viola-
 rum, mercurialis, spinachia, intybi domesti-
 ci vtriusque añ m i. hordei integri § i. coquan-
 tur in aqua iustæ quantitatis, quoad tertia
 pars absumatur. R̄ colaturæ libram vnā,
 cassia recens extracte § i s. oleorum chamæ-
 melini, violacei añ § i s. butyri recentis salis
 expertis § s. salis communis 3 i. misce, fiat cly-
 ster. Forinsecus à corporis vacuatione calori-
 fica ac dolorem leuantia fomenta adhiben-
 da erunt, vt sunt sacculi ex floribus chamæ-
 meli, anethi, meliloti, phlomi (tapsum bar-
 batum nominant) seminibus lini & sceni-
 greci, milio & furfure compositi. Aqua etiā
 calida, aut decoctum prædictorum medica-
 mentorum, aut olea calida in vtre, vesica, vel

2. viā.
 acut. 10.
 clyster.

fomenta

vasculo adhibenda. Quinetiam vtiliter admo-
uetur sponsia magna mollisque iam dictis
rebus intincta, & subinde expressa. Vestien-
da verò fomenta sunt, vt eorum vis non cele Empla-
riter euanescat. In hunc etiā vsum cōuenient sum.
emplastrum, in eum modum compositum. R. flo-
rum chamemeli, verbasci (tapsum barbatum
vocant) anethi añ m s. seminis lini, fœnigræ-
ci añ 3 iii. seminis anisi 3 i. farinæ hordei p.
i. Bulliant in aqua vsque ad mellis crassitudi-
nem. Dein adde oleorum chamæmelini, a-
nethini, nardini añ 3 i s. Bulliant denuò, &
addantur duo vitelli ouorum, croci 3 i. &
fiat emplastrum. Post septimum diem, si eo- **Curcubi**
dem modo dolor persistat, cucurbita lateri ta.
affigenda est, & cutis scarificanda. Manife-
stissima enim in pleuriticis vtilitas ex cucur-
bitæ appositione apparet. vulnuscula autem
scarificati loci sale inspergenda, si egri susti-
nere queāt. in aliis verò linteolū oleo made-
factū ac sale cōpersum imponatur. Sequen-
ti deinde à scarificatione die, optimum est
rursus cucurbitā affigere, quò sanguis sanio-
sus ex impactis vulnusculis extrahatur. Non
negligat etiam medicus exhibere intra cor-
pus ea quæ ad sputi facilem excreationem fa- **Sputi c-**
ciūt medicamenta, vt sunt diapenidiōn, dia- **ductionē,**
tragacanthōn frigidum, saccharum viola- **facile fa-**
ccum, trochisci pectorales, adiectis etiam in **cientia.**
terdum loch & aliis in cap. de russi cōmemo

h iiii

suppura-
tionē iu-
uantia.
vnguen-
tum.

ratis. Extrinsecus adhibenda medicamenta, quib. discutiendi inest facultas, ut sunt scœnigracum, anethū, melilotum, hyssopus, & similia iam sepe commemorata. Quod si permutationis in pus signa appareāt, coadiuuare permutationem oportet. hoc aut simili vnguento: quod R̄ oleorū chamœmelini, amygdalarum dulcium, liliorum alb orū añ 3 iiii. butyri salem non experti, pinguedinis gallinæ añ 3 ii. muci scœnigraci, seminum lini, althææ añ 3. ceræ quod satis est, fiat vnguentū. Ruptā phlegmōne, ea quę extergent atq; purificant à pure ac sanie, exhibēda: ut est aqua mellis, aut decoctum bordei, aut sacchari rubei. Facta abstersione puris & saniei, glutinātia adhibenda medicamenta: de quibus omnib. in cap. de phthisi copiosè dicemus.

DE PERIPNEUMONIA. CAP. VI.

causæ.

Peripneumonia est inflammatio pulmonis, cum febre acuta. Hæc plurimum ex valentibus in pulmonem destillationibus, aut angina, aut asthmate, aut pleuritide aliisve morbis cōtrahitur. Aliquando etiam ipsa inflammatio passionis origo est. Hunc affectum subsequitur difficultas spiritus, febris acuta & ardens, grauitas distensioque thoracis citra dolorē. quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, fuerint inflammata, etiam dolorem percipiunt. malæ in his rubent, na;

sus in summo fit simus, venæ temporum eleuantur, oculi intumescunt, prostratus est appetitus, linguæ adest siccitas: aquæ frigidæ, magis autem aëris frigidi cōcupiscentia, exspiratio calida, tussis sicca. si verò quid effertur, spumosum est ac biliosum, ampliùsque cruentum & floridum vehementer. Quòd ad cibum attinet, dàda est peripneumoniciis sorbitio ex ptisanæ cremore cum melle, organo aut hyssopo. magis enim quàm in pleuritide, extenuatoriis cibis opus est: chondrus etiam seu alica cocta ex aqua mulsa iis cōuenit. Potus exiguus sit quantitate, humiditas enim nocet pulmoni. Possunt virtutis tuédæ gratiâ, potissimū si suffocatio vrgeat, vti mulsa per se, & cum nucleis pineis: aut mulsa, in qua decoctū sit hyssopum, aut iris sicca aque mulsæ inspergenda. In vniuersum autem victus ratio eorum, qui peripneumonia afficiuntur, eadem ferè sit, quæ pleuriticorum. In iis, qui ex aliis morbis in hūc incidūt affectum, sanguinis detractio vitāda est, maximè si diu malum hoc durauerit, vel si per initia sanguinem miserint. Alius clysteribus ducenda, si egrè deicit: aut cucurbitulæ, vbi nihil obstat, thoraci & lateribus admouendæ sunt, eæque pergrandes & multæ, cute incisa. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuasit, cōfestim vena in cubito interna secanda est: & si sustinuerint vires, ex vtroque brachio san-

victus.

curatio.

Sputi e-
ductio.

guis extrahendus: primum quidē modicus,
& non vsque ad animi defectionem, vt vide
licet asseruetur ad repetendam extractionē.
Si verò quid prohibeat venæ sectionē, cucur
bitulas certē vniuerso thoraci lateribúsq; af
figere oportet, úsque tantum sanguinis eli
ciendū, quantū víres patiuntur. Aut acri cly
stere alium eluere conuenit ex decocto ni
mirū hyssopi, iridis, rutæ, adiecta colocyn
thide, sale & aliis quæ suprà in cap. de Apo
plexia dicta sunt. Posthæc curādum, vt sputi
eductio quàm celerrimè & facillimè fiat. in
quem sanè vsum ea quæ suprà in cap. de pleu
ritide memorata sunt, eclegmata, vnguenta,
& emplastra conueniunt: tantum in eo diuer
sa, quòd hic omnia valentiora, & maiori ex
tenuādi facultate prædita esse debent. Con
uenient itaq; loch, decoctū hyssopi & iridis,
oleum rutaceū, nardinúm; :ceratū ex oleis
iā dictis, terebinthina, medulla cernina, iride
& hyssopo tenuissimè tritis confectum, tho
raci & lateribus impositum.

αἰμο
πτόης.
αἰμόπτυ
σις.

DE CRVENTO SPVTO. CA. VII.

Hæmoptoes aut rectiùs hæmoptysis, est
sanguinis sputio seu reiectatio. Fit ex cau
sa interdum externa & manifesta, nēpe dela
psu ex alto, aut si grauiùs aliquod corp⁹ tho
raci inciderit, clamore magno aut frigore
(nā id rumpere venas scribit hippocrates) &
confimilibus: Nōnunquam ex occulta, veluti

plenitudine, aut oris venarū apertione, aut 6. Epid.
earundē erosione. Venarum autē ora aperiū par 3.
tur ob calidas dispositiones præcedentes, ve- Aph. 10.
luti si calidis balneis plurimis vsus sit homo,
habitētq; in calida regione, consimili existē-
te maximē anni tempore, cibis quoq; & po-
tionibus calidis vtatur. ipsa verò vasorū ero-
sio ex acribus contingit humoribus, siue à ca-
pite in pulmonem delabentibus, seu in ipso
pulmone generatis. Porro sanguis modò ex
thorace & pulmone, aut aspera arteria edu-
citur: modò ex aliis locis, oris, aut gingiua-
rum, aut faucium, aut columellæ, aut ventri-
culo, ad quem ex venis ac partibus adiacenti-
bus, iecore nimirum & liene, sanguis dela-
bitur. Cause externę & manifestę, ē sermo- signa
nibus ægotantis aut assidētū cognosci pos-
sunt. Si ob plenitudinē accidit, tum cōfertim
sanguis reiicitur: At si propter oris venę aper-
tionē, tū ea quę diximus præcesserūt, & neque
inflāmationes, neq; febres, neq; labores tor-
quēt, sicut in iis euenit qui ob exesas venas sã-
guinē expuūt: sed cōtrā vacuati melius leuiūs
que agūt. si verò ex venarū erosione cruentū
sputū editur, nō confertim, sed paulatim san-
guis reiicitur, & semp peius habēt. Ceterū sã-
guis qui spumosus & subalbidus atq; ex iter-
uallo cū tussi absq; dolore reiicitur, ex pulmo-
ne fertur. si verò pituitosa cū tussi leuiore reii-
ciātur, ex aspera arteria p̄dire scito. si ater sã

guis & in grumū cōcretus fuerit, dolorēmq; in loco intendat, ex thorace educi significatur. si verò ex locis circa fauces aut columellam sanguis feratur, per excreationes excernitur: si verò ex aliquo loco oris aut gingivarum, simpliciter expuitur. accidit autē nō. nunquam per palatū sanguinem educi, propter hirudinem deuorata, & alicui indidē particulæ adhærescentem. id quod localis dolor qui concomitatur patientem particulam, & sanguis ipse qui tenuis est & serosus, ostendēt: si ex stomachoeductio fiet, non magna sanguinis eruptio cōtinget, graciles enim stomachi venæ: si verò ex iecore & liene sanguis in vētrem deferatur, aderit tumor: si autē à capite sanguis feratur, titillatio palati accidit, & frequens excreatio, atque hoc modo expuunt. irritatur enim ad tussim, & tamen non valde tussunt. Sanguis etiam colore niger est, mixtus cum aliquo pure vel pituita, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, facileque reiicitur per sputum.

viētus.

Viētus ratio sit talis quę moderatam quandam adstringendi facultatem obtineat. vtatur itaque oryza, alica, frumentaceis que aliis cibis, quibus succus mali granatorum, aut pyrorum adiectus sit. conuenient ex carnibus columbæ syluestres, turdi, perdices, si cum omphacio seu vna acerba, rhoe obsoniorum coquantur. Utendum etiam cotoneis, pyris,

pomis adstringētibus, moris rubi, & aliis supra in capite de Profluuiio sanguinis narium memoratis. Bibendum vinum crassum rubeū, aut pro eo aqua, in qua chalybs ignitus extinctus est. Cauendum ab iracundia, clamore, frequenti locutione & omni corporis motu.

Curandi ratio iuxta causarum diuersitatem variatur. Si enim à capite feratur sanguis, simplicior & exigua sufficit curatio: adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida, nisi quod defertur multum sit, curationem perficient. quæ sanè ex cap. de Columellæ inflammatione petenda sunt. Multum enim si à capite defluerit, euacuatione sanguinis per nares, aut venæ alicuius incisione opus erit. Qui ob destillationem sanguinem expuunt, his statim in principio venam incidere oportet, ac pro virium modo sanguinē detrahare. Clystere etiā adhibito aluus euacuanda. Deinde frictis quàm plurimum brachiis ac cruribus, extremæ eorū partes ligentur. Postea verò capiti raso medicamentum cui exiccandi & discutiendi facultas inest (quale est quod ex fimo syluestrium columbarū constat) imponendū. aliæque deinceps omnia, quæ destillationem reprimere & sistere possunt, de quibus suo diximus loco, adhibenda.

Qui ex pulmone sanguinem reiciūt, ruptis scilicet venis, aut earundem oris patefactis, his præcipiendum in primis, ne respirent val-

Curatio
sanguinis à capite destillantis.

Curatio
eorū qui ob destillationem sanguinē expuunt.
Frictio.

Curatio
eorū qui ex pul-

inone san dè, sonúm q; edant, & vt parum loquantur &
guinem sileant. Incidere etiam statim venam oportet
reiciunt. in cubito internā, ac sanguinis detractionem

Adstrin-
gentia.

Ecleg-
ma.

bis aut etiā ter reiterare, paulatim reuellendi
gratiā. Non enim euacuatione copiosa indi-
gent tales, nimirum à passione ipsa euacuati.
In hunc sanè vsum frictionibus extremitatū,
& earundem cum latis linteolis constriptione
& ligatura vtendum. Postquam hæc per-
acta fuerint, primū quidem poscā dilutam
& tepidam bibendam exhibere conuenit, vt
si quis sanguinis grumus ī viscere hēreat, in-
de dissolutus eiiciatur. neq; quicquam obstat
bis & ter in tribus horis hāc potionē iterare.
Post hæc autē, medicamēta adstringentia &
obstruendi meatus vim habētia, intrinsecūs
& extrinsecus adhibeātur. Per os quidē sum-
pta proficiunt portulaca comesta, succus au-
tem eius bibitus efficacior est: succus planta-
ginis, polygoni, vix acerbæ, decoctū rhois
(sumach appellant) gallę, corticis glādium,
radicis rubi, balaustiorum, seminis oxylapa-
thi, radicis equiseti, & aliorum quæ in capite
de Sanguinis ex naribus profluuiū dicta sunt.
Vsus etiam sit huius eclegmatis, quod R̄x cō-
seruæ rosarum veteris, rob dè ribes añ ̄ i. dia-
tragacāthi frigidi, diacotoneōn simplicis añ
̄ s. pulueris corallorum, lapidis hēmatidos,
terræ lemnix (sigillatam vocant) añ ̄ ii. bo-
li armenix 3 i. sanguinem draconis 3 s. ba-

laustiorum, thuris añ s. cum syrupo myr-
 thino, quod satis est, fiat eclegma. Extrinse-
 cùs thorax ex vino adstringente oleisque co-
 toneorum, rosaceo, aut myrthino irrigan-
 dus. Si verò multa sanguinis eruptio fiat, ma-
 ximè in æstate, & citra rursim eius reiectio-
 nes contingant, neque debilis sit æger, sed
 robustus & carnosus, acetum pro vino ad-
 mouendum est spongiis exceptum. Pròde-
 rit iam dictis oleis adicere bolum armeniã,
 terram lemniam, corallios, & similia, ac cum
 cera componere vnguentum quale infra lib.
 iii. cap. iii. describemus. Cataplasma quoque
 ex palmulis (dactylos vocant) acatia, sym-
 phyti radice, cortice mali granati, & len-
 tium farina apparatus, adhibendum. Nec
 minus cõfert quod ex carnibus malorum pu-
 nicorum, thure, corallis rubeis, balauistiis,
 bolo armenia, terra lemnia, & eiusmodi cõ-
 ponitur. Maximum enim hoc est, cui dilige-
 ter animum attendere oportet, vt mox factũ
 vasorum rupturã, & dum adhuc cruentum
 est vulnus, concreseat priusquam inflamma-
 tio apprehendat. Etenim si inflammatio præ-
 uenerit, parum spei est ad huiusmodi vul-
 neris conglutinationem, quippe quæ se in
 multos dies extendit: eluere enim oportet tũ
 pus tum serosum sanguinem ipsius vlceris,
 posteaquam inflammatio fuerit soluta: reli-
 quam autẽ curationẽ, quemadmodũ in ta-

Vnguen-
 tum.

Curatio bidis fieri solet, ordinare oportet. Qui ab e-
 corū qui rosione sanguinem expuunt, iis primū quæ
 ab erosio acres humores in pulmonem destillātes pur-
 ne san- gare possunt, medicamenta exhibenda, vt in
 guinem capite de Destillatione dictum est. Deinceps
 expuunt. ea quæ alterare & incrassare acres & tenues
 humores, atque adeò sistere destillationem
 valent, vt est syrupus violarum, rosarū, myr-
 tinus, miua cotoneorum, & alia quæ paulò
 antè memorata sunt. In hūc vsum interdum
 syrupū de papauere, & alia narcotica & stu-
 pefacientia adhibemus. Destillatione cessan-
 te, corrosæ partes cibis boni succi, & medica-
 mentis carnem generātibus reficiantur. Por-
 rō qui vomunt sanguinem, eādē victus ac

Curatio corū qui vomunt sangui-
 nem. curandi ratione, quæ antea dicta est, vtantur,
 solā hac curā adhiberā, ne crebrò cibum, aut
 potum sumant. quippe facilè curātur, si auxi-
 lia quæ bibuntur, particulis ipsis sanguinem
 fundentibus applicentur. At sanguine in vē-
 triculi instar grumi concreto, coagulum po-
 tandū est, maximè leporinum, vel thymbra
 seu satureia cum aceto: vel ex aloë sic affecti

Curatio vacuari debet. Qui per palatum sanguinem
 corū qui excreant, gargarizabunt ex adstringētibus,
 per pala- frontique & capiti admouenda sunt quæ ex
 tum san- naribus sanguinem fundentibus accommo-
 guinem dantur. Porro postquā omnia, vt postulat
 excreant. ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor sub-
 stiterit, vires ipsis reficiendæ sunt, robúrque

adhibendum. In primis autem cauendus frequens usus balnei, vini potio, ira & Venus.

DE EMPYEMATE. CAP. VIII.

Empyema, purulenta excreatio atq; suppuratio latinis dicitur. & empyici, hoc est, suppurati seu purulenti vocantur. Fit quādo abscessus in membrana intrinsecus costas succingente, aut aliqua alia thoracis factus acervatim rumpitur, & in vacuum thoracis locū effunditur inter pulmonem, & membranam costas succingentem. Interdum propter sanguinis eruptionem vlcere ad cicatricem non perducto, interim etiam propter cōfluxum ex capite & aliis partibus superioribus illuc manantē. ut in angina, iuxta hoc Hippocraticum, Quicumque ab angina liberantur, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si verò has effugerint, suppurantur.

Cognosces autē suppuratos hoc pacto. Gravitas adest thoracis, tussis valida siccaq; cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quem relevari quoque videntur, febricula per initia affligit, languida, inordinata, & ad iudicandum difficilis. Postquam verò ruptura abscessus iam appetit, vehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermone conturbantur, offendūtūque spiritu. Rupto abscessu aliquid in profundo thoracis transfluere apparet, iuxta multiplices reclinacionis permutationes: & maximè quā

ἐμπύημα.
μα.
ἐμπύημα.
κόι.
Causæ.

5. Aph.
10.

Signa.

ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibus in re-
 clinationibus ipsorum auditur. Pus etiã educitur, nunc purum, nunc fœculentum. Erumpunt autem suppurationes, aliquę quidẽ sursum in vacuum videlicet thoracis locum, & hæ periculosiores existunt: aliquę verò deorsum, & hæ quidem in aluum & intestina ac vesicam transfunduntur, per vasa quędã trans-
 missione ad eas partes facta. Semper autem hæctica febris laborant suppurati, quoad sursum omnia fuerint educta. **Vitus.** ratio suppuratorum talis sit. aërem inhabitet siccum. Cibis vtantur boni succi & cõcoctu facilibꝫ, iure gallorũ, carnibus gallinæ, pullorũ, auicul-
 motanarum: iure etiam cicerum cum herbis hyssopo, & oroselino, petroselinũ officinæ vocat. Potus sit aqua mulsa, aut vinũ album
Curatio. ac tenue. Porro nisi in iis summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabem accersit. Primũ igitur puris cõcoctio & digestio adiuuanda fomentis per spon-
 gias, cataplasmatibus & emplastris ex hordei, fœnigræci, & seminis lini farinis, caricis pinguibꝫ, columbarũ fimo, althęa, & resina modica cõpositis. Cerata etiam ex butyro, iride, baccis lauri & ruta cõfecta adhibenda, & alia quę collectionẽ maturare & discutere possunt: qualia multa in capite de Asthmate

dicta sunt. Posthæc, si malū hand discutitur,
 quæ abscessū rumpūt admouenda. Rupturā Rumpē-
 autem promouet in latus sanū decubitus, sal- tia absces-
 forū esus, & catapotia illa dormituro data, sum.
 quæ R pulueris hieræ picrę Galeni 3 i. pulpe
 colocynthidis 3 i. cū succo absinthii fiāt pipu-
 lā, quarū vna aut altera teneatur in ore. sic e-
 nim æger expuere conabitur, ac nimium ex-
 puēdo abscessus rumpetur. Ruptione facta,
 diligēter animaduertēdum erit quò pus pro-
 reptet. eius enim excretionē adiuuare oportet.
 Quòd si ad aluū proreptat, magis emol-
 lientia sint ea quæ offeruntur: Si verò ad ve-
 sicā serpat, ea quæ vrinam magis cient, adhi-
 benda: Si verò per tussim puris repurgatio
 fiat, nihil cōuenientiùs aut familiariùs exhi-
 beri potest, quàm ptisana optimo melle per-
 mixta. Possunt etiam ea abstergētia quæ par-
 tim in cap. de pleuritide dicta sunt, & partim
 subinde in cap. de Tabe dicentur, exhiberi.
 Cæterū quæ vrinas cient, cibis cōmode ad- Pus re-
 miscētur, vnde cūq; tādē puris excretio cō- purgan-
 tingat. Ad puris verò repurgationē mirificē tia.
 vtilis est aqua mulsa cū iride, & plurimā gly-
 cyrhiza decocta. Radicis etiā dulcis succus
 cōmanducatus prodest. conuenit etiā deco-
 ctum hyssopi, iridis, marrubii, & similium,
 quæ ex cap. de Asthmate petenda erunt. Por-
 rò deinceps in curatione suppuratorum ne-
 cessaria sunt, ea in sequent. cap. dicemus.

phthisis.

Causæ.

Signa.

5. Aph.

14.

5. Aph.

11. & 12.

curatio

cur diffi-

cilis.

Victus.

Tabes quam phthisin etiã Græci appellât, propriè est corporis extenuatio, quæ pulmonis exulcerationem sequitur. Fit propter humoris acris & erodētis à capite in pulmonem defluxum: & quum puris aut sanguinis eruptio in suppuratis, peripneumoniciis, & pleuriticis cohibetur. Tabidi cognoscuntur corporis totius & carniū extenuatione, nares etiã iis acutæ, collapsa tempora, oculi concaui, spatulæq; instar alarum prominent. Tussunt quoque ac febre hectica feбриunt, difficulter spirât, genæ liuescunt, vngues curuantur, pallidique apparent. Malo vincente, venter turbatur, sitis ipsos magis conficit, capilli defluunt, & id quod per sputum reiicitur, vehementer foedi odoris est. Difficillimè autem curâtur vlcerata pulmonis, proptereâ quòd citra tussim non repurgantur. Tussientibus autem vlcus dirumpitur, atq; quasi circuitu quodam malum reuertitur. Medicamentorum prætereâ vires ad vlcus, priusquã in ventriculo permutentur, peruenire non possunt. Denique per respirationem pulmo semper mouetur, ac tussiendo lacinatur. Vt cunque autem difficilis sit curatio, tamen nihilominus conandum, vt vlceratio illa curetur. Primùm itaq; curandum, vt conuenienti victus ratione vtâtur tabidi. Aërem siccum & in calore & frigore temperatū inhabitet.

Cibus illorū sit ptisana hordei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auium montanarum, perdicum, phasianorum, merularum, turdonum, gallinarum, caponum, vitulinae, ha-di lactantis: Pisces squamati, saxatiles, potissimum verò cancri fluuiatiles. Lac verò inter omnia cibaria tabidis optimum, primū humanum, dein asininum & caprinū, quod ex māmīs, si fieri potest, sugatur, aut statim mulctum dum adhuc calet bibatur, quemadmodum fusissimè Galen. lib. 5. Ther. meth. docuit. Animaduertendum tamen, vt statim à lactis vsus alius cibus, potissimum verò vinum nō sumatur, quod sic in ventriculo corrumpetur. Quod si tamen impensè febricitarent, putrida maximè febre, lactis vsus nō conduceret. Inter fructus profunt passulae, amygdalae dulces, nuces pineae, ficus, palmulae (dactylos vocant) pistacia. Exercitia & motus vehementes deuitent, suauiter tum ante cibum deambulare haud incommodabit à cibo penitus quiescant. Somno vtantur nocturno & mediocri. Fugiāt iram, tristitiā, vigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laconicū, & quicquid corpus exinanire potest. Potus sit vinum aquosum & tenue: aut si febris est vehemens, cinnamomi decoctum, aut Hippocras vulgo nominatum, cuius compositionem pete ex cap. de Resolutione.

Curanda verò ratio si à defluxu humoris Curatio.

i iiii

Glutinā-
tia.

acris ex capite fit, à destillationis amolitiōe inchoanda erit, quam peculiari capite suprā docuimus: in præsentia, quæ ulcerationē pulmonis curāt, docēbim⁹. In primis igitur, quæ abstergendi vi prædita sunt, & quæ, ut facîle pus sursum feratur, efficiunt, exhibēda erūt. In quem vsum cōuenit hydromeli, decoctū hordei cum saccharo & melle. Item hyssopi, iridis, caricarū, adianti, & similia. Syrupus de hyssopo, prasio, & glycyrrhiza. Si febris accedit, semina frigida prædictis cōmisceri haud inutile erit. Extrinsecus admouēda emplastra & cataplasmata ex semine lini, fœno græco, & aliis in cap. de Empyemate memoratis. Ex cap. etiam de Asthmate multa remedia ad præsentem vsum conducentia petēda erunt. Absteriso iā & à pure purgato pulmone, ea quæ ulcera eiusdem glutinare possunt, medicamenta sunt exhibenda. commendatur in hunc vsum ab omnibus saccharum rosaceum, quod & abstergendi & glutinādi facultatem obtinet. abstergit autē magis recēs, glutinat verò antiquius. Mirificè etiam confert bol⁹ armenia, sanguisq; draconis (appellatus) succinum coralli, sc. portulacæ, & similia, quibus adstringēdi & glutinādi facultas inest. Prodest etiā loch de pulmōe vulpis, cōserua symphyti maioris & adiāti, ut R^x conseruarum symphyti maioris, adiāti, hoc est, capilli veneris añ ꝑ s. sacchari rosacci ꝑ i. loch

de pulmone vulpis 3 ii. specierum diatraga-
cathi frigidi 3 iii. boli armeniae 3 ii. cum syru-
po de papauere. fiat eclegma. Cōueniet etiā
is puluis quotidie exhibitus, qui R̄ se. papa- Puluis.
ueris albi 3 v. gummi arabici, amyli, tragacā-
thi añ 3 i s. seminum portulacæ, althææ, mal-
uæ añ 3 ii s. seminum cucumeris, melonum,
citrulli, cucurbitæ, cotoneorum añ 3 iii s. ebo-
ris vsti, succi liquiritiæ añ 3 i s. penidiorū ad
pondus omnium, & fiat puluis, de quo mane
dētur quotidie 3 ii. cum syrupo de papauere,
aut rosaceo. Hoc quoq; tēpore quo cicatrix
obducitur, extrinsecus thoraci oleum myr-
thinū, aut rosaceū adhibendū, adiectis inter-
dū rhoë obsoniorū, hypocistide, malicorio,
acatia, galla & similibus. Postremum corpus
iusta & cōuenienti victus ratione reficiendū.
in quē vsum mirificè confert hoc medicamē-
tū quod R̄ pulpæ caponis 3 i. testiculorū gal vires re-
li, nucū pinearū, pistationū, amygdalarū dul parantes
ciū añ 3 s. specierū eclegmatis de gemmis 3 s. morsuli.
specierū diarhodōn abbatis, diāthos, aroma-
tici rosacei añ 3 i. santalorū alborū, cinamo-
mi electi añ 3 s. maceris 3 i. sacchari candidis
simi lb 1. dissoluti in aquis boraginis & rosa-
rum fiat confectio in morsulis.

DE CORDIS PALPITATIONE. C. X.

Cordis palpitatio est passio, quam alio Cordis
nomine tremorem cordis appellant. Practi- palpita-
carum verò, vt vocant, scriptores, perperam tio.

καρδία - cardiacam nominant. Cardiacæ enim ad stomachum, quem veteres olim cardiacam dixerunt, pertinet, ut alibi copiosè monstrauimus.

καρδία .
Causæ. Fit ab omni eo quod cor præter naturam afficere potest, ut est intemperies omnis, aut humoris multitudo in ambiente cor tunica contenta, aut tumor præter naturam, & alia quæ à Galeno lib. 5. de patientibus locis cap. 1. recensentur.

Signa. Dignoscitur faciliè de sermonibus ægri palpitationem hanc euidenter sentientis, & ex pulsu. In calida intemperie febris, & pulsus velox atque magnus existit: in frigida, contrà. Si humoris multitudo in pericardio contenta, palpitationem fecerit, pulsus est mollis & languidus. Viæ ratio, iuxta causas morbum efficientes variatur. In calida, itaq; intemperie, aër sit mediocriter frigidus: in frigida, mediocriter calidus. Quapropter ad eum modum, quæ in doloribus capitis curandis exposuimus, instituatur. In vniuersum autem vitandum, quicquid spiritum vitalem resoluit & conturbat: nimius æstus, ira, fames, vigilia, coitus, frigus immodicum, cibi mali succi. Si multitudo humoris in ambiente cor membrana contenta palpitationem procreauerit, tota diæta sit extenuatoria. Potus in calida intemperie sit vinum aquosum & tenue, aut iuleb violarum, vel rosarum aut decoctum buglossi, quod hodie borrago dicitur. In frigida, vinum meracius bibatur.

Qui ob calidā intēperiē palpitatione corri- Curatio
piūtur, iis per frigida, quę intēperiem corri- calidæ ī-
gere & corroborare possunt, succurrendū, vt tēperiei.
ex simplicibus medicamētis sunt rosę, violę,
nymphææ flores, santali, coralli, caphura, &
similia. Ex cōpositis, diamargaritōn, diarho-
dōn abbatis, saccharū rosaceum, violarū, bu-
glossi, & carūdem herbarum succi & syrupi.
Ex iis potiones, eclegmata & confectiōes
pro vniuscuiusq; arbitrio componi possunt.
Extrinsecūs admouēda vnguēta, emplastra:
potissimū autem epithemata & sacculi, &
alia quę calidā intemperie alterare possunt.
Tale itaque vnguentum componatur, quod
℞ oleorum rosacei, violacei, nymphææ añ 3
ii. corallorum rub. santalorum rub. rosarum vnguen-
rub. añ 3 i. caphuræ gr. ii. ceræ albæ quod sa- rum.
tis est, fiat vnguentum. Potest eo spina dorsi,
aut cordis regio inūgi. Imponatur cordi hoc
epithema quod ℞ aquæ rosarū, acetosæ, bu- Epithe-
glossi, añ 3 iiii. aquarū melissophylli. 3 i. spe- ma.
cierum cōfectiōis cordialis 3 i. santalorum
rub. corallorū rub. añ 3 s. caphuræ gr. iiii. cro-
ci gr. iiii. misce, fiat epithema. Vel fiat hic sac-
culus qui ℞ florum buglossi, violarum, rosa Sacculus.
rum rub. añ p. i. santalorū omnium añ 3 i. co-
rallorum rub. & alborum añ 3 i. s. margarita-
rum 3 i. Redigantur in puluerem, & cū seri-
co fiat sacculus. Cæterum qui frigida cordis
intēperie laborāt, iis prosunt ex simplicib⁹,

- ambar, moschus, crocus, lignū aloës, styrax
gariophylli, macer, zedoaria, melissa, & simi-
lia. Ex cōpositis, diambra cōfectio, diāthos,
aromatici rosaceiplirifarcoticon. Ex iam di-
ctis varia remediorū genera cōponi possunt
haud secūs quā in calida cordis intēperie.
cōuenit autē potissimū hoc vnguentū quod
- vnguen-
tum.** R^x oleorū de lilio, de spica, de croco añ. 3. ii.
gallia moschata, alypta moschata añ 3 i. li-
gni aloës 3 s. maceris 3 i. croci gr. iii. ceræ
quātū sufficit, fiat vnguentū. Epithema quod
- Epithe-
ma.** R^x aquarum melissæ, maiorana, buglosi añ
3 i. specierum diābra, diamoschi añ 3 s. ma-
ceris, ligni aloës añ 3 i. ambræ g. i. vini opti-
mi 3 i. misce, fiat epithema. Sacculus qui R^x
florū melissæ, buglosi añ m i. cinamomi ele-
cti, gariophyllorum, maceris añ 3 i. li. aloës
3 i. corticum citri 3 i. s. croci 3 i. ambræ gr. i.
Redigātur singula in puluerē & fiat sacculus
cū serico vt suprā. Porro si ab humore aliquo
- Si ab hu-
more fit
palpita-
tio cor-
dis.** in pericardio cōtento palpitatio oriat, ex-
tenuanti viciis ratione, & venę sectione quæ
in cubito est, curabitur, Gal. lib. 5. de patien.
loc. cap. i. teste, qui ibidē sic scriptū reliquit:
- „ Palpitatio cordis pluribus integra valetudi-
„ ne degentibus tum adoleſcētib. tum adultis,
„ subitò sine alio manifesto symptomate eue-
„ nire visa est, atq; omnes eos sanguinis detra-
„ ctio iuuat. Nanque hoc pacto plerique perfe-
„ ctè ab hoc symptomate liberati sunt: præser-

tim qui utebantur & victu & medicamentis, quibus inesset extenuandi facultas. Facile itaque; quibus ex iis Galeni verbis & quæ antea dicta sunt, curandi ratione instituet, ita ut diutius in ea immorari superuacaneum putem. Alijude igitur petant, quod hic omissum est.

DE SYNCOPE. CAP. XI.

Syncope Galeno lib. 12. Ther. meth. auto. Syncope
re, præceps est viriû lapsus. Fit ob plurimam Causæ.
sanguinis, aut ventris excretionem, motu vehementem, dolorem ingentem, vigilias, omnem immoderatam inanitionem, timorem, terroré, & alias animi perturbationes, ob crudorum denique humorum copiam, inflammationis magnitudinē, vitiosos & erodētes humores, auræq; foetidæ inspirationē. Cognoscitur iis notis. Pulsus est rarus & obscurus, extremarû partium frigiditas, sudor circa faciē, nitoris cutis eiusdē ablatio, & totius quasi corporis resolutio. Notæ verò, quibus causarum diuersitas deprehenditur, ex aliis capitibus, quæ partim præmissa sunt, partim verò deinceps sequentur, petendæ erūt. Generalis curandi ratio nulla est, sed habet ferè quæuis causa symptomatis suam peculiare curationē. Si enim propter sanguinis aut ventris excretionem, aut immoderatos sudores & repētinas alias euacuationes fit syncope, frigida faciē aspergere oportet, aut aqua rosacea. Extremitatē etiā corporis partes vincu-

Signa.

Curatio.

Si propter sanguinis excretionem.

lis vehementer constringendæ, ac linteis modicè asperis fricandæ. Crura quidè, si suprà eruprio fiat: manus verò, si infrà. Cucurbitulæ quoq; pro diuersitate partiũ, ex quibus sanguis erumpit, affigendæ. Os quoque aperiendum, pennarum aut digitorum immisione: auditorius autem meatus, & nares cõprimendæ, vt inspiratus aer interiora petès, spiritum reficere ac excitare queat. Confestim etiam rebus odoratis animum reuocare conuenit. Nihil enim est Hippocrate in lib. de alimento, teste, quod vires odore citi⁹ reuocet. Prodest itaque, pullos gallinaceos assos ac per mediũ discerptos, naribus ægrorum admo- uere. Post hæc, iusculis concoctu facillimis, alendus ægrotus. vinũ etiam huic tenue & dilutum exhibendũ. Balneum alui tantũ profluuiò conuenit, aliis minime. Cubiculi aer sit frigidus, stratis in pauimèto rosis, vitium palmitibus, rubis, quercus foliis, & huiusmodi adstringentibus. In immoderato sudore, exudantibus partibus oleum myrthinũ, roseum, cotoneorum illinendum: in primis verò collũ, thorax, loca sub alis & inguinibus. In hunc vsum etiam cõuenit amylum, & thuris pollinẽ, candido oui excepta aliãq; adstringentia illinere. odoramenta quoque varia offerenda, rosæ, santali, poma cotonea, caphura, flores nymphææ, & similia. Extremas autem corporis partes non oportet vincire.

Si ob dolorē syncope fit, iis remediis quib. Si à dolo
dolor aufertur, curabitur: quæ singula suis lo re.
cis, potissimum verò in cap. de coli dolori-
bus dicetur. Qui ob mœrorem, gaudium, Si ob ani
& alias animi perturbationes syncope corri- mi affe-
piuntur, ii cōtrariis curādi erunt, odoribús. ctus.
q; & aliis quæ per os sumpta spiritus recrea-
re possunt. Si propter crudorum humorū co Si ex re.
piam syncope corripiuntur, tum neq; sangui- dundātia
nis missionem, neque purgationē sustinent, crudorū
utpotē quos etiā sine his syncope subito ado humorū.
riatur. Inaniendi itaque per frictionem erūt.
Initio igitur morbi statim incipere oportet,
ac primū crura à superiore parte deorsum,
lintheis non admodū mollibus, sed modicē as-
peris: deinde & tota brachia ab humeris pa-
riter ad infimas partes perfricanda. Vbi verò
artus omnes abundē calidi videntur, & me-
tus est ne quis ex ampla frictione lassitudi-
nis sensus superueniat, oleo relaxāte utendū,
quale est anethinum, & chamæmelinū. Cū
iam artus plurimū perfricueris, postea oleū
detergetur. inde ad spinam dorsi transeundū
est, hæc q; tota perfricāda similiter: ab hac rur-
sus ad crura, & hīc ad brachia, ex inde rursus
ad spinam remeandum, & ita toto die facien-
dum: idque in splendido & minime humēti
cubiculo, cuius aēr tēperatus sit. Porro mulla
in qua hyssopum coctum fuit, his est aptissi-
ma. Cauendūque, ne vel cibum vel sorbi-

tionem, vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsā trib. primis dūtaxat diebus, vt solū illud tempus intersit quod somno datur, qui certē mediocri sit. Si pulsus robore mediocri sit, ac magnitudine, considerata quę ad aluum spectāt: & si sua sponte commodē non deiciat, clysteri securus abluē. accidit nāque post aquā mulsam, vt quę in primis venis, quę scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligūtur superuacua, commodē deiciantur. Quod si iusto maior recrementorū impetus ad aluū citetur, mulsam amplius percoquere oportebit: ita enim minus subducet. Si plenius superuacua descēdant, nec sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua mulsā ptisanæ cremor est. Si verò fluere pergant, alicæ sorbitione nutries. Si ex pulsus imbecillitate vires quoque collapsas didicerimus, panē ex vino diluto exhibere conueniet: idque si nec venter, nec iecur inflammatione laboret. nam si hac infestentur, iam corpore crudis humoribus repleto, nulla planē medicina periculo liberat. atqui si quando crassi abundē humores deprehendantur, oxymeli pro mulsā cōtinuò exhibendum. Ergo si æstas sit, & æger frigidæ potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyems sit, calidū omnibus. Sanē balneum iis est aduersissimum, tum aēr ambiēs vel nimīū calidus, vel frigid⁹. Porro iis, quos

syncope iam premit, si partes modò comme-
moratæ inflammatione vacet, panis exhibebi-
tur modicus, isque ex vino fuluo, quod cele-
rem in corpus digestionem adiuvet. et si estas
adsit & constitutio calida, aquâ frigidâ vinum
dilues: sin contrâ, calidam miscebis. Inde ad
frictionem veniendû est, quæ pro tradito quo-
que iam modo administrabitur. Verùm qui-
bus ex flava bili, quæ os ventriculi infestat,
syncope incidit, iis frigida offerenda potio
est: nōnunquā etiâ vinû, quod calidû natura
sit, solum colore, & substantia tenue. Qui te-
nuum humorû vitio syncope premuntur, hos
paulatim nutrire oportet, summâmq; cutem
densare, & aërem cubiculi refrigerare. vngen-
di sunt adstringentibus vnguētis: tum cibi iis
dandi, qui nō admodum promptè diffuāt,
ut est panis, sorbitiones alicæ, ouorum sorbi-
lium vitelli, gallorum testiculi, & eiusmodi.
vinum iis aquosum inter initia dandum est,
sumptum à cibo. Si ob inflammationis magni-
tudinem syncope accidat, artus fricandi & fo-
uendi, manûsque ac pedes vincendi, vigiliæ
imperandæ. Quicunque verò propter vitio-
sos humores erodentésq; syncope corripun-
tur, ii curandi sunt ad eum modum, qui infra
de dolore stomachi exponetur. Qui exquisi-
tam & pleniorē syncopes curandi rationem
desiderat, is legat q̄ tradit Gale. lib. 12. Ther.
methodi, & quæ infra cap. 4. libri 3. dicetur.

Synco-
per iam
premen-
tis cura-
tio.

Synco-
pes ex fla-
uabile cu-
ratio.

Synco-
pes ex te-
nuu hu-
more cu-
ratio.

Si ob in-
flamma-
tionis
magni-
tudinem.
Si ppter
eroden-
tes hu-
mores.

DE LACTIS DEFECTV. CAP. XII.

- Causa.** Lactis defectus accidit propter siccam mammillarum aut totius corporis intemperiem, propter sanguinis boni paucitatem, & quia infans imbecillis non probè ex mammis fugit. quanto enim plus sugendo ex illis adimit, tanto magis attrahitur. Notè quibus causarum diuersitas deprehenditur, notiores sunt quam ut dici debeant. Sicca enim intemperies ex habitu corporis macilento, & aliis suprà dictis dignoscitur. Sanguinis boni paucitas, ex malo corporis habitu, & ex iis quæ præcesserunt corporis, mensium nimirum aut alui profluuiio, exercitiis immodicis, inedia, & similib. inanitionib. Posthabito itaque lactis defectu qui fit ex intemperie sicca, quæ facile ex iis quæ suprà dicta sunt, & deinceps in ca. de Hætica dicetur, curabitur, de eius tantum qui ex sanguinis boni paucitate fit, curatione dicemus. In quo sanè primum sanguis est contemplandus, sic monente Galeno lib. 5. Simp. cap. 20. aut enim minor est quam conuenit, aut deterior. Itaque qui minor est, vniuersam victus rationem exposcit humectantem & calefacientem mediocriter. Quæcunque enim plus quam expediat calefaciunt, quæq; deficiant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiata, partim ipsum minorem reddentia, lac prouenire prohibent. Dare itaque conuenit panem purum, lac, carnem vitulinam,

pullorum gallinæ, perdicum, hœdorum, oua
 sorbilia, pisces saxatiles & squammatos, pas-
 fulas, amygdalas dulces, maluas, lactucā, bu-
 glossum, melissophyllon, cucurbitas & eius-
 modi. Bibendum vinum aquosum, tenue. Fu-
 giendum immodicū exercitium, ira, mœror,
 & omnia quæ sanguinem minorem efficere
 possunt. Si verò deterior est sanguis, si qui- Curatio.
 dem biliosus fuerit, primum purgationē de-
 siderat biliosi humoris, mox victū quem mo-
 dō diximus: Sin pituitosus, medicamēta re-
 quirat exalfacientia, aut primo aut secundo
 ordine: non tamen desiccantia. hæc enim pi- Lac gene
 tuitosos humores exalfacientes in sanguinē rantia.
 vertūt. Verū inter ea potiora sunt, quæ non
 rātum sunt medicamenta, sed & nutrimenta:
 velut cruca, fœniculū, anethum, apiū, sium
 eaque virentia priusquam siccētur. Nam sic-
 ca plus quàm oporteat & exalfaciunt & de-
 siccant. Quæ autem desiccant, humorem san-
 guinis depascentia, crassiorem simulque pau-
 ciorem efficiunt. Et si naturā quoque sint ca-
 lida, iusto etiam calidiorem: sin frigida, fri-
 gidiore. Debet enim esse modicè calidus, ac
 neutiquā crassus, ut ex eo lac generetur. Pro-
 inde quæ mediocriter exalfaciunt, nullām-
 que insignem adiunctam habent siccitatem,
 lactis procreatricem facultatē obtinēt: inter
 quæ, præter ea quæ dicta sunt, est sesamum in
 vino decoctum. Item butyri recentis § i. cum

vino pota. Prætereà amygdalæ dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti. Laudatur etiam hoc ferculū, quod sic conficitur. R̄ orizæ decies ablutæ, exiccatae, & in puluerē redactæ q. s. coquatúr; in lacte optimo iuxta carbones ignitos, adiciatúr; inter decoquendum sacchari albissimi quod satis est, & fiat pulmentum. Fit præstantius, si addatur amygdalæ dulces, pistacia, nuges pineæ, farina hordei, cicer, & eiusmodi. Annitendum etiam erit, vt cum leni frictione thoracis, & aliis medicamentis trahendi facultate præditis, ad mammas lac alliciatur.

DE LACTIS REDUNDANTIA. CAP. XIII.

Accidit vt interdum ob lactis redundantiæ mamillæ tumefactæ repleantur, & sic extendantur, vt copiam eius vix ferre queāt.

σταρυξ- Qui sanè affect⁹ Græcis Sparganosis dicitur.
 νόσος. Fit à causa cōtraria, nempe boni sanguinis
 Causa. copia. Visu tactūque deprehenditur. Suc-
 Signa. currendum statim huic affectui, quòd aliàs
 Curatio. metuendum sit, ne mammx inflammatione corripiantur. Inter initia itaque vena secāda poplitis, aut media quæ est in cubito. Dein vtendum iis quæ leuiter reprimūt, ne scilicet ad pulmonem impetu quodam trudatur sanguis: In hunc vsū proderit spongia, in posca madefacta, apposita, aut palmulæ (daκtylos vocāt) cum pane & posca tritæ adhibitæ.

Cōuenit etiā apponere emplastrū ex oleo ro-
saceo, santalis, coriādro, psyllio, portulaca,
farina fabarū, lentium, plantaginis succo, &
aceto, in hūc scilicet modum confectum. *Empla-*
strum.
 farine fabarum, farine lentium añ ꝑ i. portu-
lace ꝑ i. sc. lini, althæe añ ꝑ ii s. plantaginis, co-
riandri añ ꝑ ii. bulliāt in aqua, donec ad mel-
lis crassitudinem redeant. dein addantur olei
rosacei ꝑ ii. succi plātaginis, aceti añ ꝑ i. bulli-
ant denuo, & adiiciantur ouorū vitelli duo,
ac fiat emplastrū. Vel potest fieri ceratū, sic
compositum. *Ceratū.*
Rx olei rosacei, myrrhini añ ꝑ i
s. farine lentium, farine fabarum añ ꝑ i s. men-
tæ, rute añ ꝑ i. plātaginis, coriādri añ ꝑ s. cum
cera & resina q. s. fiat ceratū. Erysimon etiam
(quod rapistrū hodie vocāt) mirificè prōdest
cum aqua & melle illitū. Ricini etiā folia tri-
ta, & apium vires illitū, nō modice prosunt.
Vniuersa deniq; vict⁹ ratio talis sit, quæ pau-
cum procreet sanguinem: adeoq; inedia non
parum conferre in hac passione potest. *Victus.*

DE LACTE IN GRVMOS CON-
VERSO. CAP. XIII.

Grumescit lac, & in casei formā transit in-
terdum, quam passionē Græci Thrombosin, *θρόμβωσις.*
 quasi dices grumescentiā, nominare solēt.
 Fit ob lactis abundantiam, quum scilicet ē
 mammis non fugitur: & deinceps à nimia ca-
 liditate quod in eo tenuium erat partium di-
 gesto, quod reliquū est, cōcrescit. Idem etiā

- à frigiditate accidere solet: quæ ut concreascit
lac, nonnunquam efficere potest. Interdum
etiam lac ipsum suapte natura satis crassum
& glutinosum est, ut faciliè in grumos verta-
tur. Notæ lactis grumescantis satis mani-
festæ sunt, ex tactu enim, atque adeò relatio-
ne ægrotantis, statim dignoscitur. **Signa.**
Victus. Victus ratio iuxta causarum diuersitatem variatur. In
calida mammarum intemperie ad frigidum,
in frigida contra ad calidum declinet. Si pro-
Curatio.pter crassitiem lactis accidit passio, extenuanti
prorsus diæta utendum. Quod ad curandi
rationem attinet, si redundantiæ lactis fuerit,
nec in mammillis grumescat, ab adultis peri-
tisque mulieribus leuiter exugendum erit. Mam-
mæ autem apii virentis, mentæ, vel fœnigræ-
ci succo illinantur, aliæque quæ supra in cap.
de lactis redundantiæ dicta sunt, adhibeantur.
Leporis autem coagulum ex aqua tritum, si illi-
natur, ad omnes mammarum tumores, & pas-
siones præcipuè lactis copiâ euenientes, con-
fert. Si nimia mammarum caliditas affuerit,
tunc portulacæ succus, & solani hortensis illi-
nendi erunt. Item rosaceum cum aceto. Al-
sine etiam (morsum gallinæ uocant) illita, mi-
rificè confert. Benefacit etiam Cimolia terra
ex aceto, aut aqua, & oleo rosaceo illita. Len-
tes quoque in aceto coctæ & contusæ, illitæ
profunt. In frigida intemperie, mammæ de-
cocto chamæmeli, fœnigræci, anethi, semi-

nis lini & fœniculi fouendæ. oleis etiam chamæmelino, anethino, liliorum alborum, & eiusmodi inungendæ. Cauendum tamen, ne papillam contingant. Fel bibulum illitū confert. medulla panis cum aceto illita prodest. potest adici menta, aut apium, & fit medicamentum validius. Præter cætera hoc etiā valet, quod ℞ mellis ꝑ s. styracis calamitæ 3 iiii. fellis bubuli 3 ii. olei chamæmelini ꝑ s. myrrhæ, thuris añ 3 ii s. misceantur singula, & reducantur in formam emplastri, quod mammis imponatur.

DE INFLAMMATIONE MAMMARVM. CAP. XV.

Accidit interdū, vt aliæ inflammationes, *causa.*
propter defluxū sanguinis copiosi & calidi ad mammas. Nonnunquam ob lac casei modo coactum, atque subinde suppuratum. *signa.*
facile discernūtur: quod prior inflammatio iis quæ neque grauidæ, neque puerperæ sunt, accidat: altera verò, iam commemoratis duntaxat. In prima confestim sanguis mittendus *curatio.*
ex cubiti vena interna, vel media eiusdem lateris, nisi mensium subesset retentio. tunc enim consultius est poplitis venam secare. Post hæc *adstringentia.*
ad reprimentia veniendū medicamenta, quæ non oportet esse valida, ne ad interiores corporis partes nobiles humorum impetus tradatur: aut aliqua, quæ discutere possūt, iis miscenda. In hunc itaque vsum conuenit oleum

rosaceū cum succo solani, aceto, & decocto
 chamæmeli, linteis in iis madefactis, & im-
 positis mammæ. Valet etiam emplastrum ex
 farina hordeacea, semine lini, santalis, bolo
 Discutiē. armenia, adipe porcino, & oleo rosaceo con-
 tia. festum. Quod si reprimentia medicamenta
 non contulerint, ad ea quæ discutiunt, statim
 Empla- veniendum est. Cōuenit itaque adhibere hoc
 strum. emplastrum, quod R̄ farine fabarum, farine
 fœnigræci, seminis lini añ p. r. meliloti, cha-
 mæmeli añ 3 ii s. medullæ panis triticei ꝑ s.
 myrrhæ 3 ii. Bulliāt in aqua sufficienti vsque
 ad mellis crassitudinem, dein addantur olei
 chamæmelini, anethini añ ꝑ s. & bulliāt ite-
 rum, dein adiciantur vitelli ouorum nume-
 ro iii. croci 3 i. & fiat emplastrū. In hūc vsum
 lini semen, vel fœnumgræcum in oxymelite
 decoctum illini potest, & alia quibus discu-
 Matura- tiendi facultas inest, de quibus iam sæpe di-
 tio. ctum est. Quod si vero spes discutiendi subla-
 ta fuerit, maturatiōe auxiliabimur, quæ hoc
 Cataplas- cataplasmate perficietur, quod R̄ maluæ, fo-
 ma. liorū althææ, violariæ, chamæmelini añ m i s.
 radicis althææ ꝑ i. bulliant in exigua aqua ad
 mollitudinem vsque, dein contundantur, &
 fiat cataplasma. Vel formetur emplastrū ex
 semine lini, fœnigræci, caricis, radicibus al-
 thææ & liliorum alborum, adiectis oleis cha-
 mæmelino & liliaceo, adipib. porci, gallinæ,
 Ruptio. & similibus. Suppuratione facta, mammillæ

ruptionem sectionemve tentabis, idque medicamentis aut ferro. Medicamenta suppuratas mammas rumpentia sunt, fimus columbinus, fermentum cum pulvere cantharidum, calx viua cum fimo anserino. Si ferro potius uti placuerit, locus prope pupillam lunari sectione accuratissime incidendus erit, ut incisione abscessus quidem profunditas denudetur, sed pupilla cōseruetur. curatio reliqua talis erit, qualis reliquorum vlcerum. Si ob lac coactum inflammatio accidit, tunc vtendum per initia est spōgia molli egelida posca imbuta, expressaque loco fasciis superaccomodetur. item palmule (dactylos nomināt) cum pane & posca trite imponendæ. vel vtēdum est ouo toto, cum rosaceo. medulla etiam panis, adiectis myrrha, croco, mēta, & aliis quæ in capite de lactis redūdānita dicta sunt, imponenda. Deinceps si illa nō cōtulerint, reliqua ordine (vt iam commemoratum est) adhibenda erunt.

LIBRI SECVNDI FINIS.

κ iii

LEONHARTI FVCHSII DE
MEDENDIS SINGVLARVM
corporis humani partium, à sum-
mo capite ad imos vsq; pe-
des, passionibus,
Lib.III.

DE IMBECILLITATE VEN-
TRICVLI. CAP. I.

causæ.

ENTRICVLI imbecillitas
ex quacunque intemperie ob-
V oritur, nullis humoribus vitia-
tis. Fit etiã ex humore in ipso
finu vētriculi cōtento, qui aut

signa.

calfaciendi, aut perfrigerandi, aut humectā-
di, aut siccandi, aut etiam horum aliqua per
coniugationem efficiendi naturā obtinet: in-
terim verò & in ipsas ventriculi tunicas im-
bibito & impacto. Nudam qualitatem cali-
dam testantur, sitis vehemens, cibi fastidium,
nidorosique ructus: Frigidam cōtraria indi-
cant, modica sitis, immodica appetentia, aci-
di ructus. In humida, nulla vel exigua saltem
sitis egrum affligit, saluę copia adest: in sic-
ca, linguę siccitas, corporis extenuatio, sitis
vehementissima, saluęq; paucitas. Copiam
autem humorū nausea, vomitus, grauitas vē-
triculi, & ructus à cibo potissimū ostendunt:
& si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bi-
lis vomitus, sitis, ructus nidorosi, vētriculi mor-

sus aderunt: Sin pituita, nulla ventriculi ero-
 sio erit, ructus acidi, sitis nulla, tensio ventri-
 culi. Si ab atra bile, tristitia & metus, ructus
 & excreatio foetida, pisces olens. *Curatio curatio.*
 intemperierum per contraria fit. intemperie
 enim calidam refrigerare oportet, frigidam
 calfacere: siccam humectare, humidam sicca-
 re. Similiter verò etiam compositas intempe-
 raturas aut calfacere & siccare, aut humecta-
 re & calfacere, aut refrigerare & humectare,
 aut siccare & refrigerare oportet. Calida ita-
 que intemperie affecti, refrigerante victu cu-
 rantur, præcipuè qui ex aceto assumitur. Pa-
 nis igitur posca imbutus sit. pullis gallinarum,
 perdicibus, carnibus vitulinis cum aceto aut
 omphacio decoctis utendum. lactuca denique,
 portulaca, & similibus herbis, pomis, & py-
 ris acidis. Bibenda aqua frigida, aut vinum
 acriosum. Frigida intemperie laborantes, co-
 trariis medicari oportet, anisi, rutæ, petroseli-
 ni decocto. Cibi odoris, cinamomo, *calidæ in-
tempe-
rici.*
 calamo odorato, pipere & similibus condi-
 tur. Danda etiam compositio dia triaon pipere
 nominata, & theriaca. Vino utendum veteri,
 & subadstringenti. Humidæ remedia sunt, ci-
 bi qui citra valentem calefactionem refrige-
 rationemve siccant. præterea consuetæ potio-
 nis parcitas. *Frigidæ
intempe-
rici.*
 Siccam curabis instar hecticæ,
 de qua suo loco dicemus. copiosissimè autem
 Galen. eius curationem, ut etiam reliquarum in-
*humidæ
Siccæ.*

temperantiam ventriculi, prosequitur lib. 7.

si ventri- The. meth. ex quo ea quæ hic desiderantur,
culi im- petenda erunt. Cæterùm si humor aliquis ca-
becillitas lesaciendi vel refrigerandi vim obtinens vè-
accidat triculì imbecillitatem effecerit, diligenter cõ-
ab humo siderandum erit, an humor is in sinu seu am-
re. plitudine ventris innatet, an eiusdem tunicis

Biliofo. impactus sit. Si in sinu continetur, & biliosus fuerit, per vomitum statim expurgandus erit. Facilem verò vomitum reddit aqua calida, vel malsa dilutissima bibita. satius fuerit, si ante hæc, humectantia exhibeas, veluti pri-sanæ cremorem, aut lutea ouorū. Sin in vètrici tunicis est receptus humor biliosus, hic-râ picrâ alius purganda erit: qua sanè Gale-no ubi suprâ teste, nullum aliud medicamẽtum ad vitiosos humores qui in vètriculi ha-bentur tunicis, præstantius inueniri põt. Hu-more vacuato, victu vtantur eodem, quo qui calida intemperie affliguntur, vti debët. Ex-hibendæ etiam cõseruæ, & confectiões re-frigerantes. Extrinsecus ventriculo adhibean-tur refrigerantia, & mediocriter adstringen-tia, vt est oleum rosaceum, cotoneorum, adie-ctis fatalis, balauftiis, corallis & caphura. In-frigidantiũ tamen mediocris semper vsus sit, iuxta præsentis intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum vsus, non modò non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem mor-bum efficit. Si verò pituitosi, aut crassi & glu-

Pituito-
fo.

rinosi humores amplitudini ventris innatet,
 oxymelite vtendū est, in quo ex incidētibus
 & extenuatib⁹ quedā sint decocta: verbi gra-
 tiā hyssopus, iris, origanum, satureia, & mar-
 tubiū: Sin tunicis ventriculi impacti fuerint,
 tū prius exhibēda quacūq; lentam hāc pi-
 tuitam dissecant, pōst deinde purgādū. Qua-
 lia verò hāc sint medicamenta, capite 8. lib.
 primi diximus. Est autem & ad illorum hu-
 morum purgationē non inutilis hiera picra,
 victus ratione extenuante vtendū. cōfectio-
 nibus item calidis diatriōn pepercōn, dia-
 galanga, diacinamomi, diambra, zingibere
 cōdito, diacori, & similibus. Extrinsecus ad-
 hibenda sunt olea calefaciētia, quale est nar-
 dinum, de mēta, de absinthio, mastichinum,
 & alia eadē facultate prēdita. In hūc sanē vſū
 cōmēdantur cerata, quę vulgus medicorum
 hodie scuta stomachalia nominat. Hęc in cū
 componātur modū. R^x cinamomi selecti, ga-
 riophyllorū, pīperis longi añ 3 i. galliæ mo-
 schatæ, maceris añ 3 s. calami aromatici, thu-
 ris añ 3 i. ligni aloës 3 i. mētę 3 ii. mastichis,
 ladani añ 3 i. s. oleorū mastichini, nardini añ
 3 s. cū cera & resina quod satis est, fiat scutum
 stomachale. Aut R^x mastichis in puluerē reda-
 ctę 1 s. spargatur per coriū scuti formam ha-
 bens, & affundatur oleum nardinū. dein ad-
 moueantur igni quoad liquecant singula,
 & inspergatur cinamomi selecti, nucis mo-

Scutum
 stomachi

schatae, gariophyllorum in puluerem redactorum añ 3 i. & stomacho admoueat̃ur. Quid corrobora-
 tia ven-
 triculū. triculū. multa? medicus hec & alia ventriculum roborantia adhibeat, qualia sunt mēta, absinthiū, thus, mastiche, cinamomum, acorus (galāgā hodie vocant) zingiber, gariophylli, macer, lignum aloës, calamus odorat⁹, & similia, ex quibus variæ medicamentorum formæ componi possunt.

DE INFLAMMATIONE VENTRICULI. CAP. II.

Causa. Vētriculi inflammatio haud secūs quā aliarum corporis partium fit, à confluxu sanguinis copiosi & calidi. Hanc testatur dolor
Signa. immensus, assiduus, & qui nullus medicamentis admotis mitigari potest, tumor, æstus qui tactu diiudicari possit, febris, grauitas & nausea.
Victus. Victus ratio perinde atq; in aliis inflammationibus sit tenuis. vtendum ptisanæ cremore, abstinendum à carnibus, vino, & aliis cibis calidis. Bibat decoctum cinamomi, aut succum malorum granatorum acidorū, aut aliorum fructuum frigidorum. Parum loquatur, & dormiat. Fugiat tristitiam, & versetur in aëre mediocriter frigido.
Curatio. Curandi ratio à sanguinis missione auspicanda, modò plenitudo corporis, & virium robur absint. Incidenda autem vena cubiti interna, & pro virium robore sanguis detrahendus. Posthac
Adstringentia. ea quæ adstringunt ac reprimūt, foris vbi do-

lor & tumor maximè apparèt, sunt imponē-
da. Conuenit in hūc vsum oleum, in quo ma-
lum cotoneum decoctum sit, admixtā simul
mastichē, apponere: item succum cotoneorū
aut pyrorum, adiecta farina hordei, rosas ru-
beis, santalis, bolo armenia, & similibus, in
hunc modum. R̄ Farinæ hordei ꝑ i s. santalo-
rum alborum & rubcorum, rosarum rub. añ Puls.
3 ii. boli armenia 3 i s. cū succis lactucæ, por-
tulacæ, & rosarum, redigantur in formā pul-
tis, aut emplastri. Quòd si maiori adstrictio-
ne opus fuerit, addendum aliquid erit de suc-
co omphacii (agrestam vocant) aut hypocy-
stidis, aut rhois, sumach appellant. Hæc o-
mnia, si vehemens sit inflāmatio, actu frigi-
da sunt admoenda. Quòd si aluus nihil de-
iiciat, clysteribus leuibus irritāda erit. Neq;
temerè faciet, qui æstus vehementia paululū
remissa, casia fistularis ꝑ s. intybi domestici
succo dissolutam exhibebit. Hoc etiam tem-
pore cum adstringentibus medicamētis, quæ
extrinsecus adhibentur, aliqua quibus discu-
tiendi inest facultas, permiscēda erunt: vt est
farina scenigræci, flores chamæmeli, semen
althææ, lini, & eiusmodi. Imo cum etiam ni-
hil amplius affluit, nec repelli quod in labo-
rante particula continetur, potest, solis discu-
tientibus medicamentis vtendum: sed sem-
per adstringētia, quæ robur illius seruāt, ad-
miscēda. Id quod Galen. lib. 13. ca. 10. Ther.

Empla-
strum.

meth. copiosimè docet. In hunc sanè vsum hoc cōueniet emplastrū, quod R̄ Farinę semi-
nis lini, fœnigræci añ ʒ s. seminis anethi 3 ii.
florū chamæmeli, meliloti añ 3 iii. absinthii,
balaustiorum, rosarum rub. añ 3 ii. hypocisti-
dis ʒ ii. oleorum chamæmeli, liliorum albo-
rū, rosacei, mastichini añ ʒ s. axungię galli-
nę, anseris añ 3 ii. misce, fiat emplastrum. An-
te illius appositionem, ventriculi regio hoc
vnguento inungatur, quod R̄ oleorum, cha-
mæmelini, anethini, cotoneorum, añ 3 iii.
pulueris radicis althææ, absinthii, se. lini, añ
ʒ i. ceræ quod satis est, fiat vnguentum.

Vnguen-
tum.

DE APPETITU CANINO.

CAP. III.

Caninus
appetit.

Caninus appetitus contraria est amissio-
ni appetitus passio. plures enim cibos appe-
tunt sic affecti: atq; quum appetitum cohibe-
re nequeant, in ingerendis cibis modum ex-
cedunt: deinde multitudine eorum grauati,
& assumptos cibos citra nocumentum ferre
non potentes, ad vomitum diuertunt. postea
rursus cibo se explentes, rursus ad vomitum
reuertuntur, quēadmodū canes: vnde etiā ap-
pellationē malū hoc accepit. Fit propter fri-
gidiorē vētriculi tēperaturam, vel ob acidos
humores os vētris mordētes & irritātes. qui p-
pe frigidi humores vitiiati, rosionem quæ su-
ctioni proportionē respōdeat, inducūt, ci-
borūque appetentiā excitant: vel propter to-

Causæ.

tius corporis, quod æquo rarius & calidius
 est, immodicā dissipationē, Galen. lib. i. cap.
 7. de Symptomatum causis teste. Frigida vē-
 triculi intēperies ex deprauata concoctione, Signa.
 inflatione, fluctuatione, murmure, ac egestio-
 nibus multis deprehenditur. Acidi humores
 ex rictu acido, multaq; egestionē & liquida
 admodū cognoscuntur. Immodica dissipatio
 ubi causa fuerit, tū vētris egestionē lōge pau-
 ciores procedunt, q̄ pro eorum quæ ingerū-
 tur modo ac proportionē. Et quæ egerun-
 tur, sicciora existunt. Frigida intēperies cu-
 ratur ad eū quē suprà diximus modū. Curatio.
 si verò ab humoribus acidis ori vētris impa- Acidorū
 ctis hæc fiat passio, hiera picra Galeni exhi- humorū.
 benda erit, quū ea, ut suprà cap. i. eiusdē libri
 cōmemoratū est, ad vitiosos humores vētri-
 culo impactos educendos præstantissima sit.
 Aut si amaritudinē eius abhorruerit ager, in
 catapotia digestū exhibe. Et si pituitosi fue-
 rint humores, prius, quæ diffecant calefaciūt.
 q; deuorāda dabis. Neq; etiā temere tum al-
 lia, porrū, satureiā, organū, pulegiū, & quæ
 his similia existūt, cibis permiscebis. Vacua-
 tis vitiosis humoribus, ea tandem victus ra-
 tione utatur. Panis non sit recens, neq; be-
 ne fermentatus. Cibi sint pingues, & oleosi. Vtut.
 Sorbitiones itaq; conueniūt, quibus mel &
 oleū plurimum, gallinaceus adeps aut buty-
 rum adiectū est. Ex oleribus malua. Cerebel

la, item & pinguiore volucrum partēs, pisciūq; eodem modo & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducūt, & quæ magno cumulo accepta modicè alunt. Vinū bibant colore fuluum, substantia tenue, odorūque, & nulla adstringente sapore præditum. Hoc etenim ventriculum excalfacit, & humorum destruit acorem, vt sæpe solum suffecerit cum pinguibus & oleosis cibis ad perfectam curationem. Exhibendum autem tam ieiunīs quàm cibo sumpto, etiam si nōdum sitierint. ieiunīs autem calidum sanè, aut certe tepidius. Abstinere autem oportet ab omnibus acidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maximè verò à fructibus. Bellaria tamen eorum sint, pistacia, amygdalę, nucēsque pineæ. Lac etiam ipsis exhibendum, tum per se, tū cū melle: ita tamen vt vitemus in eis, quibus in stomacho acescere cōsuevit. in his enim maius nocumētum, quàm utilitas consequetur. Probè verò concoctum, nō solum appetitum obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionēsque eius sistit. Apparandæ etiam ex ipso lacte potiones & placentæ, vt sunt dulciaria: & oryza cum lacte decocta exhibēda. Lauare quoque per intervalla oportet, cuticulāmque ipsorum largè cū oleo pinguefacere. Ac isto curationis modo tantisper, dum à morbo liberetur æger, vtendum. Si verò ex immodica dissipatio-

ne caninus appetitus oritur, tunc eorum qui Si ex im-
 hoc modo patiuntur, cutem densare & spif- modica
 siorem reddere conuenit, cum oleo ex imma dissolu-
 turis oliuiis expresso, aut rosaceo, aut myrthi tione.
 no, aut alio in quo quippiam adstringens ad-
 lentum ignem decoctum sit. Quinetiā opti-
 ma ratione æger in aëre frigido ac perspira-
 bili versabitur. Abstineat autem ab aëre cali-
 do, cōsimilibusq; balneis, ac vini potu, & ab
 omnibus quæ tum extrinsecus tum intrinse-
 cus calefacere possunt. Potui autē detur aqua
 frigida, aut cinamomi decoctū. Ducatur æ-
 ger ad lauacrum frigidum, si quidē nihil id
 fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas,
 aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax
 nimirum, aut alia quædam. Cibi ei exhiben-
 di stabiles, & ægrè corruptibiles, ut sunt car-
 nes suillæ in vigore existentes, maximè verò
 ventres. Bubulæ quoq; pinguiore, & omnia
 simpliciter pinguia, & quæ ventri innatant,
 tardèq; concoquuntur ac distribuuntur. Sūt
 enim hi (quādoquidē ipsis natura inest acris
 ac mordax, & ut quispiam dixerit, febriculo-
 sus calor) ex corū numero qui minori nego-
 tio bubulas carnes ac alia cōcoctu difficilia,
 quàm saxatiles pisces similiāq; cōcoctu faci-
 lia cōficiunt, ut fusius in præfatione libri pri-
 mi de Alimentis Galenus docet. Ex ouis, ea
 quæ coquēdo sunt indurata, aut sartagine fri-
 xa conueniunt. Panis sit nō fermentatus, iū-

sculâq; pinguia. Oryza cum butyro decocta
 dâda. Iuxta proportionē autē quātum malū
 imminuitur, tātū ex crassi humoris cibis est
 detrahendū, & ex adstringētibus forinsecūs
 admotis imminuendū. Aliquando enim se-
 data vehementis appetitus accessione, quum
 corpus ex crudis & crassis humoribus reple-
 tur, in aliud grauius malum transitio cōtin-
 git. Inter adstringētia verò, pręter ea quę an-
 teā dicta sunt, & huic vngueto locus sit, quod
 R̄ olei rosacei ꝑ i. oleorū myrthini, cotoneo-
 rū, añ ꝑ s. succi plātaginis ꝑ ii. santalorū rub.
 mastiches, bistortę, rosarum rub. añ ꝑ i. boli
 armenię ꝑ ii. hypocistidis, acatię, sanguinis
 dracōis añ ꝑ i. cere quod satis ē, fiat vnguētū.

vnguen-
 tum ad-
 stringēs.

DE BULIMO. CAP. IIII.

Βούλιμος
 causę.

Signa.

Curatio.

Bulimos ingens Gręcis vehemensq; fa-
 mes dicitur. B̄ enim particula aliis vocibus
 adiecta, significationē earum auget. Fit ex
 ventriculi frigidityte indigentiaque, ac viriū
 imbecillitate, & ferē in totum ab externo fri-
 gore initium capit. Peregrinationes enim &
 itinera longa, maximē per niuem facta, affe-
 ctum hunc inducunt. Deprehenditur facilē.
 In principio siquidē fames multa adest, quę
 tamen nō vsquequaque perdurat. Nam post
 ea repēte animo linqūtur, cum externarū
 partium refrigeratione, & spiritus defectio-
 ne. Curatio huic malo statim adhibenda,
 quod sint qui in locis desertis, aut in balneo,

hōc ipso correpti, ex instanti, auxilii, faculta-
te destituti, perierint. Hi itaq; qui in itinere,
aut aliàs fame magna citra febrē infestātur,
aceto aut pulegio ad odorādū exhibito, aut
terra quæcūq; tādē obtigerit aceto cōsper-
sa, aut malis, aut pyris, aut aliis similibus fru-
ctibus qui ad manum fuerint, refouēdi sunt.
Auxiliatur & panis recens naribus admotus,
caseus boni odoris, caro suilla assata aut co-
cta, & in vniuersum omne quod multū alit,
maximē verò quod nidosorum ac probē cō-
ditum, sufficientēq; odorem habet. Per hu-
iusmodi enim odores tales vt plurimum re-
focillantur: quādo nihil sit, vt diximus cap.
i. libri secundi, quod odore citius vires refi-
cere possit. Extremæ etiā eorū partes fasciis
constringendæ sunt, manuūq; ac pedū sum-
mitates calidæ aquæ feruentiori imponendæ,
ipsique tum maxillarum punctura, tū capil-
lorum ac auriū vellicatione excitādi. Reuo-
catis verò iam ab exolutione, panē ex vino
diluto, aut aliud quippiam eorum quæ acer-
uatim vires reparare possunt, offeres: velut
sunt oua sorbilia, halica cum vino. Cōpen-
diosissimū enim auxiliū ex cibo sperare pos-
sunt: quē etiā si oblatū acceptare non queāt,
ori indere oportet violenter, cogerēque vt ip-
sum trāsglutiāt. cūestigio enim à fame, & ab
animi deliquio liberantur, & celeriter exci-
tantur. In hunc etiam vsum cōueniunt con-

fectiones ex odoramentis variis composita, ut est aromaticum rosaceum, diambra, dianthos, diamoschi, alipta moschata, & similes pastilli. Quod si in febribus (quod tamē raro accidit) bulimos inuasent, atq; circa exacerbationum declinationem eius accessio irruerit, intrepidē cibi sunt offerēdi. Si verō in principio accessionis, aut in vigore apparuerit, per odoramenta ab initio dicta reuocandi sunt ægri, maximē per ea quæ sunt frumētacei generis, velut est panis calidus nidore adhuc emittens, & similia. Frictio etiam partium extremarum adhibeatur, & cataplasmata ex palmulis (dactylos nominant) aut malis cotoneis, in vino decoctis. Atq; hæc usque ad remissionē facere oportet, ut opportunē cibū offerre liceat. Quod si ex his nihilo melius habeāt ægri, audendum est per ciborum ingestionem auxilium afferre. Cremorē itaque ptisanæ, aut buccellas vnā atque alteram vino albo & tenui madefactas exhibebis. His enim refocillati ac respiciētes ex improviso, deinceps usq; ad remissionis tēpus perueniunt. Quod autem liceat in accessione ipsa ægrotantes nutrire, pereleganti historia ostendit Galen. lib. 10. Ther. meth. cap. 3. ubi multa ad institutū nostrū faciētia offendet.

DE INFLATIONE VENTRICULI. CAP. V.

Causæ. Inflatur ventriculus ex flatibus in eo ge-

neratis. Generantur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in vapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas hoc nomine, quod extenuare ac dissolvere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit. Mediocris vero caliditas dissolvit quidem, & transmutat cibos, non tamen perfecte conficit: unde sane flatuum generatio contingit, ut fufius Galenus lib. iii. de Sympt. causis cap. 7. docet. Accedit sic patientibus ventriculi grauitas, & distentio: aliquando autem & tumor, ac eminentia quædam circa os ventriculi, & ipsum adeo ventris efficitur, ructusque inanes fiunt modice alleuantes, inhibitiõque flatuum, qui per aluum excerni consueuerunt. Ultra hæc vehemens difficultas spiritus ob septi transuersi compressionem adest, ut aliqui non dissimile quiddam suffocatiõis se perpeti existiment. Leuantur autem cibo inferne subeunte, & flatibus siue per ructus siue per intestina exclusis. Murmura denique intus audiuntur.

Signa.

Si itaque ex cibis pituitosis generatur ventriculi inflatio, victus ratione extenuate utendum erit, & medicamentis iis quæ in cap. i. huius libri dicta sunt. Sin ex mediocri caliditate orta inflatio fuerit, cibis utendum erit cociotiu facilibus, & boni succi. Parum etiam comedendum: inedia siquidem huic affectioni summè con-

Curatio.

- fert. Post omnē cibū vinū meracius exhiben-
dū. Vbi somnus etiā accesserit, non parum le-
uat ægrotantes. Multū autem potū tanquam
infestissimum hostē deuitent. Fructuū quoq;
atq; olerum humidorum esum semper habe-
ant suspectum. Solis etiam calidioribus vtā-
tur. hæc enim Paulo lib. i. cap. 51. teste, miti-
gant, emolliunt, flatūsque ubicūque fuerint,
discutiunt. Quod ad medicamenta ipsa atti-
net, bibant hoc decoctum, quod R̄ calamin-
thæ, ment- stri, chamæmelini, origani, mētæ,
pulegii añ m i. absinthii m s. seminum anisi,
apii, cumini, dauci, oreosclini, fœniculi añ 3
iii. seminum vrticę, carei añ 3 ii. radicis inulæ
campanę § ii. Decoquantur in aqua quanti-
tatis iustæ, quoad tertia pars absumatur. de-
in coletur, & saccharo sufficiēti dulcescat, ad-
dicianturq; syrupi de calamintha § iii. & fiat
potio, de qua (vt moris est) vna vice dentur §
iiii. Vel vtendum ista (vt vocant) tragea, quæ
R̄ specierum dianisi, diacumini, diacalamētī
añ 3 ii. seminum anisi, carui, dauci, fœniculī
añ 3 i. cubebæ, gariophyllorū añ 3 ii. zin-
giberis 3 i. piperis 3. sacchari lb s. misce, fiat
tragea. Glandes quoq; confidēter & citra di-
lationē supponēdæ sunt, ex rebus flatus pro-
lestantibus, in hunc modū formatæ. R̄ mel-
lis cocti § ii. seminum rutæ, cumini, fœniculī
añ 3 i. seminis carei, anisi añ 3 i. salis 3 ii. mi-
Clyster. sce, fiat glans. Aluo autem adstricta, clyster

infundendus, qui R^x decocti superioris lib. i. benedictæ laxatiuæ 3 vii. oleorum absinthii, rutæ, anethini añ 1. pinguedinis anseris & gallinæ, salis expertum, añ 3 ii s. salis 3 i. misce, fiat clyster. Extrinsecus etiam venter in hoc affectu cum oleis iam dictis inungendus. Aut lana in fasciculum conuoluta, & iis oleis leuiter calidis madefacta imponenda: lanæ quoque sic conuolutæ cuminum tritum, aut apii semen, aut anethi inspergatur. Aut imponatur ventriculo hoc ceratum, quod R^x oleorū rutacei, anethini, nardini, laurini, añ 1. farinæ seminis lini, fœnigræci añ 3 i s. seminis apii, carei añ 3 i. baccarum lauri, centaurii minoris añ 3 i s. gummi ammoniaci, opopanacis añ 3 ii. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratum. Ceterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum vndique comprehendens, cum flamma copiosa sæpius admota, præsidium in hac passione est, quod incantamenti cuiusquam simile efficit, Galeno etiā lib. 12. Ther. meth. autore. Castoreum etiam ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo anethino appositum prodest.

Ceratū.

Cucurbita magnā.

DE SINGVLTV. CAP. VI.

Lygmos græcè, latinè singultus, est motus venter, qui veluti ei⁹ conuulsio est, ab expultrice facultate noxia volētis extrudere fact⁹.

Λυγμός.

Causæ.

Accidit vel ex plenitudine, vel euacuatiōe, aut ob humores acres & medicata qualitate

l iiii

Signa.

curatio
singult^o
ex frigi-
ditate.Singult^o
ex pleni-
tudine.

Auerſio.

præditos, aut cibos acres & mordaces. Item propter frigiditatem, & alimenti corruptionem, quo sanè nomine maximè omnium pueris frequentes singultus eueniunt. Fit etiam in febribus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio viscere inflâmato. Causæ extrinsecæ facillè ex ægri aut assidētium sermonibus dignoscuntur plenitudo ex grauitate, euacuatio autem ex iis quæ præcesserunt. cibis corruptus ex illius nidore. acria, ex mordicatione. Singultu itaque à frigiditate oborto, oleum in quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta, lana exceptū stomacho imponendum. Oleum etiam mastichinū, & de castorea inunctum prodest. Pueros calidorum linteorum admotio interdum iuuat. Eis qui ætatis integræ sunt, in potu vinum, aut apium in aqua mulsa decoctum, aut cuminum tritum, aut asarū, aut pulegium, quodlibet eorum per se, aut simul mixta exhibenda. Vtile est & acetum scylliticum sorbendo acceptum. Denique spiritus retentio, quæ calorem auget, Galen. lib. 2. de sympt caus. cap. 6. teste, præsens est remedium. Quando verò ex plenitudine singultus oboritur, vomitus optimum remedium fuerit. Crassis autē existētibus humoribus, cum oxymelite scyllitico, calaminthæ, præsii, & similium iam sæpius commemoratorū decocto extenuādi & incidendi sunt. Deinceps ea quæ in diuersum

humorum copiam trahunt, sunt adhibenda. In quem usum conueniunt ea quæ per inferna purgant, potissimum verò clysteres, extremarum partium frictio & constrictio: cucurbitulæ, cum plurima flamma thoraci, stomacho, & dorso affixæ. Sternutatio etiam cōueniēter eis prouocatur. nam Hippocrate teste, à singultu habitum sternutatio superueniens liberat. Sic etiam vociferatio concinna cum plurimo clamore, deambulatio longa & cōcitata, equitatio, & compressio spiritus cōferunt. Ventriculus etiā roborandus erit per ea quæ intrò sumūtur, vt sunt cōfectiones in hoc in officinis paratæ. Extrinsecus oleis, vnguentis & emplastris in præcedentibus capitibus productis. Singultus autem ex euacuatione sanatur per alimenti cōuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explēt, quæ partim suprà sunt dicta, & copiose in curatione hecticæ febris dicentur. Non mediocriter autem & hic conducit, vertebrae cervicis & dorsī oleo humectante, violacco & amygdalarū dulcium nimirū, perūgere. Porro mordacibus. singultum excitātibus, primū sufficiens remediū vomitum ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stupefactionem & morsum inferentium alterationem ac discussionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigerātia. In quem sanè usum philonium exhiberi potest, aut pilulæ de cynoglossa, quæ in hoc casu mirificè sa.

6. Aph. 13

singult^o
ex euacuationesingult^o
ex mordacitate.pilulæ de
cynoglossa

Pastillus.

conferre solent. Debent ex vna drachma con-
fici sex pilulę, de quibus vnā antequam cubi-
tum eat æger sumat. Alteratur autem morda-
citas per attenuantia & exiccātia. Eiusmodi
mixtę facultatis est subiectus pastillus, qui Rę
costi, croci, spicę nardi, rosarū viridium, ma-
stiches añ ʒ s, asari, aloës añ 3 ii. opii 3 i. cum
succo psilii, fiant pastilli, de quibus detur 3 s.
vel 3 i. Commendatur hoc pharmacum à Ga-
leno lib. 8. de comp. medic. secundum locos,
cap. iii. pluribus verbis. Obtundit etiam mor-
daciditē, & ex ea obortum singultum sedat,
intybi succus potatus, cucumeris semē decor-
ticatū tritūmq; bibitū. lactucę semen eodem
modo: item portulacę succus potatus, ipsaq;
portulaca in cibo sumpta. Myxarum quoque
decoctum (sebesten hodie vocāt) in potu ac-
ceptum. Maximè tamen omnium præstat lac
asininum, aut si hoc non adsit, bubulum re-
cens multum bibitum. In eum vsum exhiberi
potest saccharum rosarum, aut violarum, dia-
rhodōn abbatis, diatriasandali, iuleb viola-
rum, & eiusmodi.

χολέρα.

DE CHOLERA. CAP. VII.

Causæ

Cholera est vomitus biliosus, nidorosus &
acidus, ad plures horas perseverans, & venter
infernè eadem simul excernit. Barbari chole-
ricam & choliricam passionē nomināt. Qui
hoc malo afficiuntur, Græcis χολερίωντες, &
Latinis cholericici appellantur. Fit ob mul-

tam cruditatē, quæ nōnunquā ex magna alimētorū prauitate, interim ex vitiosorū humorū copia originē ducit. Signa quibus deprehenditur malū hoc, manifesta sūnt: nam suprà infrāq; excernūt. Sitis etiā sequitur, impeditus pulsus, musculorūq; manū & pedum, maximē verò surarum cōtractio & tensio. Quum itaq; malum hoc acutissimū sit, & grauissimā syncopē, si paulō diuti⁹ duret, inducat, ac urata opera dāda erit, quò confectū & sine mora huc succurratur. Nemo igitur vbi copia vitiosorū humorū malū hoc cōcilauerit, mox in principio, aut cōfertim ea quæ efferūtur cohibere aggrediatur. inutilia enim cum sint, euacuatiōe indigent. quare si nauseabundus eger est, & turbatur, cibus etiā nū crudis in ventriculo manentib. aqua tepida propinari debet: deinde vomere oportet, digito vel pinna ori indita. Neq; tamen cum aqua mullā, neque aqua cū oleo mixta vomitus citādus. quòd hæc fluxiones augeat, illa verò mordacitatem operetur, & torsiones augeat. Adiuuare etiam oportet per sedē excretionem. alienū enim velut venenum insidēs, & ventrem ac intestina rodit, & humores ex vniuerso corpore attrahit. Propināda autem leuissimā purgātia medicamēta, vt est aloē, casia fistularis, myrobalanorū decoctum, & similia. Postquā aluus exinanita est, conquiescere oportet, & ventriculum ac hypo-

Signa.

Curatio.

chōdria oleo mastichino, vel nardino, vel de
 absinthio fouere cōueniet, somnūmq; accer-
 fire. Prædictis oleis admiscēda interdum alia
 quæ ventrem roborare possunt, de quibus su-
 præ dictū est, & vnguēta cōficienda. Vbi iam
 exacta apparuerit cōcoctio, balneo aque dul-
 cis, & cibis boni succi vtēdū est. In quorum
 numero est iusculum pulli gallinacei cū om-
 phacio. Carnes item auicularum mōtanarū,
 perdicum, oua sorbilia, & eiusmodi. In potu
 vtendum vino tenui, odorato, & adstringen-
 te, aut succo malorum granatorum, aut syru-
 po rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus
 sit ter aut quater extinctus. Quum verō perse-
 uerauerit malum, & gracilitas per ambitum
 corporis fiat, & maximē si vēter cōfidat, pul-
 sus minor densūque euadat, tunc sanē extre-
 mas corporis partes vinculis adstringere, ac
 oleo multo calido impinguare oportet. Ca-
 taplasinata etiā & emplastra ex adstringētib.
 & roborantib. cōposita, ventriculo imponen-
 da. Sunt aut eiusmodi, quæ ex palmulis, hy-
 pocistide, acatia, rhu obsoniorū, bolo armē-
 nia, thure, balaustis, rosis, ac myrthi fructib.
 componūtur. Efficax quoque remedium est,
 si linteum in succo malorum syluestriū ma-
 defactum ventriculo imponatur, aut hoc ce-
 ratum, quod R^x oleorū rosacei, myrrhini, co-
 toneorum añ § i. mastiches, thuris, acatiæ añ
 Scutum 3 ii. hypocistidis 3 i. santalorum alborum &
 Stomachi.

rub. añ 3 i. balauſtiorum, ſanguinis draconis
 3 s. boli armenia; i. ceræ & reſinæ quod iatis
 eſt, fiat ſcutum ſtomachale. In potu verò fri-
 gida aqua cyathi meſurâ, hoc eſt, 8 i s. abſor-
 benda præbeat. Cauendū tamē ne nimium
 frigida exiſtat. hæc enim aliquādo innatum
 calorē ſtupore ſuo extremē offendit, aut in-
 flammationē ſtomachi aut viſceris alicuius
 efficit. Inſtilletur autem huic interdum mali
 punici acidi ſuccus modicus, aut roſarū, vel
 pampini vitis decoctū. Quod ſi aciora ſint
 ea quæ excernuntur, vexetq; ardor & ſitis, cu-
 cumeris ſemen cum aquæ cyathis tribus præ-
 beatur. Datur etiam vtiliter cū amylo. Tum
 etiam intybi & lactucæ in poſca coctæ exhi-
 beantur. Poſt verò ſomnus procurandus, &
 quies omni modo. Verum ſi fluxio ſiſti ne-
 queat, vinum quoddam mediocriter adſtrin-
 gens, neque viribus validum, & quod dulce
 quidem ſit, nō autem odorum potui dādum
 eſt. Interant verò in ipſum micas panis, atq;
 ita paulatim & per interualla abſorbeāt. Vi-
 ni tamen multitudo vitāda eſt, ac omni arte
 conandū vt ipſos ſopiamus, ex roſis, pāpinis,
 rubo, & ſimilibus pauimento cōſtrato. Odo-
 ramenta quoque naribus admoueātur, roſæ,
 mala cōtonea, & eiufmodi. Illitiones etiā ſo-
 poriferæ circa frontem adhibeātur. Aluo au-
 tem adhuc egerēte, amyllum cum decoctione
 capitū papaueris per clyſterem infundatur.

Somnus
 vt conci-
 liandus.

simul enim cohibet, refrigerat, & somnū inducit. Ad vomitiones verò coercendas, succum malorum cotoneorum, pyrorum, puni-
corum, & mespilorum deuorare cōuenit. Si-
ne his quidem auxiliis cibum retinēt. extrin-
secus contra ventriculum ipsum cucurbita le-
uis quā maxima admouenda est. Ad con-
tractiones autem in musculis factas, linimen-
ta oleo calido imbuta musculis circūponere
oportet, & cerata humida seu vnguenta, qui-
bus adiectum sit aliquid castorei, & olei iri-
ni, quorum copiā in cap. de Resolutione &
conuulsione offendes. Vbi morbus inclinaue-
rit, ad balneū deducēdi sunt ægri: cibisq; refi-
ciēdi erūt, pullis gallinaceis, columbis, galli-
nis, perdicib⁹, palūbis, turdis, & cōsimilibus.

DE DIARRHOEA. CAP. VIII.

Διάρροια
Causæ.

Diarrhœa Græcis est, copiosum sine ex-
ulceratione & inflāmatione alui profluuiū.

Fit propter imbecillitatē instrumentorum
ventris, alimēta copiosa, humidiora & visco-
siora, eorumdēque corruptelam, mordica-
tionem item in vētre contentorū, defluxum
quorundam ē supernis ad vētris spatia, imbe-
cillitatēmq; retētricis facultatis. Notē quib.
Causæ discernūtur, manifestæ admodū sunt.
Si enim ob imbecillitatē fit instrumentorum
concoctioni seruientium, ventriculi nimirū,
intestinatorum, iocinoris & lienis, ex propriis
capitib. petenda signa erūt. Sin ob alimento-

rum prauorū ingestionē accadat diarrhœa, partim de egri sermonibus, partim ex iis quę excernuntur, disci potest. Si enim biliosa fuerint, flauo colore excremēta infecta crunt, neq; citra mordicationem & caloris sensum eiicientur. Aderit etiam oris amaritudo, sitis, tenuis habitudo corporis, & alia quę habitū biliosum ostendūt. Sin pituitosa fuerint, contraria prorsus quę per aluū excernūtur, erūt. Si à capite in ventrē cōfluunt humores, egestionēs spumose erunt, cerebrique temperies humida. Si à plenitudine totius corporis oriatur, aut iudicatorius sit alui fluor, signis quę in Cōmentario de Plenitudine, & in libris de Crisib. à Galeno dicta sunt, deprehēdetur. Cæterū si ab imbecillitate instrumentorum alui profluuium excitabitur, intemperies quę imbecillitatem parit, suo contrario, quemadmodum cap. i. huius Libri diximus, Alui profluuium corrigenda erit. Si autem propter alias causas fluore alui laborauerit, & natura per hūc nō temerē sistenda, quę noxia sunt & superuacua expellere tentauerit, quique correpti eo sunt, facile tulerūt, dum. tum vsquequod natura omnem suam curam impenderit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conuenit. Etenim obluētari & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit. Siquidem quę cohibētur, sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas īferūt, planē pe-

Curatio.

Alui profluuium nō temerē sistendum.

Bilioſæ
diarrhœæ
curatio.

Lac co-
ctum.

riculosos. Quare in principio ea quæ in cor-
poris commoditatem vtiliter excernuntur, mi-
nimè inhibere oportet. Postquam verò iam
diutius perseverauerit fluor, non solū super-
uacua enacuans, verum habitum corporis ve-
luti colliquās, virēsque consumens, tunc sanè
resistere eis oportet, tum per ea quæ per os su-
muntur, tum quæ per anum infunduntur, at-
que ea quæ extrinsecus imponuntur. Si itaq;
biliosa pura recremēta prodierint, in magis
salubria permutare ipsa oportet, nō tamē per
cohibitionē statim eos curare. Biliosum enī
tum in ventre, tum in ieiuno intestino aggre-
gatum, atque post coacervationem retētum
maximoperè lædet. Nam & stomachum sub-
uertit, & visceribus inflammationes infert, &
sirim accendit, & febres instaurat omnesque
prædictas in capite passionēs efficit, atque in
totum grauius malum reddit. Quòd si igitur
humores biliosi in corpore copiosi fuerint,
natura per medicamēta leuia, vt est dilutum
rhabarbari, casia fistularis, cortices myroba-
lanorum luteorum, aut mel aërium (mannā
Arabes vocant) iuuanda erit. Lac tandem bu-
bulum aut caprinum tepidū, recēs multum
in potu exhibendū, aut ad ignem decoctum
assiduēque agitarum, donec ad tertias sit re-
ductum. quod ipsum & per fluuiales filices,
ferrique laminas igni cādefactas, ac in lacte
extinctas fieri potest. In decoquēdo autē su-

perstantem cōcretionem siue spumam auferre oportet. Hōc sanè nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire poteris. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorem aut etiam acorem conuertere consuevit, maiusque nocumentū quàm commodū inferre, sanè in præsens ipsum exhibere vitabimus. Aquę verò quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctionem faciemus, donec dimidiū eius cōsumatur, atque hoc modo exhibebimus. Si autē in intestinis aggregata bilis fuerit, clysteres ex hordeo decocto saccharo rubeo, oleo rosaceo, ouorū vitellis & similib. cōfectos iniicere oportet. Biliolis vacuatis humoribus, intrinsecūs ea quę adstringunt & roborare possunt, exhibenda: ut sunt saccharum rosaceum, diacydoneon sine speciebus, diatriasantali, pastilli de spodio, mīua cotoneorū, & eiusmodi. Extrinsecūs etiā quę idē possunt imponenda medicamenta, de quib. paulò post dicem⁹. Porro in diarrhœa ex humoribus crassis & viscosis, ac eorūdem corruptione facta, haud secūs quàm in priore à purgatiōe auspicāda curatio erit. Exhibendum itaque in hūc vsum agarici dilutum cum myrobalanis empeliticis, aut aliud quod prædictos humores educere possit. Conueniunt etiam clysteres, potissimum si in intestinis viscosorum humorū copia coaceruata fuerit, ex cētaurii minoris decocto

m

Diarrhœa
ex pituitosis
humoribus.
Curatio.

Diar-
rhœæ ex
imbecil-
litate retē-
tricis fa-
cultatis
curatio.
Simpli-
cia ad-
stringen-
tia aluū.

Ceratū.

oleo rutaceo, & similibus. Intrà corpus exhi-
bēda diacydoneōn cum speciebus, zingiber
coctū, & alia quæ calefacere & exiccare pos-
sunt. Extrinsecūs etiam quæ robur addūt ad-
mouenda. Si ob retētricis facultatis imbecil-
litate orta fuerit diarrhœa, ea sunt adhibē-
da medicamēta, quæ ad alias fluxiones alui
immodicas admoventur. Irrigationes itaque
ex oleo omphacino aut rosaceo, aut melino
cum vino aliquo austero. Efficacius autē his
est myrthinum, si vehementiori opus est ad-
strictione. Gallas etiā, malicorium, & balau-
stia in oleis prædictis incoquere licebit. Per-
seuerante autē adhuc fluxione, emplastra &
cerata ex adstringentibus & exiccantib. ap-
parata, imponenda erunt, quorum aliqua in
cap. de Lienteria describemus. Est autem in
primis hoc efficax & parabile, quod R^x mo-
ra præ immaturitate adhuc acerbiora & albi-
cantia septem, quibus ubi probè contusa fue-
rint, addūtur olei rosacei ℥ ii. ceræ ℥ i. & fit ce-
ratum. In potu verò accepta, vētris fluxiōes,
post sufficientem inutiliū euacuationem, sa-
nant, cuminum, adianti decoctum, spinæ al-
bæ radix, apii similiter semen drachmæ pon-
dere datū. vrinam enim irritat: fluxiones ad
intestina factas, eò diuertēs. Mora etiā imma-
tura, & adhuc acerba, ad solē pluribus dieb.
exiccata, deinde reposita, vsq; expetente tri-
ta & bibita, mirificè aluum restringūt. Con

tunduntur quoque; & obsoniis admiscetur, quæ
admodum rhus (sumach nominatur) consuevit.
Interdum enim eius & i. cum pullo gallinaceo
decoquitur. Magis tamen aluum cohibent ru-
bi mora immatura, & acerba, eodem modo
exiccata, & in potu exhibita. Inter compositas Composita
medicinas mirifice conferunt, pastilli de spo- ta cohibere
dio, theriaca, diacydoneo, diatriasanti: & tia aluum.
hec quæ R^x specierum diatriasanti: specierum Compositio
diarhodon abb. añ ð ii. coralliorum rub. thuris in morsu
electi, rosarum rub. añ 3 s. spodii 3 i. seminis acc lis.
rosæ, rhois obsoniorum, id est sumach, añ ð
i. balauft. acatię añ 3 s. mastiches ð s. boli ar-
menię 3 i. sacchari candidissimi & viii. dissoluti
in aqua plantaginis, fiat compositio in morsulis.
Aut hoc eclegma, quod R^x sacchari rosacei ve Eclegma
teris, diacydoneon sine speciebus, rob de ri-
bes, rob. de oxyacantha, id est de berberis, añ &
s. miue cotoniorum simplicis 3 iii. diamoron 3
v. specierum diatriasanti ð ii. coralliorum rub. ð
s. spodii, balauft. añ 3 s. boli armenię 3 i. cum
syrupo myrthino, fiat eclegma. Ceterum ista
aquam nunquam non paratam habebis, quæ R^x rhois Aqua.
obsoniorum quartam unam, aquæ pluuialis lb iii. Diar-
In quibus die & nocte sumach maceretur, de- rhœæ ex
in bulliat. & rhu bene ac valide exprimatur. defluxu
In ea siquidem aqua oryza, milium, & alii cibi humorum
coquantur, aut saltem aliqua illis portio affun- è super-
datur. Si propter defluxum ab aliis corporis his ortæ
partibus diarrhœa accidit, curatio ex pro- curatio.

priis capitibus petenda erit. verbi gratia, si ex capite defluxio fit, ad ea quæ in cap. de curatione destillationis dicta sunt, recurrédū erit

DE LIENTERIA. CAP. IX.

Λευτε-
ρία.

Causæ.

Signa.

Lienteria, quemadmodū ipsum nomen indicat, leuor quispiam intestinorum est: passio nimirum, in qua intestina cibos non retinent, sed antequam in ventriculo coquātur, celerrime excreta dilabuntur non cocta, sed qualia antè sumpta fuerunt. Latinis itaque leuitas, aut leuor intestinorū dici potest. Oboritur autē frequēter, dysenteriā magnā præcedēte, & ex profunda vlceratione, cicatrice densa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem quidem suam, ciborū per corpus digestionem fieri non permittit, quum sanè venarum ora sint veluti obturata: venarum inquam, quæ alimentū ex intestinis ad se auclunt: ob leuiorem verò cibum statim, & priusquam permutationem & perfectam concoctionē admittat, dilabi sinit. Fit nōnunquam ex imbecillitate facultatis cibos in ventriculo concoquentis ac digerentis. Hac enim imbecilla, nec coquuntur nec digerūtur alimenta: sed cruda, humentia, imperfecta, nihilve immutata excernuntur, aluo cōtinenter fluida. Interdum etiam post longum vētris profluuium oboritur. Aliquādo etiam aqua inter cutem per ventrem euacuata, lienteria cōsequi solet. Ex quacūque igitur causa lien-

teria orta fit, egri cibum non sentiunt, & malum corporis habitū acquirunt. Succedit itaque egri assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autē simul & ardor per tota hypochondria se dilatās, quem cibi concomitatur fastidiū. Cæterum quum eiusmodi passio fit, facile est itelligere, quod facultatem retentricem & concoctricem tum ventristū intestinorum omni modo refocillare oportet: id quod in primis per ciborum conueniētium exhibitionem fieri potest, & victus rationem restituendis ac refocillandis virib. aptam. Conueniunt itaque carnes auicularum mōtanarum, pulli gallinacei assi, in quorū ventre rhus, aut mastiche imponi etiā debet, & alia quę in cap. sequenti de dysenteria commemorabuntur. Vinū bibendum adstringens. cibus autem qui exhibetur, quantitate paucus sit, & cōcoctu facilis. Potus etiā exiguus sit: multis enim, vētris fluxionibus omnibus infestissimus existit. Si itaq; ex imbecillitate facultatis cōcoctricis fit lienteria, eodem modo quo in capite de imbecillitate ventriculi dictū est, curetur. Intra enim & extra corpus adhibenda ea quę adstringunt, & tam ventriculū quā intestina roborare possunt. Exhibēdus itaq; syrupus de absinthio, aut menta, confectionesque alię vētriculum corroborantes. Extrinsecūs verò admo-

Curatio.

Curatio
lienteria
ex imbecillitate
facultatis
cōcoctricis.

da sunt ea quæ in capite de Diarrhœa dicta sunt, & in sequenti de Dysenteria cap. dicentur. Conueniet autem in primis hoc vnguentum, quod R^x oleorum mastichini, de absinthio, de mēta, myrthini añ 3 ii. pulueris cina-momi electi, gariophyllorum, galangæ añ 3 i. balauſt. roſarum rub. añ 3 s. ceræ quod ſatis eſt, fiat vnguentum. Vel hoc ceratum, quod R^x oleorum mastichini, de absinthio, coto-norum añ 3 i. olei de menta 3 s. calami odorati, gariophyllorum, thuris añ 3 i. ligni aloës 3 s. roſarum rub. ſantalorum alborum & rubeorū añ 3 s. mastiches, cumini añ 3 i s. hypocistidis, acatię, rhois, hoc eſt ſumach, añ 3 i s. gallię moſchataę 3 i. cū cera & reſina quod ſatis eſt, fiat ceratum. Porro quib. cicatricem faciendam eſſe coniectamus, iis etiam acriū rerum comestiones frequentiores aptæ exiſtunt. Acrium enim rerum comestio velut refricatio nem quandam cicatricem operatur, quin & inſitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodammodo refocillat. Conuenient itaque in hoc caſu Gal. cap. 95. artis medicinalis autore, quę ſufficienter abſtergunt, & parum adſtringunt. Admiſcēda itaq; ſemper adſtringentibus medicamentis abſtergētia. In aliis cauſis lienterię omnib. eodem curationis modo vtendum eſt, quo in diarrhœa & dysenteria affectis vtimur.

Vnguen-
tum.

Ceratum

Si à cica-
trice fa-
cta liente
ria oria-
tur.

Dysenteria propriè Græcis exulceratio *δυσεντερί* est intestinorum. Latinis tormina, quod intestina dolore torqueantur, nominatur. Fit in. *εἷα.* Causæ. interdum à causis extrinsecis, veluti frigidityte, ardore, & humiditate. Item malignorū medicamentorū potu, scammonia scilicet, & similia. A fructuū comestione, cruditatibus, acrim ciborū acceptione, ab humorib. mordacib⁹ & acris ex vniuerso corpore ad vētrem confluentib. aut in ipso natis. Hæc quidem nunc ex tenesmo, nūc per se incipit. Ex. Signa. cernūtur primū biliosa, varia, subpinguia: pingui nimirū quod intrinsecus intestinis adhæret, paulatim circumliquefacto. Quū verò superficies intestinorū perfectè fuerit denudata, exulceratioque supernè consistit, feculenta ac cruenta excernūtur. Vbi autē altius penetraverit vlceratio, etiā sordes pelliculas admixtas habētes expellūtur. Et si nō celeriter cohibeatur, vicinos locos depascitur: saniosa verò quædā excernūtur, qualia à mortuorū cadauerib⁹ defluere cōsueuerūt. Quando igitur ab exulceratione cruenta stercorei cōmixta, cū labore & torminibus, mordacitate ac exolutione, vt nō pcul ab animi deliquio intestinis ægri absint, deiiciantur, à sitiq; infestetur, & consistit. febricitent, vlceratio tenuia intestina obsidet. Si in cras Sin autem sincera ac multa egerūtur sterco. floribus.

m iiii

Vi&us.

ra, & coaceruata, & cum flatibus prodeunt, pinguiâ quoque iis cōmixta fuerint, & cruor supernatauerit, in crassis intestinis vlcus consistere credendū est. Id quidem nosse, nō mediocriter ad curationem conducit. Nam si in superiorib⁹ intestinis vlcus est, ab epotis medicamentis præsidium petendum est: si verò in crassioribus, clysterem subiicere magis cōuenit. Principiū curationis dysentericorum à quiete & modico cibo fiat, vñdecunque tandem fluor procedat. Permittentibus itaque febribus, lacte recēs multō adhuc calido vtēdum est: aut pro eo lac coctum, quod in capite de Diarrhœa descripsimus, exhibendum. Primū enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt cōtemperando: postremū verò aluum sistit. Oportet autem insuper & panem madefactum, à lactis acceptiōe offerre. Pultes etiam ex lacte apparatus, tum medicamentum, tum nutrimentum optimum præbent: velut est oryza cū lacte, amyli, & oua lacti commista. Sorbitiones quoque aut pultes ex alica miliōq;, adiecto rhoe, cōueniunt. Apparāda item puls ex siccis panibus affusa posca, aut palmarū aut malorum cotoneorū aut pyrorum aut rhois succo. Lenticula quoque probè assata cum plantagine, aut malis cotoneis contusis decocta exhibenda. Olerū vsus non est necessarius: attamē degustandas exhibebis, serin seu endiuia coctā, plātagi-

nem, brassicamque bis coctā. Damas & ouorum assatorum lutea. Carnes, dysentericis nō valde commodæ existunt: dandæ tamen eis qui diuturno malo vexantur. Ex iis autē præ ceteris volucrum eligendę, perdicis nimirū, palumbium, & mōtanarum aucularum. Ex pedestribus carnes capræ & leporis conueniunt. In potu à principio quidem aqua pluuiā, quæ non sit ex ædibus plumbo interceptis delapsa, vtendum est. talis enim aqua sanis etiam potata dysenteriam conciliat. Quod si pluuia optima non adsit, fontana in qua chalybs ignitus extinctus sit, vtetur. Si verò laborauerit stomachus, aut vires fuerint deiectæ, etiam vinum præbendum. sit autem adstringens, & non valde vetustū. Somnus optimum dysentericis remedium. Quod ad curandi rationem attinet, sciendum quidē vtendum esse remediis adstringentibus, obtundentibus, resiccantibus, & urinam mouentibus, atque adeò fluxionem transferentibus. Quę adstringunt, hæc sunt: lapathi semen, rhus (sumach vocant) galla, malicorium aridum, rubi radix, ladanum, acatia, hypocistis, balauustum, folia salicis, symphyti (consolidā maiorem nominant hodie) radix, folia & semē: rhēon ponticum, si haberi potest: althææ radix, equisetum, coralli, mastiche, coagulum leporis, sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, verbasci radix, mora acerba, acini

Potus.

Curatio.

Adstringentia.

Obtūden-
 tia. vūe, plantaginis semen, similiter folia & ra-
 dix, maceris cortex. Obtundunt autē & con-
 temperant humorum morsum & acrimoniā,
 amyllum, tragacātha, gummi arabicū, adeps
 caprinus, hircinus, & suillus, anserinus ac gal-
 linaceus. Resiccat coagulum leporis, cornu
 ceruinum vsum, testē cancerorū fluuialiū, &
 Resiccan-
 tia. saluia. Vrinam mouentia petē ex suo capite.
 Si crassio-
 ra intesti-
 na exulce-
 ratione
 laboraue-
 rint. Clyster
 abstergēs
 Infusum
 congluti-
 nans. Quod si itaq; crassiora intestina exulceratio-
 ne laborāt, clysteres adhibeantur: primū qui
 dē abstergendi vi præditus, qualis est qui R̄
 aque decoctionis hordei integri lb̄ i. mellis
 rosacei colati ℥ i. sacchari rubei ℥ s. vitellos
 oui numero ii. olei rosacei ℥ iii. misce, fiat cly-
 ster. Facta absterfione, ea quæ glutinare pos-
 sunt infundantur, quale est quod R̄ rosarum
 rub. plantaginis, foliorum symphyti, polygo-
 ni (corrighiolam vocant) verbasci, añ m. i. gal-
 larum, rhois obsoniorum añ 3 ii. bursæ pasto-
 riæ m. s. balaustiorum 3 i. oryza tosta ℥ i. ra-
 dicis symphyti ℥ s. Decoquantur singula in
 aqua chalybeata, donec tertia pars absuma-
 tur. Dein R̄ colaturę lb̄ i. succi plantaginis ℥
 ii. acatię, hypocistidis añ 3 ii. boli armenię,
 sanguinis draconis añ 3 i. adipis caprini, ℥ i.
 oleorum rosacei, myrthini añ ℥ i s. misce, fiat
 infusum. Interdum dolor tam vehemens est,
 Dolor le-
 niens in-
 fusum, vt non solum obtundentia, verumetiam stu-
 pefacientia medicamenta sint iniicienda. In
 quem sanē vsum conuenit hoc vti clystere,

quod R^x lactis caprini aut vaccini lb i. butyri
 salis experti ℥ i. adipis caprini ℥ i s. tragacan-
 the, gummi arabici añ 3 i. vitellos ouorū nu-
 mero iii. m. pilularum de cynoglossa 3 i. olei
 rosacei ℥ iii. misce, fiat clyster. Si vehemētiōri
 stupefactiōe opus fuerit, opii grana aliquot
 pro pilulis de cynoglossa adice, nempe tria
 aut quatuor. Cāterū si in tenuibus intesti-
 nis exulceratio cōsistit, tum remedia quæ per
 os sumuntur, magis desiderat. Cōuenit itaq;
 decoctum ex rebus adstringentibus suprā cō-
 memoratis, adiectis syrupis rosacco & myr-
 thino, cum aliis quæ in cap. de Diarrhœa di-
 cta sunt, exhibere. Potest etiam hoc medica-
 mētum assumi, quod R^x decocti radicis sym-
 phyti, aut alterius medicamēti adstringentis
 ℥ iii. syrupi rosacei ℥ i. syrupi myrthini ℥ s.
 pulueris trochiscorū de spodio, feminis plan-
 taginis, boli armeniae añ 3 ii. misce, fiat po-
 tio. Extrinsecus præter ea quæ cōmemorata
 sunt in capitibus de Diarrhœa & Lienteria,
 admouendū erit hoc ceratū, quod R^x oleorū
 mastichini, rosacei, myrtini, cotoneorū añ ℥
 i. farine hordei, fœnigræci añ 3 i s. rosarū rub.
 plātaginis añ 3 i. balaustiorū, sanguinis dra-
 conis añ 3 s. Boli armenie, 3 i. hypocistidis, a-
 catie, mastiches añ 3 ii. cū cera & resina quod
 satis est, fiat ceratū. Possunt & multa alia ad
 exēplum illius cōponi, quæ cōmemorare sin-
 gula & superuacaneum & inutile iudico.

Si in te-
 nuibus
 sit exulce-
 ratio.

Extrinse-
 cus quæ
 adhiben-
 da.
 Ceratum
 optimū.

DE TENESMO. CAP. XI.

Tenes-
mus.

Tenesmus est assidua & quæ differri ac deuitari non potest, desidendi seu egeredi cupiditas, qua tamen nihil præter modica cruenta, vel mucosa, egeritur. Latinis tenesm⁹, barbaris medicis nostri temporis tenasmus. Fit

Causa.

interdum propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, humores acres, biliosos, aut pituitam salsam, vlcus, aut inflammationem in intestino recto obortam. Interdum etiã stercoris in intestino cæco coacti obstructio tenesum efficit. Causam extrinsecã de sermonibus egri intelliges, quia nimirum podice attigit res frigidas, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex iis quæ

Signa,

excernuntur dignosces, quæ vel biliosa aut pituitosa erunt. In vlcere purulenta ac saniosa excernuntur, & in ano doloris pungentis sensus inest. Inflammatio tumorem recti intestini, & dolorẽ grauatiuum vnã cum febre efficit. Stercoris multitudinem grauis distentionis sensus circa imum ventrem sequitur.

Curatio.

Si à frigore.

Curã di ratio iuxta causarum diuersitatem variatur. Si itaq; tenesum frigus præcesserit, vinum meracum calidum bibendum dato: ac pectinem, inguinãq; ac inter anum & scrotũ intercapedinẽ, *αἰγινάιον* Græci vocãt, oleis ac fomentis calidis irrigato ac foueto: qualia sunt rutaceum, & liliorũ alborũ. Fur-

fures autem in vino decocti, ac sacculo excepti, commodè sedi adhibentur. Clysteres quoque ex decocto mentastri, origani, calaminthæ, chamæmelo, abrotano, semine anisi, feniculi, & similibus cōfecti, adiectis oleis anethino, chamæmelino, liliaceo que, iniicere oportet. Porro mirificè cōfert, si statim ab excretiōe admoueat later perquàm vetustus & à fumo denigratus, vnà cum complexis in eo paleis tusus, deinde feruēti aceto subact⁹, linteoloque illigatus sedi subditus. Si à bilio
sis humo
ribus. Caterū si à biliosis humorib⁹ in ano ac intestinis detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abstergendi atque abluendi inest facultas, iniiciendi sunt, qualis est qui R̄ decocti hordei lb̄ i. sacchari rub. ℥ i s. mellis rosacei ℥ i. vitellos oui numero ii. olei rosacei ℥ iii. misce, fiat emāma. vitet omnia acria æger, ac vtatur mediocriter frigidis & humidis, quæ bilis feruorem obtundere possint. Si à pitui
tosis. Si à pituitosis humoribus procreetur, tum curabitur vt is qui à frigore factus est, adiectis tantū clysteribus iis, quæ pituitam vacuare possunt medicamentis, benedictâ nimirū laxatiuâ, aut eclegmate indi, vel diaphœnicôn. Si verò ab inflāma Si ab in
flamma
tione. tione oriatur tenesmus, ptisanæ succus, paucis rosis rubeis simul cum eo decoctis infundatur. Aut vehementiori infestante inflāmatōe, R̄ decocti plantaginis ℥ v. olei rosacei ℥ ii. oui ablumen vnum. misceātur omnia, &

- iniiciantur per clysterem. Extrinsicè perinæon, hoc est, locus inter scrotū & anū, oleis rosaceo & myrthino irrigādus. Aut adhibeatur tale fomentū, quod R^x rosarum rub. plantaginis añ m i. balaustrionū 3 iii. fidiorum § i. baccarum myrthi 3 ii. foliorū rubi § i. Decoquantur singula in aqua sufficiēti, donec tertia pars absumatur. In eo decocto imbuta spōgia sedi adhibeatur. vbi opus est suppuratione aut digestionē, fomenta ex decocto radicis althææ, fœnogræco, chamomillæ, meliloti, & farfurum cōposita adhibenda erūt.
- Fomentū.** Si verò ab vlcere fiat teneſmus, primū abstergentia infusa, dein glutinantia, haud secus quàm in dysenteria, adinouenda. vnguentum etiam hoc sedi inditum cōfert, quod R^x olei rosacei § i s. mucositatis tragacanthæ, gummi arabici añ 3 iii. cerusæ, plubi vsti añ 3 s. aloës, thuris añ 3 i. ceræ quod satis est, fiat vnguentum, quo linamenta imbuta sedi indantur. Si dolor immensus fuerit, prædictis opii 3 i. addi potest. Si à stercoris multitudine oriatur teneſmus, tum clysteribus leniētibus paulatim stercora educi debent, hoc nimirum vel simili, quod R^x malux, althææ, mercurialis, betæ, foliorum violæ añ m i. se. fœnigræci, lini añ § s. Bulliant omnia in aqua sufficiēti, donec tertia pars absumpta fuerit. R^x colaturæ lb i. & dissolue in ea casia fistularis § i s. olei communis § iii. salis triti 3 i. fiat encima.
- Si ab vlcere.**
- Vnguentum.**
- Si à stercoris copia.**
- Clyster.**

Porro hoc etiam vnice cauendum erit, ne purgantia tum medicamenta bibenda dentur, quod inde summum ægrotanti exitium imineat, attractis aliunde exque toto corpore ad priorem copiam stercoreum excrementis, vt diffusè in Paradoxis docuimus.

DE COLI DOLORIBVS. CAP. XII.

Dolor qui in laxiore intestino, quod colon appellatur, suboritur, ob multas causas *Causæ.* fieri solet, potissimū verò quatuor. Primum propter crassos & pituitosos humores intra coli membranulas subsidentes. Secundò, propter flatulentos spiritus, quibus nō sit exitus. Tertiò, ob inflammationem, intestinū hoc distendens ac male habens. Quartò, propter acres & erodentes humores, qui colon dictū *Signa.* intestinum infestant. Quibus crassus pituitosusque humor dolorem excitat, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim verò vbi coli situs est, ibi quasi tundi ac perforari intestinū sentiunt. Tormina quoque affligunt, ructus, nausea, vomitio varia, potissimū pituitæ. Aluus grauitè impedita nihil reddit, ac ne spiritū quidem transmittit. Stercus autē quādoque excretū, bouino simile videtur, leue & flatus plenū. Præcedēs horū causa est, continuus ciborū quàm maximè frigidorū crassiq; succi vsus, satietas, cruditas, ocium, & iis finitima. Qui autem ex spiritu flatulento dolēt, tensionem magis experiūtur,

Quibus verò propter internū inflammatio-
nis feruorem dolor accidit, hos febris haud
ignaua vexat, vrinae quoq; simul & stercoris
retentio accidit, pulsus hos etiam iuxta ven-
trem exercet, sitis, ardor, nausea, & vomitio-
nes potissimum bilis, quæ nihil leuant malū.
Hæcque omnium grauissima est, quæ in ileū
transitiōe minatur. Quibus acres rodētēsq;
succī dolorē mouent, sicut etiam qui inflam-
mationem experiuntur. hos ardor, sitis & vi-
gilia torquet, immò & febriculæ, sed minus
quàm illos. Vrina redditur acris, & biliosa
deiciuntur. Sæpius autem alui deiectio ma-
iorem excitat cruciatum, graniusque irritat
calidiores cibi potūsque assumpti. Quo verò
pacto coli & renum affectus discernēdi sint,
docet Galenus lib. 6. de Aff. loc. cap. 2. Vi^{et}
& curādi ratio iuxta causarum diuersitatem
variatur. Quum itaq; crassi ac lenti humores
doloris causa existunt, victus ratio in vniuer-
sum extenuans sit. Panis itaque quo vescitur
coli à crassis & æger, recens ac in clibano aut furno probè
pituitosis sit coctus. Ex carnibus conueniunt in primis
humori- volucrum, gallinæ nimirum, perdicum, pa-
bus. Vi- lumborum, turturum, & columbarū. Fugien-
t^{et} ratio da omnia volucrum genera, quæ in aquis de-
extenuās gunt. Ex quadrupedum animantium genere
cōueniunt carnes vitulinæ & hœdine. Legu-
mina omnia vitanda, quòd huic passioni in-
commoda sint. Inter olera conueniunt apiū,

Curatio
doloris
coli à
crassis &
pituitosis
humori-
bus. Vi-
et^{et} ratio
extenuās

asparagus, & similia: allia quoque cruda, & cepas deuorare, haud nocebit. Et vt summam dicam, a limēta sint boni succi, & concoctu facilia, satietasq; ac cruditas vitetur. Bibendum vinum subadstringens, albū, tenue, pellucidum, mediocri aetate, temperatura dilutiore. bibaturque modicè. Quod verò ad curandi rationem attinet, si crassi & glutinosi humores dolores contraxerint, medēdum quidem sic vt non vehemēter calefaciamus, quippe ab huiusmodi præsidiis diffunduntur & inflantur omnes frigidi ac crassi humores, qui intestina distendendo augēt dolores. Cōuenit itaq; ipsos diffecare & concoquere citra vehementem calorem, & per eorum quæ minimè inflant, vsum. In exacerbationibus igitur irrigationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, & anethino. Item fomenta, & sacculi ex florib⁹ chamæmeli, anethi, melilori, feminibus lini, fœnigræci, althææ, & milio. Mirificè autem conferunt clysteres ex oleis iam commemoratis, & decoctio prædictarū herbarū, aut cucumis syluestris radicū, adiectis cumino, vel ruta cū adipe anserino vel gallinæ, confecti ad eum modum. R^x maluæ, althææ, chamæmeli, mercurialis, anethi añ m. i. origanī, calaminthæ, pulegii añ p. i. seminū lini, fœnigræci, cumini, smyrnii añ 3 iiii. coquantur singula in aqua fontana, donec tertia pars absumatur. R^x colaturæ lb i. hieræ pi-

Curatio.

Anodyna.

Clyster.

creꝝ s. benedictæ laxatiue; v. eclegmatis in-
 di 3 i s. mellis rosacei colati ꝥ s. olcorum cha-
 mæmelini, anethini, rutacei, añ ꝥ i. vitellos
 oui numero ii. salis communis 3 i s. misce, fiat
 enæma. Gladium etiam ad motiones, illitio-
 nesq; sedis, ex succo cyclamini cum melle &
 nitro, vel centaurio minore cum melle & ni-
 tro. Glandes autem sic componi debent. Rꝥ
 mellis cocti ꝥ i s. specierum hieræ picræ 3 i.
 colocyntidos ꝥ i. salis gemmæ ꝥ s. misce, fiat
 Vomit^o. glandes oblongæ. vomitus etiã ante cœnam
 si quis facile vomat, præ omnibus auxiliatur.
 Porro vbi facta iã euacuatione dolores pro-
 ducuntur in multas horas, in soliũ olei calidi,
 aut si hoc fieri non potest, in hydrelæum de-
 scendere alienum non est. Inseffus etiã utilis
 ex decocto althææ, pulegii, foliorum lauri,
 fœnigræci, chamæmeli, artemisiæ, anethi, &
 Vinũ ab similiũ. Conuenientissimum verò ad coli-
 sinthites. cos medicamentum, vinum absinthites exi-
 stit, si prælibatiõe à balneo opus habet. Estq;
 etiam nõ sitientibus valde commodum. De-
 coctum quoq; herbe ipsius, vbi semel tatum
 ebullierit, pari modo ad vinũ quod aliàs pro
 consuetudine bibunt, admixtũ, vtiliter à bal-
 neo præbetur. Castoreum etiam assidue po-
 Casto- ratum, totius affectionis malũ demolitur, o-
 reum. mnibusq; medicamentis præstat. Datur eis dra-
 chma vna in trib^o cyathis aque mulsæ. Quod
 si dolor non conquieuerit, propinadum erit

medicamentum diatriôn pipereôn, vel the-
 riaca. Quòd si verò dolor est vehemens, me-
 diocriter lenientibus ac mitigantibus vti cõ-
 uenit medicamētis ab inferioribus partibus
 inditis, aut potis. Nam quæ valenter stupefa-
 ciunt vitare oportet, quod paulisper quidem Stupefa-
 leniant, sed diuturniorem affectum efficiāt. ciētia vi-
 dum materiam incrassant, meatûsque intesti-
 ni condensant. Anodynis itaq; propriè voca-
 tis medicamentis, quorum aliqua initio capi-
 tis dicta sunt, iterũ vtendum. Quæ autē à to-
 ta substantia colicis auxiliantur, multa sunt. Quæ à to-
 ta substā-
 Lupi autē stercus, maximè album, ex aqua tia conse-
 aut vino albo tenui summè conuenit. Melius runt coli-
 autem stercus censetur, quod non in terrā de-
 lapsum reperitur, verum in fruticem aut her-
 bam excretum. Mirum etiam in modum co-
 licos iuuat, amuleti instar iliis ægroti alliga-
 tum idem lupi stercus. Reliqua apud Aëtiũ
 lib. 9. cap. 31. descripta habes. Porro si flatulē Coli do-
 tus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui loris à
 flatus discutiūt infundendi, qualis est qui R flatulen-
 abrotani, origani, pulgii, calaminthæ, cha-
 mæmeli añ m i. rutæ, mēte, parietarię añ m s. tibus cu-
 seminũ anisi, fœniculi, carei, cumini, anethi, ratio.
 smyrnii, dauci añ 3 ii. Decoquātur, donec ter Clyster.
 tia pars absũpta fuerit. R colaturę tb i hieræ
 picræ, benedictæ laxatiuæ añ ʒ s. castorei 3 i.
 specierũ diacumini 3 ii. oleorũ rutacei, ane-
 thini añ ʒ i s. salis cõmunis 3 i. misce, fiat enę-
 n ii

ma. Potest etiam prædictis addi eclegma de
baccis lauri, quo ad discutiendos flatuosos
spiritus nihil est efficacius. Proderit etiã eius
eclegmatis quãtitatẽ nucis auellane, in deco
cto aliquorũ incidetiũ medicamentorũ indies
propinare. Extrinsecus autẽ abdomẽ iis quæ
flatu dissipant, fouendũ ac irrigandum erit.

Flatº dis- Sunt autem præter ea quę dicta sunt, nigella,
sipantia. ammi, oreoselinum, amygdalæ amarę, piper
nigrum, mentastrum, bacce lauri, absinthiũ
semen vrticæ, acorus, maiorana, & cinamo
mũ. Ex iis itaque cataplasmata, fomenta, aut
sacculos cõficies. Quod verò reliqua omnia
vincit, & incantamẽti cuiusdam simile quid
efficit, Galenø lib. 12. Ther. meth. cap. vltimo
teste, est cucurbita maxima leuis cũ copiosa
flamma toti abdomini affixa. Aeger etiam
à diluti vini, & frigidæ aquæ potu, lactis &
aliorum refrigerantium, ac flatuosos spiri
tus gignentium alimẽtorum vsu, sibi caueat.
At vini potius meracioris potu, victusque ra
tione reliqua calefaciente ac incidente vta
tur. Prætercà inflammatione intestinum ex
ercente, vena in cubito aperienda est. Si verò
vrinę difficultas superet ac dominetur, ex ma
leolo sanguis detrahendus erit. Prædictis e
tiam vtendum remediis, exceptis acribus, &
vehemẽter purgantibus. Enæmatis verò po
tius lenientibus, item cataplasmatibus, & irri
gationibus, & in oleum descensu vtendum.

Cucurbi ta ma
gna.

Victus.

Coli do-loris ab
inflāma
tione cu
ratio.

cucurbitulas etiā iis affigimus. **Viētus autē Viētus.**
 ratio tenuis sit, & ferē febricitatiū, donec in- **Coli do-**
 flammatio soluatur. Atqui si propter acres loris ab
 rodentēque humores dolitant egri, per sedē acribus
 infundere conuenit ea quę humores eluere, & roden
 atque citra mordacitatem purgare possunt: tibus hu
 cuiusmodi est ptisanæ succus, aut decoctum moribus
 fœnigręci, seminis lini, chamęmeli, & althęę curatio.
 cum adipe recenti anseris vel gallinę, & rosa
 ceo oleo. Conuenit autem hoc potissimum **Enęma**
 enęma, quod R̄ foliorum violę, intybi do-
 mestici vtriusque, foliorum althęę, chamę
 meli añ m i s. seminum fœnigręci, lini añ ʒ s.
 Bulliāt in aqua sufficienti, donec tertia pars
 absumpta fuerit. R̄ colaturę ʒ xiii. casię fistu
 laris ʒ i. hierę picrę ʒ vi. olei rosacei ʒ ii. olei
 anethini ʒ i. pinguedinum anseris, gallinę añ
 ʒ iii. vitellos oui numero ii. misce, fiat enę-
 ma. Nō autē solūm vacuare, verū etiam tem-
 perare infestantem humorem oportet. Qua-
 propter balneis ex dulci aqua vtendum: ea **Balnēa.**
 enim mitigare, & somnū conciliare possunt.
 Exhibēdus etiā syrupus violaceus & rosa-
 ceus, & alia eiusmodi, quę contemperare, ac
 vim mordacium humorum obtundere va-
 lent. Vtendum etiā cibo sorbili, ptisana ni. **Viētus.**
 mirum, ac piscibus saxatilibus. Abstīnēdum
 acribus omnibus tum cibis, tum medicamen-
 tis, fomētis, irrigationibus, cataplasmatibus ca-
 lentibus, necnon vini potione, potissimū ve-
 n iii

teris. Et ut rem paucis perstringam, tota vi-
 Stupefa- ctus ratio humidior & frigidior sit. Quum
 cientia. autem dolor nihil remiserit, sed vehemētius
 subinde sæuierit, ad stupefacientium vsum
 confugere oportet. In hac enim passione, nō
 solum quod sensum stupefaciunt, sed & quia
 humores tennes in crassam, caloremque refri-
 gerant, opitulantur. Inter ea verò potissimū
 philonium conuenit, de quo vsque ad inte-
 gram drachmam exhibere licebit. Et catapo-
 tia de cynoglossō inscripta, ex vna drachma,
 ut antea quoque dictum est, sex conficiendo
 pilulas, vnāque ante cubitum exhibendo,
 mirificè conferunt.

DE ILEO.

CAP. XIII.

ἰλεος.

Ilcos, passio est intestinorum tenuiū, gra-
 uissimos & letales dolores inferens. Sic dicta
 à circumactione doloris. ἰλεῶς δὲ siquidem
 Græcis est circumuolui, & circumagi. Hinc
 Conuul- est quod Latinis cōuoluulus & voluulus di-
 uulus & catur. Barbaram sectantes medicinam, Iliacā
 voluulus. nominant. Contrahitur id vitii continua cī-
 Causæ. borum corruptione & cruditate, maximè au-
 tem à pinguibus carnibus. oboritur etiam ex
 plagis ac ictibus quibusdam, iis locis vbi te-
 nuia intestina sita sunt, factis. ex frigore vehe-
 menti constringente, ac recremēta retinentia.
 Cōtingit & iis, quibus intestinum in scrotū
 vnā cum stercore delapsū est, indeq; violē-
 ter retrusū, ex cōque inflammatum existit.

Fit etiam ob veneni potionem, & ob induratum stercus, circa tenuia intestina impactum. Familiaris est hæc passio pueris, euadunt tamē beneficio naturalis humiditatis. Senibus verò nō valde familiaris est: si tamē ipsi hanc passionem incidant, ferē nunquam conualescunt. Accedit agris dolor vehemētissimus, **Signa.** & tumor aliquis in tenuium intestinorū parte eminet, vt videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum: vnde etiam **Corda-** dapson nonnulli hanc passionem appellauit **plos.** Adest etiam stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil alleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercoris & flatuum. Si verò intendatur adfectus, omnia sursum ferūtur, obidque vomitus pituitę ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq;, plurimis etiā spirandi difficultas. Morituris autem amplius sudor frigidus, vrinq; difficultas, podex ita adstrictus vt neque specilli extremum suscipere possit. Aliquando & stercus vomitu reiicitur. Siqui **Curatio.** dem igitur à cruditatibus, ac multis variisq; **Ilei à cruditatibus** cibis ingestis fit malū, potissimū vbi crudus cibus adhuc insidere ventri videatur, vomit^o cōcitandus erit. Si verò nihil crudorū ciborū in ventre cōtineatur, omni conatu enitēdum est, quò tū flatus, tum stercora infrā trahātur: idq; per clysteres, glandes, & illitiones, magna diligētia in singulis adhibita perficiēdū.

- Enema.** Fiat itaque tale enema, quod R^x mercurialis, rutæ, foliorum althææ, centaurii minoris añ m i. hyssopi, calaminthæ, absinthii añ m i s. radicis althææ § i. radicis cucumeris syluestris 3 i s. seminum lini, scœnigræci añ 3 iii. seminis cumini 3 ii. Bulliant in aqua sufficiēti, donec tertia eius pars absumpta fuerit. R^x colaturæ § xiiii. benedictæ laxatiuæ § i. butyri recētis, mellis rosacei colati añ § s. oleorum rutacei, anethini añ § i s. salis 3 i. misce, fiat clyster. In fundendus est ante cibum: vrgente verò malo, etiam à cibo. Præcipiendūque vt quamdiu quidem queant ægrotantes retineāt. Glādes quemadmodum in coli doloribus parandę, adiectis semine rutæ, cumino, & brassicæ caulibus. Lōgiusculas etiam facere oportet, vt profundius penetrare possint. Cyclamini succo, aut melle cum nitro podex illinendus. Hoc denique malum cataplasmatibus, & fomentis, sicut in cap. de colicis comprehensum est, curare oportet. Conueniunt aut potissimū fomenta ex lanis oleo, in quo cuminum, anethum, ruta, & nasturtium decocta sint, madefactis. Cataplasmata autem ex semine lini, scœnogræco, farina hordeacea, loliacea, ruta, cumino, anethi semine & apii. In soliū etiam aqua & oleo confertum descendere cōuenit. In aqua verò althæa, ruta, anethū, & alia quæ dicta sunt decoquātur. Post hæc cucurbitę affigātur, primū quidem ad remotos locos, le-
- Glans.**
- Fomenta**
- Cucurbitæ.**

ues, deinde ad ipsos etiā dolore affectos: scarificationesque profundiores fiant. Purgatio Purgatio
 nes etiam assumere conuenit, potissimū ubi nes.
 primū per ea quę dicta sunt, stercora primū
 ad inferiora tracta fuerint. Mirificē ipsis con-
 ducit, si vomuerint, anethū coctum potumq;
 A potu autē panem in aquam feruentem cō-
 iice, cuiusque frustra calida confestim edenda
 prebe. Si verò à venenoso medicamēto quis Ileī à ve-
 in ileon incidat, aquam tepidam multam bi- nenoso
 bendam dabimus, vomerēq; cogemus. Dein medica-
 de oleum calidum in potu dandum, aut pin mēto cu-
 guia iura, vt rursus vomāt. Postea ita parū, ratio.
 perquiescāt, & deinde statim theriacen cum
 vino dissolutā accipiant. Cibi eis exhibean-
 tur boni succi. Quod si obstructio perseuera-
 uerit, aluus lacte scisso, cum modica aloē, aut
 alio medicamēto purgante vacuanda erit. Si Ileī ab i-
 ab inflammatione ileos orta fuerit, à venę se flamma-
 ctione auspicandū erit, deinde cucurbita in- tione cu-
 flammatis partibus per ambitum scarificatis rato.
 affigenda, & enarmata ex decocto malug, fœ-
 nigreci, seminis lini, cum oleo & butyro im-
 mittenda. Extrinsicis etiam ea quę inflāma-
 tionibus cōducunt, & dolorem leniunt, vt in
 capite etiam de coli dolore dictum est, ap- Ileī ex
 ponenda. Et in inedia ad tertium vsq; diem delapsu
 seruādi. Si ex intestini in scrotū de lapsu ileos intestini
 accidat, confestim tētandum est, vt decubitu in scrotū
 sursum versus vergente adornato, delapsus curatio.

intestinum ad inguinum partes retrudatur,
atque leniter citra violentiam ac compressio-
nem, ligatura fasciæve adhibita contineatur.

DE LUMBRICIS. CAP. XIII.

ἑλμινθες.

Peretes.

Lati.

κεῖρια.
ταμνία.

ἀσκήδεις

Lumbricorum (Helminthes Græci vocāt)
tres sunt vniuersæ differentiæ. prima teretum
seu rotundorū, altera latorum, tertia eorum
quos ascaridas nūcupāt. ἑλμινθες στρογγύλαι,
hoc est, teretes lūbrici speciē habēt omnibus
perspicuam: nempe secundū crassitudinē ro-
tundi sunt, longitudine verò palmares, & ali-
quando longiores, & aliis frequentiores sunt.
In gracilibus plerunque intestinis cōsistunt,
& superiorem ventriculum subeunt, idēque
frequēter per os reiiciuntur: quibusdam & ē
narib. redduntur. Atq; hoc genus infantibus
& pueris atque his qui ad pubertatem acce-
dūt peculiare est. Lumbrici lati à Græcis me-
dicis κεῖρια, hoc est instite, à similitudine quā
ad institas habent. quia ratione etiam Tæniæ
ab iisdem vocantur, quod instar fasciarū sint
lati & longi. Incredibilis enim longitudinis
sunt tæniæ, vt Plinio autore lib. 11. cap. 33. tri-
centum pedum aliquando visæ sint, aliquādo
etiam plurium. Nihil autem est latus lumbrī-
cus, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambi-
entis intestina mēbranæ, in corpus quoddam
viniū, & animalis modo mobile. Ascarides
tenuēs ac breues, vermibúsque similes lumbrī-
ci sunt. In extremo longanone, & ani sībula

(sphincterem nominant) initio reperiuntur,
Origo omnium generū est ex cruda, crassa. *Causæ:*

pituitosāque materia, & putredini accōmo-
da, qualis in pueris aliisque voracibus colligi-
gitur. Sequitur eos qui rotundos lumbricos *Signa ro-*
continēt, incredibilis morsus intestinorū & *tundorū*
ventriculi, tussiculęq; tenues ac exigue, & fre-
quenter irritantes, quum tamen nihil reiicia-
tur. Nōnullos comitatur singultus, & somn^o
cum tremore: & qui his occupātur sine ratio-
ne expergiscuntur, nonnulli & cum clamore
exurgunt & profiliunt, & iterum sopiuntur.
Quidā verò & linguam foras protrudunt ac
exerunt, oculōsque claudūt, taciturniq; sunt,
excitantibus indignātur, ob imbecillitatem
vigilare nequeunt. Quidam autem oculos
sanguine suffusos habent, & pulsum inēqua-
lem, obscurum, deficientem, & recurrentem.
Quibusdam etiam appetitus perditio acce-
dit. Pueris insuper dum dormiunt manduca-
tio linguę, cui accedit conformatio oris in
modum lactētium, aut accipientium cibum.
Plerisq; verò aluus deiicit, corruptos egerēs
cibos, & tympani modo inflatur. Reliquum
corpus sine ratione contabescit, neque esurie
prēcedēte, neque euacuatione immodica fa-
cta. Atqui nō in omnibus omnia quę iā com-
memorauimus signa sunt singulatim inqui-
renda, sed quę reliquis prępollent, & prin-
cipatum tenent; aliquando verò & plurima.

- Signa la-** **Latus lumbricus** continuos stomachi mor-
torum. sus infert, & ad cibos impotentem ac incorri-
gibilem appetitum. Nam quod animatū eua-
sit intestinis obiectum rapit alimentū, vt alio-
statim opus sit: & nisi assūperit, intestina ro-
dantur. Cōsequitur sic patietes, corporis gra-
cilitas & imbecillitas, assiduūque famis sen-
sus. Infallibile aut ac certissimum iudicium,
si cum recrementis quedam cucurbitæ semini
Signa as- similia excernantur. Ascarides vehemētem
caridum. pruritum in ano excitant, assidueque ad ege-
rendum irritāt: & qui hoc malo afficiuntur,
vt plurimum ab excretionis melius habent.
- Viētus.** Viētus ratio calida & sicca sit, potissimum si
febre egrotantes vacauerint, cibisque vtantur
probi succi, & qui facile in membra digeran-
tur, nec lumbricorū effectricem causam ad-
augeant. ideoque omnia quæ pituitosos hu-
mores procreare possunt, fugienda. liberalius
nutriantur, famēque minime ferant: quod
lumbrici nisi cibū habeant quem cōsumant,
postea ipsa solida corpora arrodāt. Dabitur
autem cibus tum præcipue, quum non pror-
sus inaniti fuerint. vinum bibant aquosum.
- Curatio.** Ceterū curandi ratio non differēda: quod
multi nulla lumbricorū ratione habita, cor-
rosi ab iisdem, & cōuulsi interierint. Curatio
verò tam rotundorum quàm latorum in hoc
Simpli- cōsistit, vt hos prius occisos, expellamus. Oc-
cia me- ciduntur autem amaris potissimum medica-

mētis, inter quę simpliciora hæc sunt: Absinthium, abrotanum, calamintha, marubium, dictamus, hyssopus, ruta, folia persicorū, coriandri semen, cornu ceruinum lupini, mēta, pulegium, origanum, centauriū minus, filix, gentiana, aristolochia rotūda, esus alliorum, brassicæ semen, & helenii radix. Inter omnia autem laudatissimū remediū est aloë. Quia verò infātes aloēn grauiter propter suā amari- tudinem admittūt, supinis fasciola ipsis de- tentis ore adaperto ac diducto per fistulam quādā valido munitam canali, inuitis illam iniiciemus. Ex dictis itaq; medicamētis sim- plicibus, varia componi medicamenta pos- sunt, nimirum decocta, pulueres, cataplasma- ta, emplastra, & vnguenta. Cōuenit autem is puluis, præter alia, qui R̄ seminis lūbricorū 3 ii. centaurii minoris, absinthii, cornu cerui ni vsti añ 3 i. calaminthæ, pulegii, origani añ 3 s. abrotani, mentæ, lupinorū, foliorū aristo- lochiæ rot. añ 3 i. aloës 3 ii. misce, fiat puluis, de quo detur drachma vna, aut semis, pro æ- tatis & habitus corporis ratione in lacte, aut melle, aut syrupo de dulci radice. Nā debent ea quæ lumbricos enecāt, cū dulcibus liquo- ribus propinari, quò citius medicamēta dul- cedine illa allecti lumbrici amplectātur. Ex- trinsicus vmbilicus felle taurino, aut hoc vn- guento illinēdus, quod R̄ olei amygdalarū amararum, olei de absinthio, añ 3 i. fellis tau- rum.

Compo-
sita.

Puluis.

Vnguentum.

Ceratū.

Lūbrici
enecati
vt expel-
lendi.Si alui
profluui
um acce-
dat.

xini ꝯ s. cētaurii minoris, absinthii lupinorū,
 añ ꝯ ii. foliorū persicorū, cornu ceruini vsti
 aloës, abrotani añ ꝯ i. ceræ quod satis est, fiat
 vnguētum. vel imponatur toti vētriculo hoc
 ceratum, quod R̄ aloës, absinthii, farinæ lu-
 pinorum añ ꝯ ii, nigellæ, mētæ, origani, pule-
 gii, marubii añ ꝯ i. cētaurii minoris, calamin-
 thæ añ ꝯ s. oleorum de absinthio, amygdala-
 rū amaranū añ ꝯ ii. olei costini ꝯ i. fellis tauri-
 ni ꝯ s. cum cera & resina q. s. fiat ceratum. Ad
 imaginem illorum possunt componi empla-
 stra & cataplasmata, ita vt peculiaria horum
 paradigmata ascribere minime sit necessa-
 riū. Ab inferiorib. etiā partibus mulsam iniici-
 cere copiosiorē expedit, quò lumbrici mellis
 dulcedine illecti, deorsum descendant. Cæte-
 rum enecatos iā per pharmaca prædicta lū-
 bricos, citra dilationē expellere oportet. Vi-
 tiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ
 & appetitum & cōcōctionem lædit. Extrahū-
 tur autem per glādulas suppositas, aut medi-
 camenta purgātia assumpta: potissimū verò
 per hieram picram, & pilulas cōmunes (quæ
 alio nomine pestilentialia vocantur) quæ sa-
 nē mirificè in educēdis lumbricis conferūt.

Porro qui lumbricis cum alui profluuiio
 infestantur, eos fluorem inspissando, & con-
 cōctionem tum per cibos, tum per catapla-
 smata in melius permutādo, curare oportet.
 in quātum enim profluuium inualefcit, tan-

tum etiam lūbrici interquiescūt. Quare diligenter conandum ut alius adstringatur, firmitasque ei adiciatur. His itaque plātaginis succus propinādus, vel ipsa etiā arida plātago assumēda. Ex equo enim viriq;, & fluori ani & lūbricis efficax est. Cataplasmata etiā, cerata & vnguenta ex cruda hordeacea farina, malicorio, acatia, hypocistide, & similibus adstringentib. Concinnanda, adiectis iis quæ ad lumbricos interficiendos sunt prædicta. Conferunt autem adstringentia, & hoc etiam nomine extrinsecus admota, quod ventericulum ex amatorum medicamentorum assumptione læsum iterum corroborent. Licebit & in hoc casu vermes terrenos exiccatos, & in pulverem redactos, cum hydromelite curatio. exhibere. Ascarides in infantibus vacuandi sunt cum glādis ex melle & sale cōfectis. In prouectiorib⁹, clysteribus ex decocto absinthii, centaurii minoris, calaminthæ, lupinorum, & aliorum suprà commemoratorū, oleis adiectis, compositis. Post clysteres longan simplicibus quidem acatia, hypocistide, rhois succo, aut alio adstringēte sublinēdus est. Coacta enim ab adstringētibus caro corroboratur, aptitudinēq; ad animalculorum generationē amittit, atq; ascaridas ipsas excludit. Hoc verò & pueris, & qui perfectæ sunt ætatis conducit, efficacissimūque existit. Carnē veterē salitam, pinguedine dera-

sa, sublongam & rotundā formabimus, atq;
ita adaptatam podici atq; sphincteri intru-
demus: ligamentoque adhibito, quandiu su-
stineri possint, inditam sinem^{us}, deinde solue-
mus, simulque ascarides illi adhærētes educe-
mus. Posthæc prædicta infundemus, atque il-
linemus.

DE HÆMORRHOIDIBVS SE-
DIS. CAP. XV.

ἁμωρ-
ροΐδες.

Hæmorrhoides venarū in sede sunt expli-
cationes dilationē sive, à sanguinis defluxu sic
appellatæ. Harū aliæ cæcæ, quæ scilicet intum-
escunt, & nihil aut parū admodū sanguinis

Apertæ.

excernunt. Aliæ apertæ, quæ videlicet certis
quibusdam temporibus pāduntur, & sangui-
nem emittunt. Fiūt autem hæmorrhoides,

Causa.

propter copiam sanguinis fœculēti & mela-
cholicī, quem iecur ad ipsas reponit. Signa

Signa.

verò per quæ affectus deprehēditur, satis ma-
nifesta sunt. Oculis enim cōspiciuntur cæcæ,
& dolorem vehementem, potissimum in ex-
cernendo stercore, excitat. Apertæ sanguinē

Curatio
cæcarum

Quum itaq; cæcæ apparuerint hæmorrhoi-
des, & magnos in ano cruciatus excitauerūt,
corpūsque plethoricum fuerit, vena poplitis
aut malleoli incidenda erit. Alius etiam affa-
tim leniter subducentibus medicamētis mol-
lienda, ne arida stercora dū excernuntur, do-
lorē faciant. Apponēda quoque ea sunt, quæ

dolorem, vbi vehemens fuerit, mitigare possunt. Ex quorum numero est mica panis in la-
 & macerata, & cū ouivittello decocta, & in-
 star emplastri admota. Prodest etiā balneum
 ex decocto maluæ, foliis violæ, meliloti, fœ-
 nigreci, chamemeli, foliis althææ, semine li-
 ni, florib⁹ verbasci, & similibus apparatū. vel
 si eo vti non poterit, lanæ aut spongiæ in de-
 cocto illo madefactæ, dolenti loco adhibean-
 tur. Quod si prædicta nihil contulerint, san-
 guinē ab iis elicere oportet. Quapropter cy-
 clamini succum, aut cepæ, aut fel bubulum
 lana illitum intra anum imponere oportet. Hemor-
 Idem etiam potest centaurii minoris succus, rhyoides
 stercus columbinum, staphysagria, folium fi-
 cus, si cum eo fricentur, & medulla colocyn-
 thidis in oleo amygdalarum amararum ma-
 cerata. Potissimum verò hoc emplastrū con-
 fert, quod R̄ stercoreis columbini ꝑ s. seminis
 staphysagriæ, lupinorū añ 3 i s. amygdalarū
 amararū 3 i. medullæ colocynthidos 3 s. suc-
 ci cyclamini, cepæ añ ꝑ i. misceantur singula,
 & ad formam emplastri reducantur, adiecto
 si opus erit, oleo amygdalarū amararū. Glan-
 des etiam oblongæ ex radice cyclamini pa-
 ratæ, in anum indi possunt. Hirudines etiam
 in harundine inclusæ, ita vt caput exerāt, hæ-
 morrhoidibus vt adaperiātur, imponi solēt.
 Has vbi amouere nō poteris, cinere illarum
 capiti insperso decidere sua sponte facies.

Aperta-
rum cura
tio.

6. Epid.
par. 3.
ap. 29.

Ceterū si apertæ fuerint, & sanguinē modicē per certa intervalla fuderint, minimē suppressæ sunt: quod huiusmodi sanguinis eruptio hac passione detētos homines à multis malis immunes reddat. Id quod in primis testatur Hippocrates, qui sic scriptū reliquit: Habētes Hæmorrhoidas, neque laterū dolore, neque pulmonis inflammatione, neq; depascenti ulcere, neque furunculis, neque terminthis, pariter neque lepra, neque vitiliginibus corripuntur. Quod si verò immodicē ac iustō largiūs sanguinem fundāt, sic quod egri hoc malo cōtabescant, ac illorum robur deticiatur, suppressæ erunt: quod aliàs periculum sit, ne aqua intercus, iocinore ob immodicā euacuationem refrigerato, sequatur.

Vitus.

Cibi itaque erūt iis qui supra modū inanuntur pauci sanguinis, efficaces, & minimē recrementitii, quique siccant & adstringūt: cuiusmodi est alica & oryza. Ex oleribus intybus, cichoriū, portulaca, & similia. Cibus rhuobsoniorū, aut succus immaturarū vuarum admisceatur. Si vires plurimū prosternantur, carniū expresse, cui succus cotoneorū admixtus sit, alēdus æger erit. vina bibat astringentia. Ceterū si plenitudo corporis affuerit, venæ interioris in cubito dextræ manus sectio pderit. Sin minus, auersioni per cucurbitulas hypochondriis & iccori affixas studendum. In quem vsū manibus & brachiis

Curatio.

etiā vincula iniicere, & frictiones aperas adhibere cōuenit. Præterea intra corpus assumēda sunt ea quæ adstringūt, vt sunt syrupi rosaceus, myrthinus, cotoneorū, coralli rubei, bolus armenia, pastilli de succino, de ebore (quos de spodio hodie nomināt) de terra lēnia, & alia quæ in capite de cruēto sputo cōmemorata sunt. Extrinsecūs ea etiā apponēda, quæ sanguinem promauātem sistere possunt. Ex quorum sanè numero, Aëtio lib. 14. cap. 5. teste, aloë est, cū posca applicata. Idem etiā potest squama ferri, aut plumbū vstum. Vnicè autem confert medicamentum, quod describit li. 5. Ther. meth. Galenus. Id accipit thuris partem vnā, aloës partis vnius semisim. Hæc cum oui candido, donec ad mellis crassitudinē redeant, subiguntur, & mollissimo leporis pilo excepta vasis imponuntur, fascia ex tenui linceo forinsecūs alligata. Proderunt etiā vnguēta, balnea, infusiones, fomenta, & alia eiusmodi ex medicamētis adstringentibus: quorum multa in cap. de Diarrhœa, Lienteria, Dysenteria & Tenesmo dicta sunt, cōposita. Sacculos tamen in vino rubeo & adstringente priusquam adhibeātur, bullire, aut saltem eo irrigare cōuenit. Quapropter si qua hic desiderabis medicamēta, ea ex capitib. superiorib⁹, in quib. de sanguinis suppressione agitur, petes. Superuacaneū enim sæpius iisdem de reb. verba facere.

DE PROCIDENTIA ANI. C. XVI.

- Causa.** Accidit vt interdum propter resolutionem aut imbecillitatem musculorū obliquorum sedem sursum reuellentū, anus procidat, atque adeò à duobus quidem relatis musculis non queat retrahi, sed manib. aut medicamētis auxiliatricibus egeat.
- Curatio.** Quod cū factum fuerit, cōsiderandum in primis, num anus ab inflammatione liber sit. tum enim statim impulsus, in pristinum locum protrudi ac reponi debet. vt autē intrusus ne iterum egrediat, retineri queat, adstringentia extrinsecus apponenda sunt. Primū itaq; oleo rosaceo calente circumlinendus, aut vino adstringēte detergendus anus: ac deinde in suum locū repositus, deligādus erit. Idque faciendū statim vbi eger excreuit, ne cōfestim ad egerendum necessitas ipsum vrgeat, atque adeò iterum anus procidat. Linimentum ex acatia & hypocistide cū vino adhibendū. Incoquantur etiā in aqua donec rubescat, galla, ballastia, glandularum calices, malicorium, bellis minor (primulam veris nominant) rhu obso-
niorum, cortices cotoneorum, & similia: & deinde ex huiuscemodi decocto infusus & lotiones parentur. Possunt etiam postquā vino aut decocto adstringēti sedes abluta fuerit, arida admoueri ac inspergi medicamēta. In quem vsu confert bolus armenia, thus, sanguis draconis, galla acatia, myrrha, hypo

cistis, cornu ceruinum vstum, & similia, quæ ex superioribus sunt petēda. Porro si anus ob inflammationem tumidus imponi nequeat, vbi plenitudo fuerit, vena primū secāda erit, vomitūque ciendus. Sedi appōenda etiam quæ adstringunt & reprimunt: idque statim inter initia faciēdum. Quod si verò plenitudo nulla adsit, eger in sessione vtatur ex decocto chamemeli, maluæ, althææ, seminibus lini, scœnigræci, & similib⁹ parata. aut in aquā calidam conscendat, & ei ad tempus immoretur. Spongia etiam aut lana in decocto prædicto madefacta admoueat. Anus denique oleo chamemelino, aut anethino, quousque reponi possit, il linēdus. Postquā verò recōditus iam est, tum suprà commemoratis medicamentis adstringentibus, vtendum erit.

DE RIMIS ANI. CAP. XVII.

Rimæ sedis, quas Græci Rhagades vocāt, *ῥαγάδες* sunt scissuræ quæ in musculo anum claudente, quem sphincterem nominant, aut in circulo & extrema ani corona fiūt, similes iis quæ in labiis ob Borææ flatum a superiorē accidunt. ob acrium humorum defluxum, aut inflammationem, aut condylomatū (quæ nihil aliud sunt nisi eminentiæ seu rugæ quædā, re-duplicatis ani corpusculis præter naturā insurgentes) extensionē eueniunt. Si ab acris humorib. fiunt, ii primum omniū purgandi erunt. Si ob cōdylomata, itidem purgatione

Causæ.
Condylomata.

Curatio.

Vnguentum.

inter initia vtédum. Alius denique toto curationis tempore mollienda, cibis humectantibus ac pinguibus, ne aridum stercus cōglutinationem remoretur. Ex eorum sanè numero sunt maluæ, spinachia, lac amygdalarum dulciū, oua forbilia, iura pingua, & iis similia. Rhagadib. verò hoc vnguentū adhibendū, quod R̄ olei rosacei, myrrhini añ § i. thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis añ ð i aloës, plumbi vsti, cerussę, balaustiorū, boli armenię añ ð s. ceræ albæ quod satis est, fiat vnguētum. Aut tale, quod accipit olei rosacei § i s. gallæ, myrrhæ, terrę lemnię añ ð i. radicis symphyti, aluminis scissilis, plumbi vsti añ ð s. oui assati vitellum, ceræ quod satis est, fiat vnguentum. Prædictis vnguētis ter die rimas circunungito, lotas prius decocto rosarum, gallarum & sidiorum: sic vocāt putamina malorum punicorum. Si patiētē partem ardor & inflammatio affligit, vnguento candido caphurato illinenda erit.

DE IMBECILLITATE IO-
CINORIS. CAP. XVIII.

Causę.

Imbecillitas iocinoris ab intemperie ipsa producitur calida, frigida, humida, vel sicca. Calida intēperies, tum eos qui prius adsunt humores, tū etiam hos qui per venas mesenterii ad ipsum iecur deferūtur, adassat & cōburit. Frigida verò intemperies, pituitosum & crudum humorem, qui iam in ipso conti-

netur, crassum & lentum egréque mobilé red-
dit: cum verò qui ad ipsum defertur, semico-
ctum. Cæterùm sicca intēperies, ficciores &
densiores humores facit. Humida autem te-
nuiores & magis aquosos. Calida igitur iu-
temperie circa iccur existente, colliquatiōes
sūt, primū quidem humorum, deinde car-
nis etiā ipsius iocinoris, & euacuatur per ven-
trem bilis foetens ac crassa, abundēque colo-
rata. Sitis denique infestat, appetentia deiici-
tur, vrina rufa, pulsus celer est. Vbi verò frigi-
da intemperies affuerit, neque assidue excre-
tiones, neque multæ fiunt. Durat verò passio
diutius, & per certos aliquot dies profluit
ipsis vëter maiori copia. cæterùm egesta nō
similem foetorem habēt iis quæ per calorem
sunt colliquata, neque colorem etiā, neque
consistentiam, sed speciem præ se ferunt san-
guinis putrefacti, & in grumos congelati &
si quis diligēter consideret, neque sanguis ni-
ger est, neq; grumus, sed veluti limus & fex
quædam sanguinis crassi, proximè ad atram
bilem accedēs. Quin plures & discreti iudi-
catūve difficiles colores circa huiusmodi pas-
sionē in excrementis apparēt. Reliqua etiā
omnia priorib. contraria erūt. In ficciorē au-
tem intemperie, excrementa adhuc ficciora
& pauciora videntur, egrīque magis sitiunt:
In humida verò, humidiora & plura erūt ex-
crementa, sitisq; minus infestabit. In huiusmo-

Signa.

Curatio:

o. iiii

di igitur passionib. primus curationis scopus
 fit, vt intemperiem ad contrariū reducamus.
 Calidam enim intemperiem semper refrige-
 rare oportet, frigidam verò calefacere, simili-
 tēque humidam resiccare, & siccā humecta-
 re. Ceterū omnibus iecorariis medicamen-
 tis, tum quę per os sumuntur, tum quę forin-
 secus imponuntur, aliquid ex adstringentib.
 ammiscere oportet, quò firmitas ac robur vi-
 sceris conseruetur. In calida igitur intēperie
 quod ad victus rationem attinet, vtendū erit
 ptisanę cremore, & aliis cibis mediocriter re-
 frigerantibus, lactucis, intybis, cichorio, fon-
 chis, pane ex aqua. Pullis itē gallinarū, per-
 dicibus, auibus mōtanis, carnib. vitulinis, cū
 omphacio aut limonibus decoctis. Ex fructi-
 bus vescātur passulis, limonibus, & amygda-
 lis dulcibus. Vinū omnino circūciditur, nisi
 alteram ob causam, nempē ventriculi imbe-
 cillitatem, hoc requirant. tum enim tenue &
 dilutum aliquod exhibendum. Bibāt autem
 pro vino succum malorum punicorum, & sy-
 rupum acidū, simplicem, oxysaccharūq;,
 cū decocto hordei, aut intybi domestici. Ar-
 cēdi autem in summa ab omni cibo & potu
 melle condito, & admodum calido ac inci-
 dente. Per os denique, quod ad medicamen-
 torum rationem attinet, sumant saccharum
 rosaceum, diarhodōn abbatis, & diatriasani-
 tali confectioes. Aut confectioem hanc

que R̄ specierū diarhodōn abbatis, diatria-
 fantali añ 3 i s. seminum intybi domestici v-
 triusque, rosarum rubearum añ 3 ii. santalo-
 rum alborum, cassuthæ, floris iunci odorati
 añ 3 i. passularum 3 i. sacchari 6 vi. dissoluti
 in aquis cassuthæ & endiuia, fiat confectio
 rotūda. Quin & Philonis antidotus semel tā-
 tum exhibita, omnem aliquando calidā ie-
 coris intēperiem mirabiliter sanauit. Extrin-
 secus adhibeantur fomenta ex rosaceo, cha-
 memelino, cotoneo que oleis parata. Aut ab-
 sinthium, aut palmulę prædictis oleis inco-
 quantur, & in iis lana aut spōgia madefacta,
 ei loco, vbi iecur sitū est, imponatur. Potest Vnguen-
 etiam huius vnguenti esse vsus, quod R̄ oleo tum.
 rum rosacei, cotoneorum, nymphæ añ 6 i.
 santalorum alborum & rubeorum, rosarum
 rub. añ 3 i. ramentorum eboris 3 i s. seminis
 intybi domestici vtriusque añ 3 i. aceti 3 i s.
 caphuræ gr. ii. ceræ quod satis est, fiat vnguē-
 tum. Epithemata etiam in hoc affectu nō pa Epithe-
 rum conducunt, que in hunc aut similem mo ma-
 dum parabūtur. R̄ succi intybi domestici la-
 ti folii, lactuce, oxalidis, rosarum, nymphæ
 añ 6 iii. succi semperuiui 6 i s. aceti 6 i. rosarū
 rub. santalorum rub. ramentorum eboris añ
 3 i. specierum diarhodōn abbatis, diatria fan-
 tali añ 3 i s. caphurę 3 s. misce, fiat epithema. Frigidæ
 Adhibeantur autem epithemata estate frigi- intempe-
 da actu, hyeme verò calida. Vbi autem frigi- rici.

da in iecore intemperies fuerit, calefacientibus, ac robur addentibus vtendū est. vtantur itaq; cibis concoctu facilibus & calefacientibus. Ex olerib⁹, satureia, hyssopo, fœniculo, oreoselino, abrotano, salua, & similibus. Cibi cōdiantur aromatis calefacientibus, cinamomo, gariophyllis, & iis similibus. vinum bibāt tenue, fuluum, & odoriferum. Fugiant esum piscium, fructuum frigidorum, ocium, & quicquid refrigerare iecur potest. Per os fumant hoc decoctum, quod R^x radicū apii, fœniculi, oreoselini añ⁹ i eupatorii (quod a grimoniam hodie vocant) hyssopi, mēte, absinthii, cichorii, cassuthe, origani, calaminthæ, asari añ m i. seminū ani sī, fœniculi, dau-ci, cumini, carei añ 3 ii. iūci odorati 3 i s. mastiches 3 i. florū chamæmeli, rosarū rub. añ m i. cinamomi electi 3 i s. Bulliant omnia in lb i s. vini, & aquæ fontanæ lb i. donec tertia pars absumpta fuerit, dein colentur, & colaturæ adiciātur syrupi de eupatorio ℥ iii. syrupi de absinthio ℥ i. misce, fiat potio. In hūc vsum cōferunt etiā confectiones calefacientes, diacinaomomi nimirum, dianisi, conserua saluæ, acorum conditum, pimpinellæ radices cōditæ, & huiusmodi. Extrinsecus illinēda olea calida, nempe nardinū, chamæmelinum, absinthinū, & similia. Confert hoc vti Vnguentum. quod R^x oleotū absinthini, nardini añ⁹ i s. succi eupatorii 3 ii. cinamomi, ga-

riophyllorum, ligni aloës añ 3 ii. spice, iunci odorati, mastiches añ 3 i. ceræ quod satis est, fiat vnguentū. Potest etiam vsus esse eius ce-
 rati, quod R̄ farine fœnigræci, lupinorū añ 3 ii. radicis iridis, asari, añ 3 i. eupatorii, absinthii, meliloti, iunci odorati, añ 3 s. galliæ moschatae i. seminū anisi, fœniculi añ 3 s. mastiches 6 ii. myrrhæ, thuris añ 3 i. oleorum mastichini, nardini, rosacei, anethini 6 i. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratū. Et istius epithematis, quod R̄ se. anisi, fœniculi, ammeos añ 3 i. s. cinamomi, gariophyllorū, iunci odorati añ 3 i. Decoquatur in lb i. s. aquæ vsque ad medietatis absorptionem. Coletur, & colaturæ adiciatur succorum absinthii, eupatorii 2 ii. 6 ii. specierum diacynamomi, diagalangæ añ 3 i. cassuthæ 3 ii. aceti 3 ii. misce, fiat epithema. In humida autem intemperie victus ratione desiccante vtendum, carnibus nimirum volucrum assis, vino tenui, & sudores mouentibus, laconico, balneis naturalibus. Parum verò bibendum accomedendum: pisces quoque in vniuersum omnes, ac fructus quibus humectandi vis inest, deuitādi. Per os sumendus syrupus de absinthio, diallacæ & diacurcumæ confectiones. Extrinsecus etiam quæ exiccant citra insignē calorem, adhibēda, de quib⁹ oībus infra in ca. de Anasarca copiosè dicem⁹. Sicca iccoris intēperies Sicca in-
 haud secus atque hectica febris curatur, hoc tēperici.

Ceratum

Epithema.

Humidæ
intempe-
riæ.

Siccæ in-

solo quòd suprà monuimus nō neglecto, vt
semper humectatibus medicamentis misceā-
tur, quæ robur visceri addere possunt. Et vt
rem paucis perstringamus, in sicca intēperie
balnea sufficiūt dulcium aquarum, & hume-
ctans victus ratio, de quibus in curatione fe-
bris hecticæ copiosissimè dicemus. Ex hoc
itaq; loco petenda erunt, quæ hic desideran-
tur. Ceterum inter ea quæ à proprietate toti⁹
substantiæ, efficacia existunt, optimum est lu-
pinū iecur: quod sanè diligenter tritum, dra-
chmę vnus pondere cum vino dulci aquâ ca-
lidâ diluto præbetur. Hoc em̃ multiplici ex-
perimento cognitum, omnibus iecoris intē-
periebus cōmodum existit: vtpote proprie-
tate totius substantiæ hanc efficaciam habens,
non calefaciendo, aut refrigerando.

DE OBSTRUCTIONE IOCI-
NORIS. CAP. XIX.

Causæ.

Iocinoris obstructio à flatibus vaporosis
& crassis, concoctūq; difficilibus fit. Interdū
autem & à crassis viscosisq; humoribus, in fi-
nibus venarum ex sīma iocinoris parte ena-
tarum, per quas ex ventre & intestinis alimē

Signa.

ti digestio ad iecur contingit. Porro quum
vaporosi & crassi flatus multitudo coacerua-
tur, quæ exitū nō habet, atq; adeò obstructio-
nem efficit, nō grauitatis circa dextrum hy-
pochondrium solū, sed & distentionis sen-
sus oboritur. Obstructionē verò à crassis vi-

scidisq; humoribus cōsequitur grauitatis cū dolore sensus, aliquādo quidē obtusē aliquādo verò vehemētis: & quādoq; quidē absque febre, quādoq; cū febre. Crassa enim & vilcosa ac multa, omnino amplius reliquis obstruunt, & maximē quādo agri à cibo vehementiori motu vtuntur. Si verò acria sint & multa quæ in cibo sumuntur, dolor ex obstructione vehementior fit, quū obturata corpora simul & tensionem perferant, simulque pungantur. Cibi his dandi sunt calidiores, & qui aperiendi obstructiones facultatem habent: nempe porrum ex oxymelite, asparagū, fœniculum, oreoselinum, cappares, reliquæque obsonia ex condimento aliquo calefaciēte, quodq; obstructiones auferat, incocta. Vitanda sunt alimenta crassi succi, balnea, & exercitia à cibo. Vino vtatur tenui, ac veteri. VI.

Curatio.

tra victus rationem attenuantiū quoq; & obstructionē tollētium medicamentorū quā celerrimus requiritur vsus: obstructio enim inueterata nō tantū in iocinore, sed in omni corporis parte putrefactionem operatur, febremque accendit. Præclarè autem & citra molestiam ab obstructione leuant inter simplicia medicamenta lupi iecur, fumaría, eupatorium, chamæmelinum, acori radix, dracūculi radix, asarū, anisum, apiū, ablinthiū, casia, iris, glycyrrhiza, rha ponticum verū, lupini, cappares, ammi, cassutha, oreoselinum, tia.

Simpli-
cia ob-
structio-
né tollen-
tia.

pistacia, amygdalæ amaræ, spica nardi, stæ-
 chas, gentiana, plantaginis radix, semē & fo-
 lia sicca, anagallidis fœminę succ^o, cichoriū,
 halicacabū, intyba vtraque, asparagus, & ru-
 scus. Ex iis varia componi medicamēta pos-
 sunt, potissimum verò decocta, adiectis oxy-
 melite simplici, scyllitico, syrupo acido com-
 posito, de absinthio, hyssopo, calamintha,
 marrubio, & similib^o. In hūc vsum exhibēdi
 etiam pastilli de eupatorio, de absinthio, de
 rhabarbaro, & similib. Conferunt etiam con-
 fectiones dialaccæ & diacurcumæ. Inter cæ-
 tera autē nō solū iucundum, verum etiam
 vtile est, vt pistacia decē aut duodecim per
 noctem in vino Aruisio (quod corrupta voce
 malmasinum hodie vocant) macerata, in au-
 rora coctione iam facta sumantur. Extrinse-
 cis etiā admouēda epithemata, vnguēta, em-
 plastra & cerata, quæ in cap. superiore de cu-
 ratione frigida intēperici iecoris dicta sunt.
 Hæc medicamenta sufficient, si malum non
 inueteratum fuerit. Si enim in vetustatē in-
 cidat, venæ etiam sectio, & purgatio, si nihil
 prohibet, adhibēda erūt. In hunc vsum exhi-
 bēda catapotia de rhabarbaro, de agarico, &
 similia medicamēta, quæ crassos & lētos hu-
 mores per aluum purgare possunt. Vacuato
 iā corpore, ea quę suprā cōprehēsa sunt, pro-
 pināda medicamēta erūt. hoc autem potissi-
 mum eclegma, quod & radicis iridis, radicis

chamepityos, seminū fœniculi, anisi, apii, añ
3 ii. alari 3 ii s. cinamomi, zingiberis, carci,
chamemeli añ 3 i. stœchadis, gentianæ, mar-
rubii añ 3 ii. cum oxymelite scyllitico quod
satis est, fiat eclegma. Hoc mirificè obstru-
ctiones, non solū eas quæ in cauo, verūetiam
quæ in gibbo iocinoris hærent, quandoqui-
dem per vrinas vehementer expurget, tollit.

DE INFLAMMATIONE IO-

GINORIS.

CAP. XX.

In iocinore perinde atque in aliis vitæ. *Causa.*
ribus, ob easdēq; causas, fit inflāmatio. In. *Signa.*
flāmato aut iocinore omnib⁹ quidē ex equo
in dextro hypochōdrio dolor & grauitas est
qui suprā ad iugulū vsq; , infrā aut ad spurias
costas peruenit. Tumor quoq; dextri hypo-
chondrii consequitur. Huic dolori accedit fe-
bris acuta, rufsis exigua & sicca, sitis inexhau-
sta, cibi fastidiū , difficultas spiritus. Lingua
primò rubicūda apparet, postea nigra: bilem
vomūt purā, atq; etiā vitellinā, post aut & e-
ruginosam. alu⁹ adstringitur, color corporis
subuertitur in arquati morbi speciē permu-
tatus, singult⁹ quoq; cōsequitur. Accessionis
etiā tempore quidā delirio apprehēduntur,
& acrem vrinā excernunt. Quando verò pri-
uatim caua iocinoris inflammationē patiun-
tur, nausea, vomitus, cibi fastidium, & ardor
ac sitis intenduntur. Si verò gibba ipsius in-
flammatio exercet, præter alia superius com-

memorata, tumor manifest⁹ quoq; in superficie oculis & tactui conspicuus est. Hęc quidem vehementem grandemq; inflammationem testantur. Sin obscura quędam fuerit, inbebimus, egro magnam edat respirationem. Et si dextrũ hypochondrium dolere asserat, moderata iecoris inflammatio censebitur.

Quod si iuxta situm incubentium iecori musculorum oblõgus inflammationi tumor appareat prædictorum nullo præsentē, illos ipsos inflammatione laborare agnoscemus. Porro iecore inflāmato, sanguinis detractiõne experiri opõrtet, si nihil id fieri impediatur. Incidenda autē in dextro cubito vena interna, ita vt substratam arteriam obseruemus: quę si non appareat, media: si verò neq; ipsa appareat, superior. Copiosus autem, & quantum satis est, si vires ferre queant, educendus. Sanguinis missione factâ, post modicum interualũ, simplici ac leui clysteri aluus eluenda, maximè si non spõte egerat. Extrinsecus cucurbitæ cum scarificatione affigendæ. Fomentis etiam vtẽdum ex lanis oleo imbutis, cataplasmatibus, ceratis, & epithematis. In quibus adhibendis in summa hoc præcipiendũ est, vt adstringentia emolliẽtib; semper admisceantur. Fomẽtũ itaque fiat ex oleo coto-neorũ, aut mastichino, aut rosaceo, aut myrthino, adiecto vino odorifero. Aut adhibeatur spongia madefacta in decocto absinthii,

Curatio.

Fomẽtũ.

meliloti, rosarum rubearū, chamæmeli, plantaginis, intybi domestici (quam endiviā vocant) & similium. Cataplasmata verò, & emplastra ex semine lini & fœnigræci, farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus, in hūc modum componēda sunt. R̄ farina hordeacea ꝯ s. carnis cotoneorum contusa 3 iiii. absinthii, florum meliloti, iunci odorati añ 3 ii. seminis lini 3 i. oleorum rosacei, cotoneorum, chamæmelini absinthini añ ꝯ s. aceti ꝯ i. misce, fiat emplastrum. Cerata sic confici possunt. R̄ carnis palmularum 3 iiii. myrrhæ in vino veteri adstringente macerata, styracis, mastiches añ 3 ii. florum meliloti, comæ absinthii, chamæmeli añ 3 i s. croci 3 s. oleorum cotoneorum, mastichini, rosacei añ ꝯ i. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratum. In hūc vsum etiā epithemata ex decocto herbarum suprā nominatarum, aut succis rosarum, plantaginis, absinthii, chamæmeli, & similibus componi possunt. In quibus omnibus componendis vnicè studendum, vt adstringentia vbi vehemens adhuc est inflammatio, relaxantibus & emollientibus præualeant: cōtrā verò remittenti vehementi calore, emollientia adstringentibus. Cauendū prætereā, ne prædicta actu frigida admoveantur, sed prius modicè calefacta. Porro in inflammatione iecoris vbi maligni circumstant dolores, etiam medicamēta

Emplastrum.

Ceratum

Nihil actu frigidum iecori in-

flamma- dolorē leuātia in potu sunt exhibenda: ita ta
 tione la- men, vt assiduus eorū vsus deuitetur. Simpli-
 boranti- cibus autē portionibus frequentius vtēdum.
 adhiben- Senecionis itaq; decoctum tanquā maximē
 dum. commodū, aut succus glycyrrhizæ cum aqua
 calida exhibendus. His nō minū cōfert inty-
 borū succus, adiecto modico melle. Ad hoc
 enim q̄ refrigerat, aq̄ firmitatē visceri addit,
 etiam ora venarum iecoris expurgat. Cæte-
 rū aluus etiā irritanda est, vrticæ vel mer-
 curialis coctōrū esu. In declinatiōe etiā mor-
 bi aluus per clysteres inaniri postulat. In quē
 vsum polypodium & epithymum ex mulsā
 porriguntur. idque potissimum, si in cauo vi-
 sceris fuerit inflammatio. Caua enim iecoris
 per aluum, gibba verò per vrinas expurgan-
 da sunt. Porro in iecoris inflāmatione, ex-
 quisitissimo victu, Galeno lib. 13. Ther. met.
 monitore, est opus. Poscit autē iecur ipsū
 cibos, qui obstructa recludāt. Talia verò o-
 mnia sunt tenui consistentiā, & quæ citra ro-
 sionē detergunt: cuiusmodi est ptisana, mul-
 sa. Alimentū igitur optimum est sic patienti-
 bus, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit.
 Ius etiā pulli gallinacei, in quo oreoselinum
 decoctum sit, dari potest. Bibat mulsam, aut
 decoctū hordei, vel intyborū domesticorū.
 Si inflam- Cæterū si inflāmatio, principiū permu-
 matio tationis ad suppurationē iam suscepit, tū o-
 ad sup- mnia prædicta augebuntur, dolores nimirū,

febres, deliriū, anxietas, cibiq; fastidiū. Adiu- puratio.
 uare igitur per mutationē ac puris eruptionē nē tēdat.
 oportet, vt quā celerrime fiat, ne maiora Maturan
 inde corpora corrumpantur, per vsum vide- tia.
 licet istius cataplasmatīs, quod R^x radicis al- Cataplas
 thææ ꝑ i s. seminis fœnigræci, lini añ ii. folio- ma.
 rū althææ, maluæ añ m ii. caricarum numero
 vi. Bulliant in aqua donec mollescāt, dein cō
 tundantur, & fiat cataplasma. Neq; verò in-
 conuenienter etiā emplastra, quæ puris per. Empla-
 mutationem iuuare possunt, adhibētur: qua- strum.
 le est quod R^x farinæ hordeacæ, farinæ fœ-
 nigræci añ 3 iii. radicis althææ 3 iii. s. radicis
 liliorum alborū 3 i s. seminis lini 3 i. florum
 chamæmeli, meliloti añ p. i. Bulliant omnia
 in aqua, donec ad mellis crassitudinem per-
 ueniant. deinde adde olei chamæmelini ꝑ i.
 olei liliacei ꝑ i s. & bulliant iterum, fiatque
 emplastrum. Ex prædictis possunt fieri cera-
 ta adiectis butyro, ladano, resina, & cera.
 Quum autem perfecta suppuratio fuerit, do-
 lores remittēt, omnesque accessiones mitio-
 res apparebunt. Cæterum rupturæ tempore
 dolor rursus magis augeſcet: quare etiā tūc
 rupturam adiuuare oportet, per stercoris ca-
 prini & columbini, seminis vrticæ, sinapi, a-
 liorūque ad superficiem attrahentiū vsum:
 & per potiones calorificas, vt est decoctū po-
 lii, fumariæ, radicis chamædryos, & thlaspe- Abster-
 os. Facta ruptione, aqua mellis, aut ciceris gentia.

decoctum, aliâque quibus abstergerendi facultas inest, quæ infra in capite de renum exulceratione commemorabuntur, propinanda. Et si puris transmissio per venas fit, vrinam mouentia admiscenda sunt: Sin per aluum, ea quæ leniter subducunt, serum nimirum caprinum, tamarindi, cassiâque fistularis exhibenda. Dein facta absterfione, quæ conglutinare possunt, propinanda.

DE ICTERO. CAP. XXI.

ἰκτερος.

Causæ.

Icterus est bilis, modò flauæ, modò atræ, per vniuersum corpus effusio. Latine regiam & arquatam passionem vocant. Celsus etiam auriginem appellat. Harum omnium appellationum causas alibi explicauimus. Fit interdum iecore nihil patiente bilis effusio ad cutem in morborum iudicationibus. Nonnūquam vbi citra febrem sanguis ab extranea aliqua occasione corrumpitur, ac biliosus efficitur, sicut à venenatarum bestiarum morfibus contingere consuevit. Quin & fieri potest propter inflammationem, aut naturalis temperiei iocinoris aut lienis permutationem. Fit etiam aliquando ob imbecillitatem vesicę bilis susceptricis, quę biliosum humorem, veluti consuevit, in se se ex iocinoro non attrahit, & ob id impurum sanguinē relinquit. Aliquando autem propter obstructionem, aut debilitatem vasorum, quorum ora ex ea ad iecur deferuntur, biliosum humo

rem non attrahit, atque adeò icteron efficit. Interdum etiā fit propter meatus, qui ad intestina vadit, obstructionē. Quare ad icte- Signa.
 ri causas probè discernendas, excrementorum figura & color necessariò cōsiderantur, quum in aliquibus multum colorata per flavam bilem appareāt, quemadmodum etiam in aliis vrinæ. In quibus enim ratione indicationis bonæ in febrib⁹ biliosus humor ad cutem prorumpit, iis & excrementa & vrinæ naturali modo se habere videbuntur. Si autē cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio gravitas adsit, feruens iecoris inflammatio significatur, cuius vi sanguis in bilem mutatus, per univ-
 sum corpus defertur. Sin feruor citra gravitatem in ipso substat, ex sola calida iecoris intemperie vitium gignitur. Quibus verò citra febrem vnā cum gravitatis alicuius sensu circa dextrum hypochondriū alba excrementa deiiciuntur, in his vesicę bilis suspensæ meatus obstructionem esse factam putandum est. Si verò citra gravitatem talia deiiciantur, vires esse infirmas, aut attractricem quæ ex iecore attrahit, aut eam quæ ad intestina propellit, existimandum. Sin iis etiā vrinæ biliosissimę affatim excernuntur. Porro in quibus atræ bilis humor vnā cum sanguine ad cutē est delatus, hi omnino gravius patiuntur. Consequitur enim ipsos tri-

stiria præter rationem, & mordacitas eorum
 quæ circa ventrem sunt, difficultasq; spiran-
 di: & cibos auersantur, & nigras vrinas excer-
 nunt. Stercora verò chalcanti colorem refe-
 runt, & alius iis magis resiccatur. Cæterum
 eos qui ex pallida bile regium morbum cõ-
 trahunt, nulla mordacitas eorum quæ circa
 ventrem sunt cõsequitur, neque etiam in tan-
 tum auersantur cibos. Stercora alba egerun-
 tur: vrinæ autem crocei coloris, turbatæ ta-
 men permanēt. Cõmuniter autem omnibus
 ictericis pigrities ad mortu accidit, & ad dul-
 ces cibos animum habent alienatum. Pruri-
 tus etiam vniuersi corporis comitatur. Alba
 oculorum, & partes faciei temporibus pro-
 pinque, itẽmque malæ pallorem ostendunt.
 venæ etiã sub lingua repletæ reperiuntur, &
 abundantem humorem significant. Icteri-
 ci igitur, qui ratione bonę iudicationis feбри-
 bus perfectè solutis fiunt, facillimè curãtur,
 si lauacris aquarum dulcium vtantur, ac olei
 discussorii perfriktione, omnibûsq; quæ cu-
 tem rarefacere possunt: qualia sunt, oleum
 chamæmelinum, anethinum, irinum, & simi-
 lia. Victus quoq; rationem vniuersam in iis
 humectiorem constituere oportet, & vt hu-
 morum crassitudinem attenuare possit. Qui
 ex virulẽtorum animalium morsibus ictero
 corripiuntur, curandi ferè sunt sicut ii qui à
 rabido cane morsi sunt: de quibus suo loco

Curatio.
 Si ratiõe
 indicatio-
 nis bonæ
 accadat.

Si ex mor-
 su virulẽ-
 torum.

diximus. His qui ob calidam iecoris intemperie, aut inflammationem arquati sunt, cui temperie ratio superius comprehensa, ubi de Iecore age aut inflabatur, admouenda erit, eamque integram in matione hoc caput transferre oportet, ne eadem nobis iecoric. sint sæpius repetenda. At si propter obstru Si ab ob-
 ctionem vesicę fellis susceptricis fiat icteros, stru ctio-
 tum duo maxima remedia principatum ob- ne.
 tinēt, sectio venę, & purgatio. In quibus igitur multitudo sanguinis vnā cū bile in toto corpore abundat, & quos circa iecur aut li-
 nem grauitas aut distensio infestat, in iis ni-
 hil venę sectione commodius fieri potest, si
 nulla alia re id facere præpediatis. Secāda ve Venę se-
 rò est vena, in dextro cubito interna, iecore ctio.
 patiente: liene autem, in sinistro. sanguisque
 particulatim & per vices est detrahendus, ne
 per coaceruatā euacuationē vires ægri pro-
 sternantur. Neque verò ineptē clyster adhi-
 betur, si à venę sectione excludimur. A venę
 autē incisione etiam non incōmodē clyster
 iniicitur, qui propter stercorum euacuatio-
 nē spirādi facilitatē inducit: intestināq; irritā
 do ac mordēdo, humores ad cutis superficiē
 delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Sit verò ta-
 lis, aut huic similis. R̄x intybi vtriusq;, marru-
 bii, eupatorii, adianthi, orihani, absinthii, añ
 1. seminū anisi, fœniculi, oreoselini, aspara-
 gi, añ 3 ii s radicū glycyrrhizę, apii, fœniculi
 añ ʒ i. Bulliāt in aqua sufficiēti. dein colatu-
 p iiii

Clyster.

re. R̄ x̄ xiii. casia fistularis ℥ i. hierē picra ℥ s.
 eclegmatis de succo rosarum 3 ii. oleorū ane
 thini, irini añ ℥ i s. salis 3 i. fiat clyster. Ceterū
 purgationes huic morbo magis proprię & fa
 miliares sunt, sic tamen vt eduliis & portioni
 bus itēque medicamētis humores prius at
 tenuentur. Cibis itaq; vtendum concoctu
 facilibus & extenuantibus volucris mōta
 nis, piscibus saxatilibus, olerib⁹ que vrinam
 cient, præsertim intybis, asparagis, smyrnio,
 fœniculo, & similibus. Carnes ferinæ māsue
 tis magis sunt aptę. Pro liquamine seu embā
 mate valet acetū, in quo aristolochia macera
 ta sit. A fructibus abstinendum. Bellaria sint
 amygdalę, sed modicē sumātur; & cicer, mo
 dicē torrefactum. Eius etiam decoctum assi
 duē potatum, non parum confert. Vinū con
 venit albū & tenue, nō valde vetustū. Quod
 ad medicamenta ipsa attinet, sumēda sunt q̄
 in cap. de obstructione iecoris, & in lib. i. de
 Extenuandis pituitosis humoribus cap. 8. di
 cta sunt. Potissimū verō apii, adianthi, ca
 laminthes, verbenacę rectę, rubiæ radice,
 aristolochiæ, serpilli, hypericiq; decoctum.

Purga
 tio.

Extenuatis iam & præparatis humoribus,
 pharmacum quod flauā bilem purgat, exhi
 bendum. Sunt autē purgationes ictericis dā
 dæ fortiores: ob ventris enim siccitatē imbe
 cilliores, inefficacēsq; in ipsis cognoscuntur.
 Quę autē præ aliis cōferunt, est dilutū Rha-

barbari Li. I. cap. 7. descriptū, ac hierapicra, eclegma de succo rosaceo, de psilio, & diaphœnicôn. Quòd si primo purgāte medicamēto nihil proficias, rursus ad ea quib⁹ obstructiones tollendi facultas inest, reuertendum, & post triduum rursus violentius purgandum. Si liene patiente malum oriatur, ad caput de Melancholia & obstructione lienis recurrendum. Postea quæ viscera repurgāt, Viscera exhibenda sunt medicamenta. In quē vsum vtraq; re- radix cyclamini trita potata cōfert. Hæc e- purgan- nim nō solū repurgat viscera, verum etiā ad tia. bilem in vniuersa cute excludendā per sudorem aptissima. Quare post eius potionem sudoris exclusionem per velamenta ac cōcoctionem in lecto iuuare oportet. Dātur ex ea drachmę duæ, aut tres, ex aqua mulsa. Preclarè quoque facit corticis raphani succus, vino meraco dulci permixtus, aut vino mulso, ita vt succi ḡ ii vini ḡ i. contemperentur. vermes etiam terreni exiccati, & vino mulso per triduum dati iſterū per lotium eiicient. Item cassuthæ succus mirificè etiam prodest. Ceterū medicamenta quæ in potu accipiuntur, omnia, si fieri potest, in balneo exhibeātur, vbi nimirum ægri in solium calidū conscenderint. Plarimum quoq; diætæ virium refo-cillatrici hoc tempore intentum esse oportet per quā facultas excretrix reparetur, & si qua pars læsa sit, corroboretur, ac præsens coloris

corruptio repurgetur. Quapropter cōueniūt exercitia, gestationes, inunctiones ac exudationes. In hunc vsum pyriateria cōferunt, in quib. oleum, in quo serpillū aut rosmarinus herba decocta sit, corpori illinēdum. Quod Variatus color o- si verò quippiā ex ictero circa faciem & oculorum' los relinquatur, vrinæ autem appareant puræ, aluiſque consueto more egerat, narium & faciei ræ, aluiſque consueto more egerat, narium ut amo- infusis vtendum. In quem vsum cyclamini uendus. succus, item nigella cum aceto, anagallidis & betæ succus infunditur. Acetum etiam accerrimum naribus attrahat æger in folio descendens, cōtineatque pressis naribus paulisper, & mirificè vacuabitur.

DE AQUA INTERCVTEM.

CAP. XXII.

Aque inter cutem Hydropis seu aque inter cutem tres sunt species. Alia enim Ascites, alia Tympanites, & tertia Anasarca, Hyposarca, Sarcites, & Leucophlegmatia dicitur. Ascites est, quum *ἀσκίτης* inter mēbranam peritonēum appellatam, & intestina plurimus aquosus humor coacervatur. sic dicta, quod *ἀσκή*, id est vtri modo *τὴν περικυτὴν* membrana ipsa repleta esse videatur. Tympanites est, vbi flatus ac spiritus superfluous plurimus in iisdē ventris locis congregatur. *ἀνασάρκα* Anasarca est, vbi per vniuersam corporis molem humor disseminatur, vt instar spongiarum aut papyri vniuersa caro permade facta appareat. Fit hydrops, ob insignem iecoris

frigiditatē, aut ob alias partes vehemēter refrigeratas, quę iecur in eundē affectū deducere valēt. Coafficitur autē iecur lieni refrigerato, aluóq; & intestinis, maximē iis quę iuxta ieiunū intestinum sunt, pulmoniq; & renibus ac septo transuerso. Contingit etiā ex immodica hæmorrhoidū euacuatione, aut ex fluxu mēstruorum, aut eorūdet̃ retētiōe, aut ab alia quadā magna veteri affectiōe, duritiē nimirum, aut simili. Multi autem & à podagra & coxendicum dolore vexati, aquam inter cutem inciderunt. Frequentissimē autē eos qui malo corporis habitu præditi sunt, item ab ictero infestatos, hydrops consequitur, celiacam item affectiōem & dysenteriam. Cōmuniter omnis hydrops spirādi difficultatem, & tumorem, & gravitatem, & vitiatum colorem inducit, ex virore nimirum albicantibus ægris. Fastidiunt etiam cibum, potum autem largiorem appetunt, maximē qui ex ascite laborant. Etenim humor qui in locis detinetur, salus est & putrefact⁹. quare febris etiā sequi vt plurimum solet. Aquā inter cutē minus fœminæ q̃ viri tētātur. Inter cōmemoratas tres species tympanites omnino periculosa, minus eā ascites, deinde hyposarca. Viātus autem omnibus hydropicis cōmunis est, vt vniuersus cib⁹ facilis cōcoct⁹, & sufficienter coact⁹, atq; aridus sit, exolutus enim & humidus, aptus est

Signa.

Signa.

Viātus.

ut in aqua sitatem commutetur. Panis itaque optimus clibanites, qui salem, ammi, & fœniculum, anisum, aut cuminum habeat admixtū. Debet is etiam probè fermentatus esse. sic enim minus adstringit, aut obstruit. Ex avibus conveniunt sicciores, velut perdices, turtures, turdi, merulae, & similes. Ex terrestribus capra sylvestris, lepus. Ex māsuetis, pulli galinacei assati, extremæ suum partes. Ex aquaticis, cancri fluviatiles. Ova etiam assata profunt. Olerum rarus sit usus. quæ verò eis exhibentur, acriora sint, & extenuandi calefaciendiq; vi prædita: velut est apium, oreoselinū, daucus, eruca, pulegiū, brassica, allia cocta, cepæ, porri capitati. A leguminibus verò abstinendum in totum. Pro liquamine utantur aceto cū pipere, cinamomo, & similibus. Sales sint ex fœniculo, hyssopo, rosmarino, apioque compositi. In potu tantū præbendum, quantum ad frangendam aliquo modo sitim sufficit: incōmodus enim est hydropicis plurimus potus. Vinum autem bibant tenue, & quod urinam ciet. Dulcia verò vina, & vinū mulsum vitāda. Acetum autem mirificè illorū sitim restinguit. Porro maximam ciborū partem in cœna accipiant. Plurimos fructus, & secundas mensas vitent. Cōcedendæ tamē nuces, amygdalæ, mala punica, pyra cocta, accaricæ: omnia moderatè, neq; omnia quotidie. Lectus non valde mollis sit, præsertim

iis qui anasarca laborāt. Substernātur autem herbæ resiccantes: velut est pulegiū, calamintha, origanum, & similia. Mirū est enim quantum eiusmodi resiccent per somnum, ut cōstet iam quosdā frumenti aceruis obuolutos & absconditos à somno surrexisse firmos. Exercitationes etiam, si sol adsit, in sole fiant: capite tamē velato: Sin frigus sit, in domib. per subiectū ignem cōcalefactis, aut iuxta ignē. Expedit verò imprimis equitatio, & huc & illuc in cathedra circūferri. Ceterū pedibus, si per vires laborantis fieri potest, deambulare multū, & quādoque currere, quā gestari satius est. obuoluendi etiā acri in pellibus sole vstis, aut in arenā calidā defodiēdi. Post exercitia sudores per lintea asperiora extergantur. optimē quoq; cōducit, si quōtidie ter quaterve frictione utatur. Hæc enim meatus conuiuentes aperit, humores desiccat, extenuat, atq; dissipat. Valde itaque celeriter & sudores elicit plurimos, & carnē cogit. Perfricandi autē sunt manibus aridis, aut ex sale in aqua aut oleo calefaciēte trito. Post hæc cum aqua aluminosa, aut sulphurea, aut salsa lauari. Aliquib. enim qui hyposarca correpti fuerunt, & ad huiusmodi balnea adsueuerūt, ea ipsa tum ad deterēdum morbum, tum ad habitum valentiorē reddendum suffecerunt.

Quantū autem ad curandi rationem attinet, **Curatio.** omnibus hydropicis commune remediū est

statim inter initia humoris abundantis euacuatō quę vel per venę sectionem, vel medicamēta purgātia, vel vrinam mouentia, quę admodum in sequentibus particulatim cuiusque speciei hydropis curationem tradituri dicemus, fieri potest.

DE ANASARCA. CAP. XXIII.

Signa.

In anasarca totius corporis moles, & vniuersa caro (vt dictum est) instar spōgię madida ac laxa apparet, atque adeo totum corpus

Curatio.

intumescit, ac mortuo simile euadit. Curatio à sanguinis detractione auspicāda, maximē si passionis origo ex hæmorrhoidib⁹ aut mēstruis suppressis est, & virtus atque ætas permiserint. Hac enim ratione plenitudo quę infestat exhauritur, & languētis natura exonerata alacrior fit, & mali causa minuitur, & deinde necessariò minore negotio redit sanitas. Præuis humorib. per venę sectionē detractis, ad purgantium medicaminum præsidia deueniendum. Quod si tamē extenuatione ac humorū ad expulsionem præparatio-
ne opus sit, decocta & alia quę suprà in capit. de Iecoris imbecillitate & obstructione dicta sunt, exhibeantur. In quem etiam vsus syrupi de absinthio, de intybo (quā endiuia nominant) de eupatorio, & byzantiis barbaris dictus, exhibendi. Purgantia verò medicamēta simplicia sint, R habarbarum, & agaricus: Composita verò, catapota de rhabar-

Purgatio.

baro, de hiera simplici, de agarico, & similia. Cōuenit etiam inter initia hiera picra, quòd hæc obstructiones laxet, & visceribus robur addat. Quapropter cauēdum, ne valida, quæque nullū iecori robur adiciunt medicamēta exhibeamus. Infestās enim humor sensim & paulatim per purgantia medicamenta vacuandus. Semel enim & confertim euacuant, mirificè vires deliciunt, iecurque refrigeramus. Singulis itaque septimanis aluus subducenda, semperque à mitiorib. ad aliquantulum valentiora transeundum. In hunc igitur vsum cōueniūt eclegmata diaphœnicōn, & indi. Pulcherrima etiā purgatio cōficitur ex radice sambuci in vino decocta. Prodest itidem & ebuli radix: eadē nanque sambuco & ebulo vis est. Porro reliquo curationis tēpore, quo purgātib. medicamentis abstinēt, exhibēda q̄ iecori robur addūt, quorū multa suprā de imbecillitatis eiusdē & obstructionis curatione dicta sunt: & quæ vrinā mouere possūt. In quē vsum exhibebim⁹ cōfectiones diarhodōn abbatis, aromatici rosacei, dialaccæ, diacurcumæ, pastillos de eupatorio, rhabbaro, & absinthio: theriacā itē, & similia. proderit aut vnicè hoc medicamēto vti, quod

Robur addentia iccori, & vrinā mouētia.

Tragea.

℞ specierū diacurcumæ, dialaccæ, añ ʒ i. specierū diatriasantali, diarhodō abbatis añ ʒ s. specierū aromatici rosacei ʒ i. rhabbari selecti ʒ s. seminū itybi domestici latioris, me-

Extrinsecus quæ
ad mouenda medi-
camēta.
Cataplasmata.

Emplastra.

lonum, fœniculi añ ð ii. absinthii, chamæmeli, cassuthæ añ ð i. nucis myristicæ, iunci odorati, spicæ nardi añ ð s. sacchari & i. misce, fiat tragea. Mirificè etiam hoc conferet, quod R^x seminū carei, fœniculi, anisi añ ð ii. cumini, seminis hyperici añ ð i. seminū ammi, petroselini, dauci, smyræii (leuisticū vocant) añ 3 s. radicū iridis, asari añ 3 i. absinthii ð i. glycyrrhizæ 3 i. sacchari equale omnibus pōdus: misce fiat tragea. Animaduertendum autem, ficciora medicamenta magis quàm liquida anasarcis competere. Cæterū non prætermittendum, quin extrinsecus ea etiam adhibeantur medicamēta, quæ humores desiccare possunt: qualia sunt cataplasmata, emplastra, & vnguenta, aliāque medicamēta resiccandi facultate prædita. In quē vsum cataplasma ex farina hordeacea, fabaceāq; fœnogræco, radice ebuli, baccis lauri, absinthio & origano in vino decoctis confectum, & toti vētris capacitati impositum cōuenit. Item stercus bubulum conuenienter resiccatum, non ineptè cū posca, aut oxymelite imponitur, infarcta ac superinspersa sulphuris quarta parte. Caseus quoque recens multum coaguli habens, optimè ad omnes tumentes partes impositus facit. Deniq; stercoris colūbini, stercoris caprini, buphthalmi, & chamæmeli, æquales partes tusæ, in acerrimo aceto & melle coctæ adhibeantur. Emplastris etiam vtendū ex fer-

mēto, caricis, nitro, iride, meliloto, salvia, pu-
legio, cardamomo, sulphure viuo, baccis lau-
ri, staphysagria, sale, ammoniaco, mastiche,
thure, abrotano, aristolochia rotunda, fimo
columbarum, cum oxymelite cōfectis. Cæte-
rū omnia impinguantia & resinosa cerata
vitanda sunt, veluti quæ inflent, & tumores,
eo quòd difflationē impediunt, distendant.
Tamen debent assiduē & crura & manus, a-
liq; tumefactæ partes in sole, aut iuxta ignē
hoc medicamento inungi, quod R̄ vnguēti Vnguen-
agrippæ & i. pinguedinis suillæ & i s. farinarū tum.
seminis lini, scenigræci, fabaceæ, hordeaceæ
añ 3 i s. seminū althææ, nigellæ, dauci añ 3 i.
sulphuris viui 3 iii. boli armenia, 3 ii. radicis
iridis 3 ii s. aluminis scissi, thuris añ 3 i s. eu-
phorbii 3 i. oleorum irini, liliorū alborū, cha-
mamelini añ & i s. cū cera quod satis est, fiat
vnguetum. quo liquefacto, ex eo sæpe tumo-
res illinendi. Iam dictis addantur ea quæ su-
prà in victus ratione sunt exposita.

DE ASCITE. CAP. XXIIII. Signa.

In hac vëter totūque abdomē intume-
scit, eoque concusso talis auditur sonus, qua-
lem vter aqua nō omnino plenus reddere so-
let. Reliquæ verò partes corporis, superiores Viçus.
præcipuē, minimē inflātur. Viçus ratio in
hac aqua inter cutem specie sit ex montanis
auiculis, & aliis cōcoctu facilibus, & bonum
procreatibus succum, haud secus q̄ in prio-

Curatio. re. Curādi ratio á purgantiū medicamēto-
rū vsu auspicabitur. Quapropter ea medica-
menta quæ in cap. præcedente commemora-
ta sunt, ægrotantibus exhibēda. Superat autē
omnia reliqua, brassica marina (quā soldanā
& soldanellum hodie vocant) in potu assum-
pta. Hęc enim in euacuanda hydropicorum
aqua mirificū ostēdit effectum, adeo vt mul-
ti solius eius vsu sanitati sint restituit. Dantur
ex ea drachmæ duæ, pl⁹ aut minus, iuxta cor-
porum diuersitatem, in vino, aut sero lactis.
Conferunt etiam catapotia de sagapeno, &
drachmæ duæ aut tres succi radices iridis, ad-
iecta sacchari vncia vna. Clysteres etiam ad-
hibēdi acres, nisi vēter sua sponte humescat:
tunc enim exiccare ipsum magis conuenit.
Commēdatur autem eiusmodi, qui R^x florū
daphnoidis (laureolā vocāt) 3 ii. polypodii,
agarici añ 3 i s. cassuthæ 3 iii. decoquātur in
vino aut aqua. R^x colaturæ ꝑ xii. benedictę la-
xatiuæ ꝑ s. eclegmatis indi 3 ii s. mellis ꝑ i. o-
lei rutacei, chamæmelini, irini añ ꝑ i. salis gē-
mę 3 i s. misce, fiat enēma. In eum etiā vsū
colocynthis, cartamus seu cnic⁹, bacci lauri,
semen anisi, ammi, & carei, ruta, radix cucu-
meris syluestris, adiectis aliis decoq⁹ posūt.
Post auxilia prædicta, vētri vniuerso ex præ-
scriptis cataplasmatibus & emplastris quædam
imponātur. Adhibeātur etiam inunctiones,
exercitia, urinā & sudores mouētia auxilia,

Clyste-
res.

de quibus omnib. suprà copiose diximus.

DE TYMPANITE CAP. XXV.

In hoc vitio venter inflatur, distenditurq; **Signa,**
 & concussus tympani sonitū edit, reliquæ ve
 rō corporis partes emaciantur. **Vitus.** **Vitus.**
 tionem prioribus similem obtinet, tamen cū
 magna ex parte ē flatib⁹ oriatur, vnicē vitā-
 da sunt omnia flatuosa. Agrotanti autē mul-
 ta exercitia, & sitis ingēs, strenuō auxiliatur.
 Curatio autem ipsa ā purgantibus medica- **Curatio.**
 mentis inchoāda. Clysteres etiam, quibus **Clyster.**
 flatus discutiēdi facultas inest, infundere o-
 portet, qualis est qui R^x radicum apii, fœni-
 culi añ ʒ i. seminū anisi, fœniculi, dauci, smyr-
 nii, oreoselini, cumini añ 3 ii. carei 3 iii. rutæ,
 asari, foliorū ebuli, meliloti añ m i. Bulliant
 in aqua sufficienti, quoad tertia pars absum-
 pta fuerit. Colaturæ R^x lb i. hieræ picræ, be-
 nedictæ laxatiuæ añ ʒ s. eclegmatis de baccis
 lauri 3 iii. oleorū rutacei, anethini añ ʒ i s. fa-
 lis 3 i s. misce, fiat clyster. Danda etiā sic affe-
 ctis ea quæ vrinam mouent: & iis quæ flatus
 discutere & digerere possunt, tū intrinsecūs
 tū extrinsecūs viendū. Qualia certe multa in
 cap. de coli dolorib. ad quod recurrēdū erit,
 dicta sunt. Vēter itaq; indies panico, milio, **Sacculi.**
 sale, furfurib. foliis rutę, chamemeli florib. ci-
 nere calido, sacculis insutis, fouendus. Potest
 etiā hoc adhiberi ceratū, quod R^x florū cha- **Ceratū.**
 mæmeli, meliloti añ 3 i s. mētastri, satureiæ,
 q ii

asari añ 3 i. seminum anisi, fœniculi, rutæ, ru-
mini, dauci añ 3 i. cardamomi 3 s. myrrhæ,
castorei añ 3 i. oleorum rutacei 3 iiii. anethi-
ni 3 i s. resinæ & ceræ quod satis est, fiat cera-
tū. Cucurbitulæ præterea leues, cū multa flā-
ma crebrò toti ventri suffixæ, mirificè pro-
sunt. venter etiam aspero linteo tantisper dū
rubor excitetur, perfricandus. Intrinsicus v-
tendū confectioibus dianisi, diacumini, &
cōfectio. ex baccis lauri: vel ista, quæ 3 s. specierū dia-
nisi, diacumini, añ 3 i. specierum eclegmatis
de baccis lauri 3 i. specierū diagalāgæ 3 s. se-
minum anisi, carei, dauci, fœniculi añ 3 s. fo-
liorū rutæ, se. appii, smyrni añ 3 i. sacchari 3
vi dissoluti in succis fœniculi & apii, fiat cō-
fectio in morsulis. Quæ hic desideratur alia,
pete ex cap. de coli doloribus.

DE INTemperie LIENIS.

CAP. XXVI.

Quemadmodum reliquæ corporis par-
tes octo intemperierum generibus affligun-
tur, ita & lien. Verū frequētissime frigi-
dam & humidam sustinet intemperiem. Sin-
gularum autem causas nō est cur referamus.
eadem enim sunt, quæ aliarum partium cor-
poris. Petendæ itaq; ex Lib. Galeni de Mor-
borum caus. cap. primo, secūdo & tertio. Si-
gnum autem certum & cōpendiosum intem-
periei in liene, ea quæ edūtur ac bibūtur, ex-
hibeāt & quæ forinsecus cuticulæ iuxta fini.

Causæ.

Signa in-
tēperiei
nudæ
qualita-
tis.

strū hypochondriū accedunt. Si enim frigidā intēperies in xta ipsum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile & manifestē lienē lædit. omnia etiam frigida extrinsecūs admota offendūt, atque adeò frigidam lienis arguūt intemperiem. Eam verò ipsam omnia calida cōsolantur. Quòd si calida fuerit lienis intēperies, à nullis quæ in cibo aut potu exhibētur, aut etiam extrinsecūs accedūt, dolorem perfert. Et si quidem caliditas augeat, nō solum nihil tumori apponitur, sed & contractionem amplius sustinet, præsertim si febris adsit. Ceterum & cibi & pot⁹ calefaciētes, & quæ extrinsecūs corpori calorē addūt, calidas etiam intemperies augēt & exacerbant. Solatio autē sunt eis omnia refrigerātia. Similiter etiā sicca intēperiei in liene signa colligere oportet, maximè quū pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecūs corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si exiccādi facultate prædita sunt, lienem exiccant. Porro vbi humida intemperie lien laborauerit, atq; ea amplius inualuerit, in tātum eius excrementum facit, vt etiā ventrē ac iecur pertingat. Species quoque doloris vnā cum prædictis signis infestantem intemperie demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neq; quicquā etiā in humida: minimū

Frigidæ.

Calidæ.

Siccæ.

Humidæ

q iii

Signa in-
temperiei
cū fluore
substan-
tiæ.
Biliosa.

Atræ bi-
lis.

Pituitosæ

Sangui-
nea.

verò in sicca. Ex prædictis etiam coniecturâ
facere licet compositarum in liene intempe-
rierum. ferè enim in totum ubi calida intem-
peries fuerit intensa sicca eam cōsequitur, &
ad frigidam inueteratam humida cōcomita-
tur. Quādoquidem verò & humores in lie-
nem cōfluentes tumores producant, eorum
quoque diligentē considerationem facere o-
portet, qualēsnam sint tādē, ex iis quæ iam
dicētur. Bilioso enim fluore existēte, vniuer-
sum corpus calidius apparebit, etiā si nō ad-
sit febris: oculique & vrine per bilem colora-
te. Siccitatem semper accusabit eger, & de si-
ti conqueretur ac bili os infestāte. Cibū fasti-
dit, & vigiliis infestatur, frigidāque deside-
rat, vnā cum hoc quòd linguā subflauam ha-
bet. Si verò atræ bilis sit fluor, color tum in
linguā, tum in reliquo toto corpore appare-
bit, & appetentia aderit ciborum, mœstique
ac subtristes ægri sunt. At verò ubi pituito-
sus humor in lienem deferatur, consimilis pi-
tuitosis aderit color, egrique minime sitient,
& cibū appetent, nisi salsa fuerit pituita: tunc
enim cibum fastidiunt ægri, potūsque magis
sunt appetentes. Quin vrine quoque pituitosæ
sunt, ipsique ægri secundū mores pigri sunt &
segnes. Quidam verò ex eis qui frigidā affe-
ctionē habēt, magnū & durū lienē acquirūt.
Quòd si sanguineus existat in lienē cōfluens
humor, possibile est ipsum colorē eū iuxta

linguā, tum circa cutem permutari. Inter appetentiam autem ciborum & fastidium, medio quodam modo habent ægri, reliquique magis languent, etiā si nō parem visceris tumorem habeāt. venæ verò vniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & vrine subfuluæ. Hęc signa fusiùs ex Aëtio narrauimus, quòd nimirū communia sint, & omnibus reliquarum partiū corporis intemperiebus adaptari queant. In vniuersum quidem lienis intemperies nudæ qualitatis ferè citra tumore sunt. Curatio Eas itaq; tū per cibos ac potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomētorum irrigationes, quæ intemperiei cōtraria sunt, corrigere oportet. Calidam igitur curabis, sicut iecoris, per cibos ac potus frigidos, inunctiones ex rosaceo & melino, atque per alia quæ cap. 18. huius libri sunt dicta. Frigidā lienis intemperiem haud secūs atq; iecoris, per ea quæ moderata calefaciēdi vi prædita existūt. In humida lienis intemperie, præter ea quæ paulò antè citato cōmemorata sunt, proderit quinquifolii radix, plātago sicca, spuma & flos salis, ammoniacū, succus salicis, & similia, si ex iis affuso sufficiēti aceto vnguentum aut ceratū cōficiatur, qualia paulò post describemus. Cōueniētissimæ etiā huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatē obtinēt. Siccam lienis intemperiem balneū dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item

q. iiii

Curatio ex oleo dulci. cibi citra refrigerationem hu-
intempe- medietates, velut est ptisanę succ^o. Porro si in-
rici cum temperie cum substantię fluore lien afficitur,
fluore tū vbi sanguinea fuerit, ex vena cubiti inter-
substan- na sinistri brachii (quam lienarem vocāt) san-
tia. guis mittendus erit. Aut, si ea inueniri haud
 possit, ex ea quę inter annularem & auricu-

Lienem larē vocatos digitos sita est. Dein adhibēda
corrobo- intrinsecūs & extrinsecūs, quę lieni robur
rantia. adficere possūt medicamēta: qualia sunt cor-
 tex radices capparis, scolopendrum, hæmio-
 nitis, ammoniacū, scylla, tamarix, absinthiū,
 adianthos, iris, calamintha, & similia, quę ie-
 coris quoque firmitatem & robur cōseruare
 valēt. De quibus omnibus copiosius in cap.
 de Lienis inflāmatione dicemus. Si reliquo-
 rum humorum substantię confluerint, pri-
 mū redundans humor purganti medicamen-
 to vacuandus erit dein reliquo tempore quo
 intemperie relictā corrigere, & lienem etiā
 corroborare possunt, adhibenda.

DE LIENIS INFLAMMATIO-
 NE. CAP. XXVII.

Causa. Lien vt reliquę corporis partes inflāma-
 tione corripitur, quoties sanguis præter natu-
Signa. ram ad eum confluit. Cognoscitur gravita-
 te & tumore sinistri hypochondrii, qui ad ta-
 ctū nō cedit, dolore & distēsiōe loci, febre,
 & estu. Irruentis verò humoris copia, ex ma-
 gnitudine & velocitate generationis ipsi^o in-

flāmationis. Viſtus ratio eorū qui inflāma- Viſtus.
tione lienis laborant: ſimplex ſit: eāque quæ
facile concoquātur, in cibo exhibeantur, ve-
lut ex alica lota, ptifanę ſuccus, panis made-
factus, & eiufmodi. Si verò inflāmatio diu-
tius remoretur, etiam auicularum carnes eis
cōcedendæ, & piſces petroſis aquis degētes.
Bibat eger decoctum cinamomi, aut vinum
aquofum. Curatio ipſa à venæ lienaris, aut Curatio.
eius quæ inter minorem & annularem digi- venæ ſe-
tum eſt, incifione auſpicetur, ſi nihil ſit quod ctio.
eam fieri vetet. venter etiam per clyſterem
aſſiduè eluatur, potiffimum ſi venę inciden-
dæ medela relinquantur. Deinde imponantur
lienī medicamēta adſtringētia, quæ id quod Quæ im-
inſluit, reprimere, & lienis firmitatem cōſer- ponenda
uare poſſunt. Non ſunt verò ſola adſtringen- lienī.
tia adhibenda, ſed admiscenda erunt ea quæ
citra euidentem calorem extenuant, ſecant,
atque relaxāt, ne ſcilicet craſſus in eo ſuccus
obturatus vehemētius increſceſcat, quemad-
modū Galenus lib. 13. Ther. meth. diligenter
monuit. Itaque ſi moderata fuerit inflāmatio Fomētā.
tio lienis, vinum vetus ac auſterū tenuiūm-
que partium oleo dulci permixtum, & lana
ſuccida exceptū imponemus. Si verò maior
ſit caliditas, roſaceum ſit oleum, aut melinū,
& chamæmelinum cum aceto. verbi gratiā,
& olei roſacei, cotoneorum añ § ii. olei cha-
mæmelini § i. aceti optimi § s. miſce. Quod

Cataplasma.

si olea prædicta nō adsint, folia rubi, aut māla cotonea in oleo decoquantur, & quædam etiam tenuium partium addantur, velut est absinthium & pulegium. Cauendum etiam, ne actu frigida lieni imponamus, ea quæ extrinsecus admouentur medicamēta. Post irrigationes ac fomēta ad cataplasmata, in quorum compositionem hordeacea farina, & loliacea, caricæ, & lini semen assumantur. Cæterum cauendum, ne post irrigationes & cataplasmata locus denudetur: sed ubi hæc fuerint sublata, mox emplastrum aut ceratum, qualia in cap. de Iecoris inflammatione descripsimus, imponatur. Siquidem similia genere medicamenta, ambo viscera postulant: tanto autem valētiora lienis sint, quāto crassiore utitur alimento. Quare ex iis quæ de iocinore diximus, ad lienis curationem exempla transsumes: quibus semper ferē acetum, & quippiam quod lieni gratum sit, eiūsque robur peculiariter tueri possit, adicias. verū ubi inflammatio in scirrhum degenerat, nō solum extrinsecus, sed etiam intrinsecus valentioribus medicamentis uti conuenit. Intrinsecus itaque validissimæ potiōes (nam eas sine molestia tolerāt) exhibendæ. Ex quarū numero primas partes sibi vendicant cortices radicum capparis, hēmionitis, myricæ radix atque germina in aceto vel oxymelite cocta. item centaurei minoris succus epotus, &

Curatio
lienis indurati.

lupinorum amarorū decoctum, cū ruta & pi-
 pere assumptū. Anagallidis fœminæ scrupu-
 lus cū posca, aut oxymelite pot^o, mirificè cō-
 fert. Extrinsicū fomentum tale adhibeatur, **Fomentū.**
 quod R^x centaurii minoris, hæmionitidis, ru-
 tæ añ m i. radicis corticis capparis § i. Deco-
 quatur in aceto: & postquā decocta fuerint,
 spongia in decocto irrigata lieni calida im-
 ponatur. vel potest esse huius vnguenti vsus, **vnguen-**
 quod R^x oleorum de capparibus, liliorum li- **tum.**
 borum, irini añ § i. medullæ osiū cruris bu-
 bulini 3 i s. mucositatis radicis althææ, fœni-
 græci, se. lini añ 3 i pinguedinis taxi, gallinæ,
 anserinæ añ 3 ii. corticum radicum capparis,
 tamaricis, costi, centaurii minoris añ 3 i. am-
 moniaci, bdellii, galbani añ 3 s. gūmi prius
 in aceto dissolutis, cum cera quod satis est,
 fiat vnguentum. Emplastra denique & cerata
 multum cōferre solent. Componatur itaque
 tale, vel simile, quod R^x oleorum liliacei, iri **Ceratum**
 ni, de capparibus añ § i. farinæ hordei, fœni-
 græci, seminis lini añ 3 i. corticū radicis cap-
 paris, hæmionitidis añ 3 i s. radicis althææ 3 s.
 bdellii, ammoniaci, galbani añ 3 i s. opopa-
 naxis, myrrhæ, thuris añ 3 s. cum resina tere-
 binthina & cera quod satis est, fiat ceratum.
 Cæterum oportet medicum diligēter ad af-
 fectum respicere, & pro eius ratione tum ad-
 dere, tum adimere aut emollientia, aut atte-
 nuantia & discutiētia, aut quæ robur addūt.

Viſus. Viſus etiã ratio vbi durities perfecta fuerit, attenuatoria ſit. Acrium etiam rerũ comeſtio per interualla, & potus exiguus conuenit. Vinũ ſit non valde vetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum ſepe ignitum extinctum ſit. Conuenientiſſimum enim lieni indurato remedium exiſtit, candens ferrum in aqua, aut vino, aut poſca ſubinde extinctũ. Plurimũ etiam fidurię in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum vti cõuenit, corpore ſuperuacuis non abundante. Maniſeſtum autem eſt, quod vociferationes quoque oportuna, & in tempore aſſumpta, eis ſummẽ opitulantur. Cucurbitula etiam cũ ſcarificatione affigenda.

DE LIENIS OBSTRUCTIONE.

CAP. XXVIII.

Accidit, interdum non ſolum propter attractricis facultatis imbecillitatẽ, verum etiam meatus, per quem atra bilis ſeculentus humor ex iecore ad lienem deriuatur, obſtructionem, vt impurus ac vitioſus humor in totum corpus diſtribuat. Quod vbi contigerit, color corporis vitiatus ad nigredinẽ vergit, & nõnunquã immedicabilia vlcera hoc modo patiẽtes habent. **Cauſa.** Cauſa obſtructionis lienis ex iis quæ in cap. de Iecoris obſtructione dicta ſunt, innotescẽt. **Signa.** Cognoscitur ex grauitate, quę eſt circa dextrũ hypochondriũ, vitiato corporis totius, præſertim verò

faciei, colore spirit⁹ difficultate, & aliis quæ
 ex prædictis suprà innotescunt. Curatur is af **Curatio.**
 fectus vietus ratione extenuatoria, & medi-
 camentis obstructionem tollētibus, de qui-
 bus abunde dictum est in cap. de iecoris ob-
 structione. vtraque enim viscera similib⁹ ge-
 nere medicamentis indigent: lien tamē tāto
 fortioribus indiget, quanto crassiore vtitur
 alimento. Quapropter quatenus ad humo **Præparā**
 rum crassorū vt vacuationi promptius obe- **tio hu-**
 dian præparationē attinet, iisdem certe me- **morum.**
 dicamentis opus erit. hoc dūtaxat obseruato
 vt sint validiora, & commixta habeant quæ
 robur visceri addere queāt. Post præparatio-
 nem vacuandi sunt humores per ea medica-
 menta, quæ crassos & feculētos humores pur-
 gare possunt, de quibus iam sæpe dictū est.
 Posthæc intrinsecūs adhibenda sunt, quæ su-
 præ de Iecoris affectibus, potissimū eius ob- **Purgatio**
 structione cōmemorata sunt. Forinsecūs au-
 tem vnguenta & cerata, quæ in capite præce-
 denti produximus, admouenda erunt.

DE RENIBVS CRVENTAM
 VRINAM EXCERNENTI-
 BVS. CAP. XXIX.

Renum fit nonnunquam passio, in qua
 tenue sanguinis serum mingitur. Accidit au-
 tem propter renum imbecillitatem, vrinam **Causæ.**
 subinde secernere à sanguine nequeuntium.
 Aut propter amplitudinem osculorum, ex

vena cana urinā ad renes excolantium. Quā enim ampliores ac patētiores meat⁹ fuerint, quiddam etiam ex sanguine venæ emittunt, aliāq; item crassa. Sepe renes etiam iuxta circuitus quosdā sanguinē excernūt, simili modo ut ex hæmorrhoidibus in sede fieri cōsuevit. Quidam etiam sanguinē ex renibus excernunt, propter venæ rupturam in renibus factam. veluti contingit iis qui graue onus leuarunt, aut valde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale violētum, ut est exercitium, aut coitus nimius, pertulerunt. Aliquando autem ob acres ex supernis defluentes humores, erosio venarū cōtingit.

Signa.

Cæterum si passio propter renum imbecillitatem contingat, sanguis qui excernitur, ferofus admodū est. Sin ob osculorū amplitudinem, tunc nihil dolitant. Si certis circuitibus excretio fiat, tum vel plenitudo est totius corporis, aut cōsuetorum exercitiorum neglectus, aut membri cuiusdā abscissio præcessit. Si propter venæ rupturam tūc, copiosissimē sanguis excernitur. Si verò ab erosione, tum sensim & paulatim excernitur, do-

Curatio lōrq; renes excruciat. Curabis itaque eam urinę cru cruentę urinę excretionem, quę propter re-
entę ab num debilitatem, aut amplitudinem osculo
imbecilli rum urinas ad renes excolātū accidit, quie-
tate re - te, cibis adstringentibus, portione vini nigri,
num, & aliis quę in cap. de cruēto sputo compre-

hensa sunt. Ab iis autē potissimum quæ vri- aut vaso-
nam cient, & à coitu omnino abstinendum. rum eius
In potu autem, præter ea quæ in cap. iam ci amplitu-
tato dicta sunt, exhibenda symphyti radicis dine.
decoctum, & tragacantha in vino nigro ma-
cerata. Sistit etiam sanguinis ex renibus eru-
ptiones cornu ceruini vsti drachma vna ex vi-
no. Folia item salicis cū vino, lapidis hæma-
tidis drachma vna. Mirificè quoque confert
polygoni decoctum. Bolus denique Arme-
nia drachmæ pondere sumpta. Syrupus ro-
facens. myrrhinus, pastilli de succino, de ter-
ra lemnia, & de spodio nominati. Ouillum
præterea lac vnicè commendatur, si ieiuno §
iiii. quibus drachma vna boli armenia com-
mixta sit, exhibeantur. Forinsecus renibus &
lumbis imponantur ea quæ ad sanguinis per-
sputum reiectionem, & in ca. de Dysenteria,
aliisq; sanguinis eruptionib⁹ descripta sunt,
& quæcunq; vnà cum eo quod adstringūt &
resiccant, etiam robur addere possunt. qua-
lia sunt rubi folia, & quercus, glâdes, itémq;
myrrhi bacca, malicoriū & balauſtia, & si-
milis. Post hæc habitus corporis cibus, lacte,
ac auicularum carnib⁹, suillis etiam macris,
reficiendus est, quò vniuersum corpus ad pri-
stinas vires reducatur, & renes corroborati
propriū munus obeāt, & seorsum humorē à
sanguine secernāt & excolēt. Porro si renes Curatio
secundū circuitum sanguinem excernūt, aut si per cir-

cuit⁹, aut propter rupturā venæ, aut acres ex supernis
 propter defluentes humores: tunc statim vena quę in
 venæ ru- cubito est, secanda erit. his quidem qui per
 rupturā, circuitus sanguinem excernunt, paulò ante
 aut ero- circuitum, reliquis verò statim à principio.
 sionē ac- Cæterum sanguinis detractionē partiri me-
 cidat. lius erit, vt paulatim eis reuulsio & auersio
 fiat. Loci autem circa renes spongiis posca
 imbutis cooperiātur, aut lanis succidis cum
 rosaceo & aceto. Post hæc emplastra, vnguē-
 ta, & cerata locis paulò antè citatis descri-
 pta, imponenda. Commodè etiam cucurbi-
 ta adhibetur, præsertim si suspicio sit inflam-
 mationem adesse in his, qui ob venæ ruptu-
 ram sanguinem mingunt. conueniunt etiam
 potiones suprā, & in cap. de Sputo cruento
 commemoratæ. Ager inter ea etiam à falsis
 & acribus omnibus arcendus. Vbi verò iam
 sanguinis excretio cessauerit, victus ratione
 vtendum est, vnde nō multus sanguis gigna-
 tur, maximè in iis qui per circuitum excre-
 uerunt: & supernæ corporis partes assiduè
 exercendæ. In iis autem qui ob venam ruptā
 sanguinem mingunt, si exulceratio in locis
 relinquatur, ipsam post sanguinis suppressio-
 nem curabimus, per ea quæ in capite de Re-
 num exulceratione dicentur.

DE INFLAMMATIONE RE-
NUM. CAP. XXX.

Causæ. Renes ob plurimas causas inflammatio-

ne corripuntur. Nam & humores corrupti,
 & plagæ, & attritiones, & medicamentorum
 potiones inflammationem procreant, & præ-
 sertim equitationes continuæ & vehemētes.
 Accedit agris dolor pulsabilis retro iuxta pri-
 mam dorsi vertebra, paululum supra spu-
 rias costas. Distendit autem dolor sursum vsq;
 ad iecur, præsertim dextro rene affecto. De-
 orsum verò vsque ad vesicam & pudendum,
 lumbosque & coxendices, perinæ item &
 fœmora. Consequitur etiam stupor propin-
 qui cruris, & neque recta erigi possunt, neq;
 pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue ali-
 qua alia concussio irruat, vehementi dolore
 lancinantur. Frigent eorum extrema, & ma-
 gis suræ ac pedes. Adest urine emittendæ dif-
 ficultas, minguntque assidue ac laboriosè: in
 principio quidem tenuia & aquosa, in quib⁹
 nihil subsidet: inflammatione verò in peius
 proficiente, rubicundiora: deinde etiam cras-
 sa & mucosa: adsuntque febres vehementes.
 Quod si adhuc amplius inflammatio auge-
 scat, hæc omnia fiunt vehementiora. His ac-
 cedit nausea, & stomachi morsus, & vomitus
 bilis. Quidam autem ipsorum vsq; ad animi
 deliquium anguntur & exudant. Sistitur ipsis
 venter adeo ut inflentur, & assidue ructus e-
 mittant. Sequitur fastidium vehemens: & qui-
 busdam continuè fiunt exacerbationes: qui-
 busdam verò per intervalla. In vniuersum au-

- Viſus.** tem ventris egeſtio, & vrina multa excretio dolores ipſos præcedunt. Aegrum in molliſſimo lecto decumbere oportet, ac primo die cibo abſtinere, non tamen in multos dies inedia extendere. Vrina enim acriores per inedia redditæ, vehementiſſimos morſus infligunt. Itaque in principio ſorbtionibus tenuibus morſus leuiter nutrire oportet, vt eſt perſanæ ſuccus, aut hordei alica. Malua etiam inter holera ſummè confert. Potus ſit decoctum cinamomi. Et in ſumma viſus ratio ſit talis, qualis in aliis inflammationibus.
- Curatio.** Inter initia, quod ad curandi rationem attinet, ſanguis ſtatim detrahendus eſt. Secunda autem vena quæ in poplite eſt, ſecundum rectitudinem renis patientis. Poſt venæ ſectionem ad ea quæ extrinſecus admouetur procedendum, cataplaſmata nimirum, fomenta, linimenta, emplaſtra, & ſimilia quæ mediocrem refrigerandi ac leniendi vim obtinent, ex oleis roſaceo, cotoneorū, chamæmelino: farinis hordeacea, fabacea, fœnigraci, & ſimilibus quæ in capitibus de inflammationibus iecoris & lienis dicta ſunt, compoſita. Cauendum hoc tempore, ne ea medicamenta quæ vrinam ciunt, bibenda dentur, Galeno ſic monente lib. 13. The. meth. obledunt enim, mordaces humores inflammatis partibus inducendo. Clyſteribus autem mollibus, potiſſimum ſi venter nihil deiecerit, vtendum: ex maluæ decocto, aut ſeminis li-
- Vrinam
pronocā
tia nō ex
hibenda.
Clyſte.
res.**

ni & fœnigræci, aut succo ptisanæ confectis, cum oleo violaceo, aut chamæmelino. Cate-
rùm copia non multa infundatur, ne repleta
intestina comprimant renes. Quòd si dolor
per ea quæ extrinsecùs imponuntur, non leua-
bitur, cucurbita lumbis ac iliis est adhibenda,
& fissuris impactis plurim^o sanguis est attra-
hendus. deinde iterum spongiarum fotu uten-
dum, & aliis quæ dolorem leuare possunt.
Vbi perfectè iam sedata ac cōsumpta fuerit
inflāmatio (id quod cognoscitur doloris o-
mnimoda remissiōe) tūc etiā per vrinā pro-
uocantia purgandū erit. à cōcoctis enim in-
flammationibus vrinæ prodeunt multæ &
crassæ, & in iis bonum est quod subsidet, atq; Suppura-
adeò morbum prorsus indicant. Porro si per tionis si-
prædicta medicamenta affectus non propel gna.
latur, & neq; dolor, neq; febris, neq; grauitas
horū vñu conquieuerint, vrineque difficultas
ac frequēs stillicidium ægrum molestauerit,
pus hac in parte colligi indicatiū est. Tūc itaq;
quàm celerrimè suppurationem, ac puris eru-
ptionē adiuuare oportet. Quia in re spongiæ
aquā & oleo assiduè imbutæ proderūt, fotus
gratiā admotæ. Eundē etiā vñum cataplasma
præbēt, quæ ex farina hordeacea, fursuri-
bus, ficibus, althæa, & similib^o suprà in ca. de
iecoris inflāmatione dicta sunt, cōstāt. In soliū
quoq; ex emolliētibus herbis, malua, althæa,
chamæmelo, lini semine, fœnogræco, para-

tum descendere summe confert. Quòd si verò perfecta iam suppuratione (id quod cognoscitur , si febres & dolores minores fuerint, grauitatis autem sensus circa renem affectum remāserit)ruptura moretur, in potu exhibenda quę vrinam ducunt: vt est fœniculi, pulegii, origani, & similium decoctum. Hęc enim rumpunt interdum suppurationem, & pus per vrinam expurgant. Quòd si autem vsus illorum nihil contulerit, acrioribus clysteribus alius subluenda erit, velut est alliorū, raphani syluestris, ac radicis cucumeris syluestris decoctum. Oportet verò admiscere oleum, quo infusa lubrica reddantur. Hęc itaque per clysterem infundenda, iubendiq; ægri, quò plurimo tēpore apud se detineant. Consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationem rumpere, vnā cum hoc quòd ventrē emollire solent. Rupturā verò factā, caruncula parua, oblonga, cum vrina excernuntur. Et siquidē vlcera fuerint maligna, humores foetidi, linidi, & mucosi: si verò benigna, pus ipsum album, & æquale, & leue, absq; odore graui, excernitur. Quę verò deinceps sint adhibenda medicamenta, in capite de Renū vlceribus dicemus.

Rupturę
factę in-
dicia.

DE CALCULO RENVM. C. XXXI.

Causę. Renū calculis prouectę ætatis homines frequētiūs quàm pueri apprehēdūtur. Causę autē generationis horū calculorū existūt,

assiduæ cruditates, unde humoris crassi & terrei multitudo cōgregatur, & ardor igneæ ve circa renes caliditas, q̄ humores adassans, eos cogit & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quæ in æreis præsertim balneorum vasis coquuntur.

Accedit agris gravis in renibus dolor, aculei infixi sensum præbens: tumor tamē nusquam foris apparente. spina ægrè flecti potest: crus quod è directo est renis affecti, stupet: adest fastidium, & vomitus. Urina circa obturationis principium pauca, aquosa mingitur. Postea verò perfecta eius suppressio cōtingit, aluūsque nihil excernit: verum cupiditates multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis, propter violentiam calculorum. Urina etiam arenosam subsidentiam habet, potissimum ubi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas ferè notas Hippocrates etiā iis verbis cōplexus est: In renem dolor gravis, quando cibo replentur, inuadit, pituitamque vomit. Quum verò dolores intentiores fuerint, æruginosa, atque tum leuiore quidem sunt. Doloꝛe autem leuatur, quando cibo vacui fuerint. Arenæ rursus subsidet, cruentaque mingunt. Stupor cruris, quod è directo est. Hæc ille. Porro leues & rotundi facile excernuntur: non item, qui alia quacūque forma præditi sunt: maximè tamen oblongi & asperi difficulter excernuntur.

Signa.

6. Epid.

Par. 1.

Aph. 5.

”

”

”

”

- Curatio.** Cæterùm quum lapis in renibus obturatus
vehementissimos dolores intulerit, ne scilicet
sanguinis multitudo ad tésione & dolore af-
fectam particulam procūbat, in corpore ple-
nitudine laborante & robusto, confestim po-
Venæ se- plitis vena, iuxta Hippocratis loco iam cita-
ctio. to consilium, incidenda erit, eius nimirū cru-
ris quod stupet, & è directio renis patiētis est.
- Purgatio.** Qui verò vitioso humore seu cacochymia la-
borāt, iis purgatio redundantis humoris cō-
uenit. neq; omittēda hæc est, nisi aliud quip-
piam id fieri prohibeat. Id quod etiā Hippo-
crates iussit, dū iuuenes elleboro esse purgā-
dos ait. Verūm si venæ sectionem, aut purga-
tionē adhibere minimè licebit, aluū per cly-
steris infusionem eluere oportet. Quod tū
potissimum faciendū erit, vbi multa in intē-
stinis excrementorū copia fuerit. Cauēdum
tamē vnicè erit, ne sint validiores, atq; adeò
ne aliunde humorū copiam ad intestina tra-
hant, ne meatus vrinarii angantur & compri-
mātur: sed sint tales, quæ dūtaxat excremen-
ta in intestinis detenta vacuare possint. vt est
- Clyster.** huiusmodi, qui R^x maluæ, althææ, mercuria-
lis, trichomanes (polytrichū nominant) hel-
xines, hoc est parietarię añ m i. siymbrii, car-
damines, id est nasturtii aquatici m i s. semi-
num oreoselini, apii, fœniculi, lini añ ; iii. ra-
dicis acori veri § i s. furfuris § i. Bulliāt in a-
qua iustæ quantitatis, & colentur. Colaturę §

xi. casie fistularis ꝑ i. hierę picre ꝑ s. mellis ro-
 facei colati ꝑ i s. oleorum anethini, rutacei,
 chamęmelini añ ꝑ i. silis 3 ii. misce, fiat enę-
 ma. Neq; clysteribus assidue, aliis ferę omni-
 bus neglectis remediis (vt facere pleriq; ho-
 die solent) vtendum, sed bis aut ter: sic tamen
 ne vltra consuetum tempus retineantur. Re-
 tenti enim compressionem atq; angustia re-
 num, & meatuum vrinariorum efficiunt, vt
 copiose lib 2. Paradox. cap. 15. diximus. Ex. **Laxantia**
 crementis alui expurgatis, quę laxare mea-
 tus possunt medicamenta adhibenda erūt. In
 quem vsum hoc vnguęto renes & lumbi in-
 ungendi, quod Rꝯ oleorū anethini, amygda-
 larum dulcium añ 3 ii. olei chamęmelini 3 i
 s. adipis gallinacei, anserini añ 3 ii butyri sa-
 lis experti 3 i. cere quod satis est, fiat vnguen-
 tum molle. In fessionibus item vtendū ex de-
 cocto calaminthes, origani, parietarię, sisym-
 brij, cardamines, brassicę, foliorū althęę, mal-
 uę, & similibus. Aut eger in solū tepidū fre-
 quenter demittendus. Fomenta etiā locis ad-
 mota cōmodant ex furfuribus, cum foliis al-
 thęę decoctis. Itē cataplasmata ex farina tri-
 tici, seminibus lini & fęnigręci, lupinorum,
 peucedani radice quā tenuissimę trita, &
 chamęmelo. oportet aut coaceruatim alia su-
 per alia cataplasmata adferre, priusquā pri-
 mū frigescat. Aut si nō libeat, calefactorio a-
 lio extrā cōtegere ne refrigeretur. Id quod cō
 r iiii

Vnguētū

modè fieri potest per facellos, aut alia vapo-
 raria cataplasmati imposita. Hæc interdū ad
 lapidis per vrinę eiectionem sufficiunt. Quod
 Vrinam si verò non contulerint, ea etiam quę vrinam
 mouen- cient, bibēda dabis. Vrinam autem multam
 tia. hęc ducunt, acorū, hypericum, oreoselinum,
 fernē lithospermi, hoc est, milii solis, ammi,
 dauci & fceniculi, asarum, radix bryonię, ru-
 bię tinctorum, cortex capparis, asparagus, &
 Deducen similia. Deducunt autem ad renes, ea quę
 tia ad re- calculos confringūt, peucedini radix, apium
 nes. & radícula. Lapides autē in ipsis renibus cō-
 fringunt & atterunt, sion, adianthum, bdel-
 lium, viticis seu agni semē, rusci radix, saxi-
 fraga, betonica, ciceris insculum, lithosper-
 mon, tecolithos (qui lapis Iudaicus dicitur)
 xanthium, althę semen & radix, & eiusmo-
 di. Horum singula partim decocta, partim
 tenuissimē trita, præbeto bibenda. Porro ea
 quę vrinam cient, ac lapidem frangunt, tunc
 exhibere conuenit, quum vehementes dolo-
 res remittunt: id quod accidit, lapide iā trās-
 moto, & ex sede sua agitato. Quod si obfir-
 mati ac vehementer impacti sint lapides, plu-
 rimus potus vitādus, itemque ea quę vrinam
 ducunt. cum enim secum excrementorū co-
 piam ad renes deducāt, meatus etiam vrina-
 rios plus obstruunt, atque calculi ex renibus
 transitum impediunt. Fomentis autem ac
 cataplasmatibus, & infessionibus membra

vt diximus) relaxāda, & venter per leuia infusa ac infessus euacuandus, ne vrinarii meatus comprimātur. Post hæc autem doloribus Cucurbi aliquantulū lenitis, etiam cucurbitulæ utilitæ. ter ipsis adhibetur, & præsertim pressius affixæ, inflammatione videlicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim trāsmouent sæpè cucurbitæ ipsos lapides, vt repētè dolores supprimant, lapide nimirū in vesicæ amplitudinē transuecto. Quapropter in principio supernè à rene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina attrahendæ obliquè secūdum meatuum vrinariorum situm. Cæterū delati ex renibus in vesicam lapides, & præ magnitudine circa collum vesicæ detēti, sæpè in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumē, tum quod vrinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita vt supini situentur, & longè altiores coxarum vertebrae habeant. Deinde multiformiter eos commouere, quò omnibus machinamentis adhibitis, lapidem ex ipso vesicæ meatu excidere faciamus. Quòd si hac ratione nihil profecerimus, catheter instrumentū proliciendæ vrinæ aptum immittēdum, eoque lapis à collo vesicæ amouēdus, & vrina educenda. Si verò ex vesica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatum ipsius pudēdi obfirmetur, & vulnerando exulcerationis periculum

inducat, aqua calida paulatim ab alto pudē-
dorū partibus donec rubore suffundatur, in-
stillanda aut pudendum in oleum calidum,
quod relaxandi vim obtinet, demittendum.
decoctum etiam quoddā ex iis quæ urinam
ducunt, plurimum exhibendū est, iubendū-
que æger ut multam urinam cōgreget, eam-
que postea emingat, ac diligentius expellat:
ita enim detractus lapis, celeriter excidero cō-
suevit. Quum verò neq; hoc modo cum ex-
trahere possemus, secandum erit pudēdum,
vulnuscule supernè iuxta glandis magnitu-
dinem incusso. Infernè enim secare nō expe-
dit: quādoquidem ferè semper in fistulā pro-
ficit, ac postea per ipsam fissurā urina excer-
nitur. Lapide amoto præservare hominem o-

Præserva- portet, ne rursus renes lapide infestetur. Tuo
tio à lapi- tur autē à calculis ne fiant, cibis boni succi,
de. cōcoctū facilis, & moderatus: dein exercitia
mediocria, rarūq; leguminum omnis gene-
ris, frumentaceorūque vsus, itē casei, lactis,
& quæ ex ipso præparātur obsoniorum, vi-
ni nigri, copiarū carniū, & omnium summa-
tim crassi succi, ac nimis calidorum & acriū.
Aegros etiam admonere oportet, ut à cœna
sepe vomant, & absinthium assiduè bibant,
& per tempus certum venam secēt, si quidem
sanguis abundare videatur: aut convenienti
temperaturæ ipsorum purganti medicamēto
utāur, si vitiosi humores coaceruētur. Opor

tet etiam ipsam aquam per omnē victum purissimam esse, & percolatā. Vinū item tenue, album, urinamque ciens, neque valde vetus. vtantur quoque per interualla medicamētis urinam mouentibus, hōc potissimum, quod multē est efficacē. R̄ radicum fœniculi, asparagi, cœnanthes, id est filipendulæ añ 3 i. radicis rubiæ tinctorū 3 i. radicis aristolochiæ rotūdæ vocatæ, althææ añ 3 i. liquiritiæ rasæ 3 ii. lapidū ex spongiis marinis, recolithi seu iudaici añ 3 i. seminum ammi, dauci, oreoselini, saxifragæ albæ, fœniculi, anisi, lithospermi añ 3 s. seminum melonū, citrulli, excorticorum añ 3 i. s. seminis halicacabi, hoc est alchechengi 3 s. helxines seu parietariæ, malnæ añ 3 i. polii mōtani, adiāchii, pulegi, asari añ 3 s. sanguinis hircini arefacti & præparati 3 i. bdellii, ammoniaci añ 3 s. lapidum seu oculorum cancri, cinamomi selecti, iunci odorati (squinthū nomināt) añ 3 ii. s. ingula redacta in puluerē minutissimū, misceatur. Detur de hoc drachma vna quarto quoque die, aut singulis hebdomadis matutino tēpo re in vino tenui. Alia remedia pete ex cap. de vesicæ calculo.

Puluis ad
calculo-
sos renes.

DE RENVM VLCERIBVS.

CAP. XXXII.

Vlcera renum accidunt propter venarum Causæ. quæ in iis sunt, rupturam. Item suppurationem inflammationis, & acres ac mordaces hu-

- Signa.** mores huc delatos. Deprehenduntur renes exulcerati dolore in lūbis cum grauitate, & sine impedimēto vrina redditur, id quod in vesicæ vlceribus non fit. vrinæ pus mixtū reperitur, carnosus particulis, aut pilis innatātibus, iuxta Hippocraticam sententiā, quæ sic habet: Si sanguinem, aut pus mingant, aut renū aut vesicæ exulcerationē significat. Et statim post hæc. Quibus in vrina crassa existēte carūculæ paruæ, aut veluti capilli vnā exeūt, his à renibus excernuntur. Vitet æger cruditates, & suprā quā cōuenit satietatem. Ne quid crudū in cibo accipiat, & neque quod ægrè cōcoquitur, aut facillè corrumpitur, aut inflationes parit. Maximè tamē vitet quæ facile acescunt. Itē omnia acria & feruentia, & quæcunque bilem gignere possunt, vt est longa sitis, inedia, & immodica condimenta. vitanda etiam omnis delassatio & immodica equitatio, maximè verò quæ fit in equo, vigiliæque & omnem vehementē concitationē, & è conuerso perpetuum otium, & balnearū assiduitatē. Utatur pane recenti decenter apparato. Carnibus volucrum montanarū, hœdis, & similibus carnem teneram habentibus Piscibus saxatilib⁹, squamosis, in craticula assis. Cācer fluuiialis mirificè, sorbitio ex ptisana, amyllum cum lactæ coctum confert. Dandum & lac ouis permixtum, & insculum gallinæ pingue. oua etiam sorbilia per se conue
- 4. Aph.**
78.

niunt. Ex olerib. autē malua, intyba, rumex,
 portulaca, lactuca omnia tamē cocta, neque
 quicquam crudū (vt diximus) voret æger. Ex
 fructibus vua passa non incōmoda est, & nu-
 ces pineæ, & amygdalæ, decorticatę tamē &
 probē mundatę. Multus potus, & meracior
 vitandus. à frigida etiā potu in totum absti-
 nēdum. Frigidum enim, vt ait Hippocrates, 5. Aph.
 vlceribus inimicum. Pro potu vtatur vino di- 20.
 luto, ac parum adstringēte: aut lac caprinum
 aut ouillum, aut amygdalinum bibat. Coit⁹
 nō solū vlceribus, verum etiam omnib. aliis
 renum passionibus infensissimus est, & maxi-
 mē senib. & naturā imbecillioribus. Vrinam
 cientia vitet. Balnei sit rarus vsus. Naturales
 verò aquas experiri non inutile fuerit, alumi-
 nosas videlicet, sulphurulentas, & cōsimiles.
 Frigida lauare cōmodissimum est: supra mo-
 dū enim vlcerationes egrē sanabiles, tum ex-
 ternas tū internas destruit. Cōferēt etiā natu-
 rales aque, post matutinā deambulationē po-
 tatę. Curādi ratio, si ob acres humores acci-
 dant renum vlcera, ab humorum vitiosorū vomitus.
 ac erodentiū purgatione aspicietur. Qui au-
 tem sic afficiuntur, eos vomitu etiam vacuare
 oportet. Non solū verò ad vitiosos humores
 vacuādos cōfert vomitus, verum etiam si quis
 omni mense audacter vomuerit, is renum vl-
 c⁹, & quicquid inde mali accidere potest, dis-
 soluet, quòd humorum motum planē in cō-

Curatio.
vomitus.

trarium auertat. Sunt etiam interea deuoran-
da quę morsus obtundunt, vt malua, intybū,
rumex, portulaca, semina melonū, cucume-
ris, cucurbite: syrupe, violace⁹, rosace⁹, nym-
phææ, & eorundem cōseruæ hodie nomina-
tæ. vacuatis humoribus, aqua malsa bibēda,
aut scēnigræci decoctū cum melle: aut cucu-
meris, aut maluæ, aut melonū semen cum hy-
dromelite. lac etiā cum melle præbēdum, re-
cens multum & calidū. ad vlcera enim pur-
ganda cōducit. Serum item caprinum, deco-
ctum hordei & vuarum passerū, & glycyrrhi-
zæ, quæ mirificè cōfert, perinde atq; eius suc-
cus. Quum verò munda fuerint vlcera (quod
inde tibi palām fiet, si neque tectoriū etiam
vlceri obductū cum vrinis excretū appareat,
neque etiam pus excretum sit feculētum, sed
subalbum, & leue, & æquale, & paucum) tūc
ea quæ resiccant, adstringunt, & glutinātia
medicamenta erunt adhibēda. In quem sanē
vsum datur bolus armenia, gummi arabicū,
tragacantha, amyli, terra Lemnia, & similia.
Præter cætera autem is puluis mirificè cōdu-
cit, qui ʒ terræ Lemniæ, boli armeniæ añ 3 i
s. tragacanthę, spodii, hoc est eboris vsti añ 3
i. amyli, nucum pinearū tostarū añ 3 s. semi-
num lini, cucumeris repurgati, melonū, sin-
gulorum 3 ii. seminis apii ʒ ii. sanguinis dra-
conis 3 i. conterantur singula, & redigātur in
puluerem tenuissimū, de quo dētur quotidie

Glutinā-
tia.
puluis.

ieiuno ægrotanti 3 ii. cū lacte recens mulcto.
Extrinsècūs etiā quæ renes exiccare ac robo-
rare possunt admoueantur emplastra, cerata
& vnguenta ex oleis, rosaceo, myrthino, fari-
na hordei, thure, mastiche, rosis rubeis, & si-
milibus composita, quorum copiam in præ-
cedentibus quibusdam capitibus habes. Plu-
ra etiam ad institutum facientia dicemus in
cap. de vesicæ vlceribus.

DE DIABETE. CAP. XXXIII.

Diabetes diuturna est passio circa renes
consistens, multum potum inducēs, unā cum
hoc quod quicquid bibitur, simul ut & quale
assumptum est, per urinā redditur. Quidam
verò hanc passionem aquā inter cutē ad ma-
tulam, Galeno cap. ultimo libri de Sympto-
matum differētia teste, & urinæ fluorem seu
leuitatem, atque ab inexplibili siti dipsacon
vocant. Origo ipsius ex retentricis renū fa-
cultatis imbecillitate cōtrahitur: attracticis
verò tanto robore, ut totū corpus ob im-
modicum calorem exhauriat. Renū itaq; pro-
pria passio diabetes existit, qua videlicet im-
modicè humorē appetūt, ipsūque propter
debilitatē retentricis in eis facultatis contine-
re nō possunt, sed cum acruatim in vesicam
excernūt. Cōcomitatur egros pertinax sitis, **Signa.**
neque vlla satietas ex alicuius liquoris exhi-
bitione contingit: adeoque assidue potū assu-
mere coguntur, propterea quod citissimè per

Diabetes
quid.

Causa.

yrinam expellatur potatum. viscera ipsis vri
 videtur, vniuersum habitum fragile habent,
 Curatio. & tabes totius corporis accedit. Scopus cura
 tionis in eo consistit, vt humorum acredinem
 deleamus, sanguinemque ac cum eo permix
 tum serosum humorē ad motum tardiozem
 reddamus, & renum intemperie corrigamus.
 Mox itaque vbi coeperit malum, nōdum ad
 perfectionē progressum, optimum est cubiti
 venam secare, & moderatē sanguinem aufer
 re. Vtendum etiam mediocriter vrinam cien
 tibus, quę vitiatum in renes imbibitū humo
 rem repurgare possunt. Quod si verò inuete
 ratum sit malum, neque venę sectio assuma
 tur, neq; quicquam quod vrinā cit, exhibea
 tur. Hęc enim corporis tabē & colliquatio
 nem, quę sponte sua in hoc malo sit, accele
 rant. Concidunt enim in inueteratis vires, &
 & ex venę sectione totū corpus acrius reddi
 tur, & vrinam cientia in ipsis multiplicat ma
 lum. Maximum autē remedium huic passio
 ni, vt statim potatū reuomatur. Sit autē per
 quā frigidus ipse potus: reliquaq; victus ra
 tione cōuenit vti frigidiorē. Cibi itaq; exhi
 beantur boni succi, quīq; difficulter cōmuta
 ri possint, & mordacitate careāt, & qui mor
 dacitatem obtundere valeant, vt sunt oua sor
 bilia, halica ad sorbitionis formam appara
 ta, carnes porcinae macrae coctæ. Neque verò
 incommodē exhibetur eis cascus recens com

Victus.

pactus, salis expers, & lac per silices aut ferrū
 ignitum scissum, seroso humore adēpto. Pro
 forbitione etiā ptisanæ succus frigidus pro-
 batur. Ex oleribus autem intybum, lactuca,
 portulaca. Ex fructibus pyra, poma, mala pu-
 nica. Inter pisces, saxatiles conueniunt. Bibat
 vinum rufum, crassum, aquā ampli⁹ dilutū,
 ad falguginosorum humorū proluōnē, qui
 sitim inducunt. vinum enim corporis tempe-
 raturam ad dulcorem permutat. Conuenit
 etiam in potu exhibere succum malorū gra-
 natorū, rob de ribes, aut oxyacantha, & simi-
 lia. Quod ad medicamenta ipsa attinet, po-
 lygoni seu sanguinariæ succus rectē ipsis ex
 vino nigro propinatur. Symphytū item, pal-
 mularūmq; & baccarum myrthi, pyrorūm-
 que decoctū: Sirupi, rosaceus, myrthin⁹, &
 similes. Pastilli quoque de spodio hodie no-
 minati, ex succo polygoni, aut vino nigro
 præbendi. Extrinsecus hypochondriis, lum-
 bis, & pectini illitiones, cataplasmata & cera-
 ta refrigerantia adhienda, qualia sunt quæ
 ex aceto rosaceo, polēta, lactuca, lēticula pa-
 lustris, parietaria, foliis vitis, portulaca, & si-
 milibus apparatur. In hūc vsum proderit in-
 unctio ex oleis rosaceo & myrthino, aut illi-
 tio ex succo solani, aut pāpinorū vitis facta.
 Farina etiā hordei, aceto & rosaceo subacta,
 cataplasmatibus modo hypochondriis im-
 pōnda. Aut vtendū hoc emplastro, quod R̄x fa strum.

rinæ hordeaceæ § s. pampinorū vitis, extre-
mitatum salicum, bursæ pastoriæ añ p. i. cor-
ticū granatorū 3 iis. portulacæ m i. seminum
cotoneorū 3 i. rosarū rub. m i s. Bulliāt singu-
la in aqua, donec ad mellis crassitudinē per-
ueniant: deinde addātur olei rosacei § ii. olei
myrthini § i. & denuo bulliant, & fiat empla-
strum. Ex prædictis potest fieri ceratū, adie-
ctis hypocistide, acatia, bolo armenia, resina
Sudores & cera. Cæterum sudores quoque excitandi
vt excitā erunt, vt nimirum vitiosi humores ad exuda-
di. tionem vertantur. Optima verò est in dolio
facta ex herbis aut aliis rebus calidis euapo-
ratio ad sudandum, eo modo vt caput extra
dolum promineat. vel vas aqua calida ple-
num pedibus ægrotātis in lectulo decumbē-
tis admoueat, & sudor eliciatur.

DE VESICAE CALCULO.

CAP. XXXIIII.

Pueri la- Generantur in vesica lapides pueris fre-
pide vesi quētius q̄ ætate prouectis. voraces enim sunt
cē magis pueri, & perpetui motus, & cibis vtcūq; obla-
laborāt. tis & nocius vtuntur, & neq; horā cibum ca-
piēdi seruāt ordinatā: quinetiam priusquam
prior assumptus cibus concoquatur, aliū in-
gerunt: & quum vehemētius à cibo mouean-
tur, crudus & incoctus in venas cibus distri-
buitur. Mollia autē sunt ipsorum corpora, &
quæ facilē cedāt, eiūsq; rei gratiā obturatio-
nem circa renes nō perferunt. Quum autē
Causæ.

crassissima lotia in vesicæ amplitudinē perfe-
rantur, ibidem velut fex & limus aquæ subfi-
stūt, ac postea ex loci caliditate desiccata la-
pidescūt. Cæterum aquæ impuræ, & multo li-
mo refertæ, itēmq; duriores & vehemēter fri-
gidæ, lapidū generationē adiuuāt. Pruriūt Sina.
laborantes crebrò & contrectāt pudenda in-
tenduntq; & cōtinuò ad mingendū vrgētur,
ac stillicidio vrinæ vexātur. Curatio huius Curatio.
mali eadē ferè est, quæ renū, cū calculo af-
ficiuntur. in hoc tamē diuersa, quòd validio-
ra medicamenta exigāt vesicæ calculi: & q̃
vesicæ adhibenda sunt, quæ tū renibus admo-
uebantur. Lapides autem in vesica oborti, iis Medica-
potissimum medicamentis atteruntur: semi- mēta la-
ne fœniculi, smyrnii, granis pæoniæ nigris, pides at-
radice fœniculi, artemisia, chamæmelo, al- terentia.
thææ radice & semine, sio quod circa aquas
nascitur, adiantho, rumicis radice, lapidibus
spongiarum, tecolitho, lithospermo, lapide
qui ab ægris lotium eiectus est trito & pota-
ro, semine xanthii, cortice capparis, abrota-
ni semine, hyacinthi, & similibus, quæ ī cap.
de calculo renum sunt commemorata. His
accedit laudatissimum remedium, passer tro-
glodytes, qui minimus passerculus est, iuxta
sepēs & muros victū quæritans, vt Paulus &
Aëtius tradūt, caudam semper subrectā, & al-
bo colore retro interpunctam habens, & iux-
ta summum alæ lineamētum cinerei coloris.

Hic, inquam, totus sale cōditus, & crudus in cibo acceptus, morbū perfectē sanat. Calculos enim iam creatos per urinam expellit, in posterumque generari prohibet. Sanguis denique hircinus ad calculos cū renū, tum vesicæ præsens remediū est. Nam præexistētes soluit, atque ita per lotiū excernit, ut etiā alii ampliū nō gignantur: præterea & dolorem sedat. Quomodo autem is sanguis colligendus sit, docet Aëtius libro vndecimo capite duodecimo. Porro si vesicæ lapides per lotium excerni nō queāt, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionē inducāt, egrum supinū decumbere oportet, ita ut coxarū partes magis sursum vergāt, indeq; huc atq; illuc multiformiter cōmouere, quò ex meatu excider lapis: post verò ita adhuc supinū & positū sursum vergentē mingere iubere. Sin verò neq; sic excernere possit, per catheterē instrumentum urinā proleſtare. Deinde ea quæ lapidē in vesica atterere valent, medicamēta adhibēda. Quòd si neq; per hęc curatio procedat, ad sectionē transeundū erit. Post exactum lapidem victus ratio constituenda est, ne eos renasci contingat, quam in capite de calculo renū memorauimus.

DE SANGVINIS EX VESICAE
ERUPTIONE, ET GRVMIS
EIVSDEM CAP. XXXV.

Rumpitur interdū vena in vesica: & par.

tim quidem sanguinē foras mittit, partim ve
 rò intus condensatur. Sanguine autē conden Signa.
 sato, & grumis coactis, eger animo linquitur
 & pallefcit: pulsusq; paruos, obscuros, & den
 sos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac
 viribus destituitur. Quū verò grumus aliquā
 do in vrinarum meatum inciderit, is etiam
 vrinæ excretionē supprimit. Porro sangui- curatio
 nis eruptionis celerrimè auxiliū ferre oport- eruptio-
 tet. Quapropter si nihil prohibeat, venā in nis san-
 cubito secare, partita sanguinis detractiōe guinis.
 cōuenit, vt hac ratione sæpe & paulatim san-
 guis detractus reuclatur. Aegri verò in decū
 bendo sursum versus collocentur, & coxendi-
 cibus ipsorum leuandis & simul refrigeran-
 dis spongiæ posca imbutæ subdantur. Extre-
 mæ etiam partes constringendæ, & pectē ex
 spongiis posca imbutis irrigandus. Vrgente
 malo, summè profunt cucurbitulę iliis ac lū-
 bis affixæ. Utendum post irrigationes cata-
 plasmatis ex polygono, rubo, plantagine, ba-
 laustiis. Itē cerata ex hypocistide, acatia, bo-
 lo armenia, & similibus, in capitibus de San-
 guinis sputo, & Dysenteria commemoratis.
 Vesicæ etiam infundendus polygoni, plāta-
 ginis aut millefolii succus, adiectis acatia, bo-
 lo armenia, pastillis de spodio, & similibus.
 Infessus etiam ex consimili materia constru-
 cti conueniunt. Dāda quoque in potu medi-
 camēta eductiōi sanguinis apta, vt sunt pēo-
 f iii

niæ grana rubra duodecim tenuissimè trita,
 terra Lemnia, hippuris, centaurii magni (rha-
 pōticum hodie vocant) radix, thuris cortex,
 & similia. Porrò quibus sanguis in vesica in
 Grumos & similia. Porro quibus sanguis in
 sangui- grumos cogitur, primùm tētandū est, vt per
 ni dissol- medicamēta cōuenientia diffundatur ac dif-
 uentia. soluatur. In potu itaque prēbenda est artemi-
 sia, elichrysum (sticada citrinam nominant)
 absinthium, abrotanum, ramēta vitis, rapha-
 ni semē, leporis coagulum aut hœdi, vnum-
 quodq; cum oxymelite. oxymeli etiam per
 se exhibitum, mirificè prodest. grumos enim
 dissoluit, vt paulatim subinde per vrinā pro-
 deāt. Extrinsecūs etiam balnea, vnguenta, ir-
 rigationes, & alia quę relaxādi vim obtinēt,
 adhibēda: quę sanè singula ex capite de Re-
 ceratum. num calculo petenda sunt. Præter alia verò
 hoc ceratum confert, quod R̄ oleorum lilio-
 rum alborū, chamæmelini añ § i s. calamin-
 thæ, cumini, foliorum sambuci añ 3 iii. bitu-
 minis iudaici, ammoniaci añ 3 ii. coaguli le-
 poris 3 iii. abrotani, farinae seminis fœnigræ
 ci añ § s. ambari subalbidi (sperma cœti vo-
 cāt) § i. cū resina & cera quod satis est, fiat ce-
 ratū, quod pectini imponatur. Quòd si hoc
 modo nihil proficias, sed vrina supprimatur
 necessitatē inducet catheteris adhibēdi. Per
 quem vbi vrinas eduxerim⁹, rursus prēdicta
 in potu exhibenda, ac extrinsecūs admouen-
 da quę ad grumorum dissolutionem condu-

cunt. Si verò neque sic grumi dissoluātur, ad sectionē haud secūs quā in vesica calculo laborante veniendum.

DE INFLAMMATIONE VESICAE. CAP. XXXVI.

Morborū qui circa vesicam oboriuntur, grauissimus & maximè mortalis inflammatio existit. Cōsequuntur ægros hæc signa. *Signa.*
 Febri acuta infestantur, & vigilāt, & delirantes aliena loquuntur, & vomūt biliosa pura, & urinam reddere non possunt. Durus fit pectus & pubes cum vehementi dolore & egerendi appetētia, veluti in tenesmo fieri solet. Quod verò egeritur, tenue est, & subsidentiam nō habet. Aliquando & inflationes sequuntur, & aluus adstricta est, intestino recto ab inflammatione vesicæ cōpresso. His itaque si nihil aliud prohibeat, sanguis citra cūctationē ex poplitis vena detrahendus. *curatio.*
 Viētus quoque ratio, quæ in aliis inflammationibus ac febribus conuenit, adhibenda. *viētus.*
 Extrinsecus iis vtendum, quibus leniendi potestas inest. oleo itaq; vesicæ regio, in quo anctum, semen lini, aliquando etiam ruta & althæa incocta sint, irrigāda. Neque enim frigida & reprimētia medicamenta sunt adhibenda. Primum quidem, quòd vesica nervosa admodum sit. Frigidū enim, vt Hippocrates *Quæ extrinsecus adhibenda.*
 ait, inimicum neruis. Dein, q̄ frigida occludant ac stringāt, atq; ad cō urinae suppressio- *5. Aph. 18.*
 f. iiii

nē, quæ hoc malū sua spōte sequitur augeāt.
 & quòd ne humores inflammationē efficien-
 tes discutiantur aut maturentur, prohibeāt.
 calida igitur mediocriter admouēda potiūs,
 quæ quidem dolorem leuant, vrinæ fistulam
 & meatū laxāt, atque inflammationē ipsam
 clysteres. discutunt. Clysterib. etiam lenibus aluus
 subluatur, & post stercorū educationē, oleum
 anethinū in intestinum leniendi doloris gra-
 tiā iniciatur. Prestat autem & papaueris ca-
 licem simul cum oleo incoquere, & adipem
 anserinum aut gallinaceum recētem in ipso
 oleo eliquatum simul infundere. In vehemē-
 tioribus doloribus cum oleo anethino 3 i pi-
 lularū de cynoglossa infundere oportet: aut
 Glans. opium cum myrrha & croco lanæ illitum in
 podicem indere. In decoctum itē seminis li-
 ni, fœnigræci, radicis althææ, seminis dauci,
 & similiū, infideat æger: admoueatúrque, quò
 in aqua decocti desidēs mingat. vesica enim
 non satis robusta est ad amplectendā & ex-
 pellendam vrinā. igitur ipsum ægrū aut ali-
 quē ex adstantibus scitè ac placidè pectinē
 premere oportet: neq; id ultra modū, ne do-
 lor inde intēdatur. Cæterū post clysteres
 & infusus, fomentis etiā per aquam calidam
 & oleū in vesicis semiplenis admotis vtendū
 aut sacculis, quemadmodū in capite de Pleu-
 ritide ostensum est. Quòd si neq; sic malum
 cesset, cucurbita vnà cum scarificatione locis

affigēda. Porro abstinendum ab iis erit, quę
 vrinam vehemēter citant, ac potio multa vi-
 tanda, vbi euident declinatio apparuerit, ad
 ea quibus discutiendi & emolliēdi vis inest,
 de quibus suprà sæpe dictū est, transeūdum.
 Chateteris immissione ad inflamatam ve-
 sicam non temerē vtendum, nisi vrinę sup-
 pressę periculum admodum vrgeat. tū enim
 necessariō ad eius vsum confugiendum: non
 sanē quod mali molestiam tollat, sed vt vrge-
 tem vrinę suppressionem corrigat, & à pre-
 cipiti periculo liberet. Post vrinę prolecta-
 tionē, rursus ad eadem auxilia quę mitigant
 dolorem veniendum, vsque quō inflamma-
 tio soluatur aut suppuretur. Solet autē sæpe
 repente inflammatio solui, erysipelate iuxta
 cutis superficiem oborto, & permanēte, ne-
 que rursus intrō recurrente. Imō & vrina mul-
 ta eiecta, sæpe iudicatum est malum. Quod
 si hæc appareant, nihilominus tamē iisdem
 remediis insistere oportet.

DE STILLICIDIO VRINAE.

CAP. XXXVII.

Strāguria græce, stillicidium vrinę lati-
 nē dicitur: & est, quum paulatim & guttatim *σπαρρυ-
 ρία*
 vrina destillat, ac assiduam ad mingendū ir-
 ritationem facit. Hæc fit, aut ob acrimoniā,
 vel (vt hodie loquuntur) ardorem vrinę, aut
 ob exulcerationem vesicæ. Acrimoniam ef- *causa.*
 se causam iudicabis, si vrinę biliosiores sint, *Signa.*

totiusq; corporis habitus, vel etiā reliqua si-
 gna bilem testantur, & mordacitas circa vesi-
 cam contingat. Vesicæ autē exulcerationem
 ex iis quæ suo dicētur loco, deprehendes. Si
 curatio . itaq; ob acrimoniā vrine stillicidiū accidat,
 tum sanè exuperantem vitiosum humorem
 q̄ celerrimè purgare oportet. In quem vsum
 præterea quæ iam sæpe dicta sunt, mirificè
 confert serum lactis caprini cum casia fistu-
 lari. Cibis etiam contemperantibus, & acri-
 moniam obtundentibus vtendum: vt est pti
 sanæ cremor, malua, portulaca, viola, & hu-
 iusmodi. Ab omnibus etiam acribus & salis
 abstinēdū, vino, exercitiis, ira, & tarda come-
 stione. hæc enim omnia bilem in corpore a-
 ceruāt. Piscibus vtendum saxatilibus, & bal-
 neo aquæ dulcis, quod mirificè humores vi-
 tiosos cōtemperare potest. In potu plurima
 aqua calida dulcis exhibēda, aut hordei de-
 coctum cum syrupis violaceo & rosaceo. vi-
 num non præbendū, nisi dulcius, & dilutum.
 optimū est & ipsum lac calidum potatum. In
 summa, quod ad victus rationē attinet, vten-
 dū cibis humectantibus ac aluum emollien-
 tibus iusculis. ceterū æger assiduè ad mictio-
 nem cogēdus. Si enim acre recrementū diu-
 tius in vesica moretur, partes ipsas corrodit,
 & exulcerat. Quinetiā ad obtundendā humo-
 Eo legma rū acrimoniā subsequens medicamentū por-
 rigendū, quod R̄x cōseruē violacæ § iii. ma-

luæ 3 ii. seminū melonū, cucumeris, cucurbi-
tę, excorticatorum añ 3 i. gummi arabici no-
minati 3 ii. cū syrupo de liquiritia, fiat ecleg-
ma. In hunc etiam vsum præbendum deco-
ctū dulcis radicis, aut iste puluis, qui R^x semi
nis melonis excorticati, citrulli, cucumeris Puluis.
añ 3 iii. seminum cucurbite, portulacę, lactu-
cæ, añ 3 ii. rosarū rub. 3 i. succi dulcis radicis,
glandiū añ 3 i s. Terātur singula, & fiat pul-
uis subtilissimus. de quo 3 i s. quotidie mane
in syrupo de dulci radice, aut zulapio viola-
ceo, aut rosaceo dentur. Supra modū etiam
cōducit terebinthina resina, lota in aqua stil-
laticia rosarum, aut intybi, nucis ponticę ma-
gnitudine, aliquādo duarū triūmve accepta.
hæc enim Galeno lib. 5. de Tuend. val. teste,
nō solum aluum citra noxam solvere, atque
adeo acres humores à meatibus vrinariis a-
uertere potest, verū etiam viscera, renes potis-
simum abstergere. Et fuerunt, qui solo huius clysteres
vfu curati sunt. clysteres etiā nō parū prodes-
se cōstat ex decocto maluæ, violarū, althęę,
foliorum salicis, nymphęæ, & aliis suprā cō-
memoratis apparati, adiecta casia fistulari,
saccharo & oleo violaceo. Quod si verò acri-
monia adhuc augeatur, etiā per penē lac ip-
sum cū amylo in vesicā iniiciendum. In cum
etiā vsum decoctum papaueris albi inūcere
oportet. Extrinsecus pubes oleis violacæo,
nymphęæ, cū modico caphuræ inungēdus.

Si autem stillicidium vrinae ob vesicae exulcerationem accidat, curatio ex proprio capite petenda erit.

DE DIFFICULTATE VRINAE.

CAP. XXXVIII.

ὀνυρία. Dysuria Graecis difficultas vrinae Latinis appellatur. Est malum, in quo vrina aegre & difficulter excernitur. Fit ob vesicae imbecillitatem, atque adeo frigidam eiusdem intemperiem, quae actionem illius laedit. Causa facile ex victus ratione praecedente, & ex aegri sermonibusprehenditur: vrina item alba, & aliis quae frigidam intemperiem ostendere iam saepe diximus. Curatio per ea quae calefaciunt, fieri solet. Perctinem itaque oleis calidis, rutaceo nimirum, anethino, liliaceo, scorpionum, & de castoreo fouere oportet. Admonenda etiam fomenta, & sacculi ex chamemelo, abrotano, betonica, artemisia, ruta, calamintha, sabina, & similibus herbis confecti. Aegrum etiam oportet in praedictarum herbarum decoctum desidere, ac inuenter contegere ac calefacere. Interdum etiam proderit per sedem earundem herbarum decoctum, adiectis oleis calidis infundere. cibis praeterea utendum calefacientibus, & vrinam ducentibus: velut est pastinaca probe cocta, feniculum, apium, asparagus, hipposelinum, & quicunque eius generis existunt. vrinam etiam commode cient cancri, & herinacei terreni. car-

nem enim illorum exiccare oportet, & drachmæ pondus in potu accipere. Aromatum denique decocta in potu exhibenda, aut eorundem confectiones dandæ. Præter alias verò summè conferunt, cōfectio diacalaminthæ, dialaccæ, & diacurcumæ. Theriaca etiā in potu data, mirificè confert. Multa alia in hunc vsum facientia ex superioribus capitibus petenda erunt.

DE SUPPRESSIONE VRINAE.

CAP. XXXIX.

Ischuria, hoc est vrinæ suppressio, malum *ισχουρία*
 est, in quo ægris in totum vrina suppressitur & cohibetur. Hæc aliquādo accidit ob im causa.
 becillitatem, vesicā ea quæ in ipsa continetur, arctè completi ac exprimere nō potente. Interdum autē eius cervicis meatu à crassis humoribus, aut lapide obturato. Quādoque verò propter inflammationem, aut scirrhum, aut alium quempīā tumorem meatū angustum reddentē, & perfectè obturatē. Interdum etiam ob carunculam, aut callum in meatu natū. Sanguis etiam in grumos cōcret⁹ in vesica, suppressæ vrinæ causa existit. Pus itē crassum per ipsam vesicam à renibus aut iocinore, aut alia quapiām superiore parte excretum, vrinæ supressionem efficit. Accidit & sanis sæpe vrinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis

Signa.

si diutius continuerint mictionē. afficitur enim in iis comprehensua & vrinam obuoluens vesicæ vis, ex immodica videlicet repletionē & tensione. Imò quantum amplitudo ipsius vesicæ expleta circūtenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Si propter imbecillitatem fit, ex iis quæ frigidam intemperie monstrant deprehenditur. Si à crassis humoribus, ex victus ratione quæ præcessit. in ocio enī educatus, multis cibis crassos viscososque humores generare potētibus vsus est. Si à lapide, eius notæ, quæ suprā dictæ sunt, præcesserunt. Si ab inflammatione aut alio tumore, dolore, febre, ac visu facile dignoscitur. Quòd si ob carunculam aliquam aut callum suppressio vrinæ orta fuerit, ex præcedētibus vlceris notis, & ex eo quòd tractato cathetere vrina vacuatur, intelligere possumus. Immissus etiam catheter in ea parte vbi antea vlcus esse coniiciebatur, dolorem mouet. fracta sub cathetere carne, sequuntur cū vrinæ excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si grumi obturationem fecerint, sanguinis præcedit excretio & effluxus. vbi verò pus obstruxit, ex præcedentium notitia sciri licebit. Nam vel vesica vel renes antea malo aliquo laborauerunt, aut in parte aliqua renibus superiore præcessit abscessus: quo rupto, pus in renes, & subinde in vesicam transumptum est. Reliqua causa de sermonibus

ægrotātis cognoscetur. Curādi ratio iuxta Curatio.
 causarum diuersitatem alia atque alia erit. Si
 enim propter imbecillitatem & ægrum ve. Si pro-
 ficæ sensum, vrinæ suppressio contigit, irri- pter im-
 tando submouere, ac excitare eius actionem becillita-
 oportet, & per infusus, fomenta, & alia quæ tem.
 in cap. de Difficultate vrinæ dicta sunt, auxi
 liari. vitanda tamen sunt ea quæ vrinam du-
 cunt, ne scilicet multitudine eius vesica distē
 datur. AEger prætereā sic figurandus, vt de-
 cliuis sit ceruicis vesicæ positus, ac subinde
 manibus supra pubē admotis, vrina sensim,
 comprimendo tumorem, expellenda. Nitro
 etiā, aut pediculo viuo, aut alio quod excre-
 toriam actionē vesicæ irritare potest admo-
 to, citius vrina procedet. Si verò à crassis hu-
 moribus vrinæ retentio oriatur, fomētis, in- Si ob cras-
 fessionibus ac cataplasmatibus ex herbis cali- sos hu-
 dis compositis inchoāda. Hæc enim crassos mores.
 humores dissoluere, ac incidere possunt. Pre-
 terea quæ in cap. de Difficultate vrinæ com-
 memorata sunt, valet hoc vnguentū quod R^x
 oleorum scorpionis, nardini, liliacei añ 3 iiii.
 sagapeni, bdellii, opopanacis añ 3 ii. pingue
 dinis anseris, anatis añ 3 s. radicis helenii, pu
 legii, calaminthæ añ 3 ii. gummi dissoluatur
 in vino, & cum cera quod satis est, fiat vnguē
 tum. vesicę etiā iniiciendū oleum scorpionū,
 aut liliaceū, aut aliud quod crassos humores Si ob in-
 dissoluere potest. Quòd si verò propter inflā flamma-

tionem, aut aliū tumorem vrina suppri-
 matur, curatio ex propriis capitib⁹ petēda.
 tumorē. Itidem faciendū, si à lapide aut grumis vri-
 Si ob la- na suppressa fuerit. Lapis siquidē ex loco ex-
 pid ē aut cutiendus & dimouendus, quemadmodum
 sangui- cap. 34. est prædictum. Sanguinis verò gru-
 nis gru- mi dissoluēdi, eo modo sicut cap. 35. dictum
 mos. est. Quòd si ob carunculam aut callum sup-
 Si ob ca- pressa fuerit vrina, balnea & alia remedia re-
 runculam laxantia, ac vrinariam fistulā dilatantia sunt
 aut callū. adhibenda, de quibus in cap. de calculo re-
 Si ob ne- num abunde diximus. In sanis autem quum
 gotiorū ob negotiorum importunitatem vrina diu-
 importu- tius retēta vesicam debilem reddat, auxiliari
 nitatem. oportet ipsi, manibus supra pubem admotis
 ac vrinā sensim expressa: veluti in curatione
 suppressionis vrinæ ex imbecillitate vesicæ
 factæ, fusiùs ostensum est.

DE VLCERIBVS VESICAE, ET
 EIVS CERVICIS. CAP. XL.

causæ. Exulceratur vesica aut propter abscessū,
 aut ob tuberculum quod præcessit, aut ex ru-
 ptura, aut ob fluxionis erosione, aut aliam
 Signa. similem causam. Aegros dolor acutus vesi-
 cæ omni quidem tempore comitatur, maxi-
 mē verò tempore mictionis, & excretionis
 puris. Et siquidem sordida fuerint vlcera, fe-
 culēta simul excernuntur, & mucosa, & quæ
 crassam subsidentiam ad modum farinæ ha-
 bent. Aliquando autem pelliculæ tenues ad

modum foliorum & lanarum cum vrina ex-
cernuntur. Si verò serpendo depascent vlce-
ra, subcruenta excernuntur, & saniosa, ac fœ-
tentia. Ad hæc accedunt difficultas emittēde
vrinæ, & pudēdi arrectio, ac petulantia. Do-
lor autem non solum cūm vrinæ meatus fue-
rit exulceratus, sed & quum in profundo ex-
ulceratio consistit. Cognoscetur autem num
in profundo, siue iuxta vrinæ fistulam sit ex-
ulceratio, ex eo, quòd si in amplitudine vesi-
cæ fuerit, dolor circa pubem consequatur. Si
verò iuxta ceruicem vesicæ vlcera existant,
tempore mictionis tantum, & maximè vbi
mingere inceperint ac cessauerint, dolor sen-
titur: atq; id amplius contingit, si vrinæ sint
acriores. Insanabilia verò, aut saltem curatu
difficillima sunt vesicæ vlcera: tum quia ipsa
neruosa est: tū etiam quia vlcera eius vrina,
quæ acris est natura, assiduè contingit, ero-
ditque, nec vt glutinentur, permittit. Verū
quū sæpe etiam præter expectationē quædā
eueniant, cura aggredienda est, per quam si
nihil aliud, certè accessorii dolores minuen-
tur. Primum igitur persuadendū est ægro vt
decumbat, & in lecto quietem toleret: idque
maximè, si febres simul adsint. Deinde reme-
dia febribus intermittentibus adhibēda. Ma-
ximū verò hic fuerit lactis potus, neq; post
vllum aliud remediū secundo loco id habē-
dum. nam & asperitates lenit, & vlcerationes

Insanabi-
lia, aut
saltē dif-
ficillima
curatu
cur vesi-
cæ vlce-
ra.
curatio.

Lactis
potus.

eluit, malumque abstergit. Reliqua verò virtus ratio talis sit, qualis ea est quæ in renum exulceratione adhibetur. Per medicamenta etiam ægrum cōsolari oportet, quæ pubi imponuntur. Etsi quidem cum inflammatione exulceratio cōsistat, cataplasmata ex lini semine & fœnogreco, aliâq; quæ suprà in cap. de vesicæ inflammatione dicta sunt, apta erūt. Porro si exulceratio pascendo serpat, subadstringētia extrinsecus apponēda sunt: atque hæc quidē calida, vt ob calorem quidē partes circūdolitantes leniendo iuuent, ob potestatem autem ipsorū vicinos locos depascere prohibeant. Utendum etiā iis quæ per catheterem infunduntur medicamentis. Infundendum itaq; inflammatis locis lac recens mulctum, aut rosaceum optimū tepesactū. Si verò nihil horū adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, mordacitatis tēpore instante. Per sedem quoq; ptisanæ succus, aut decoctum ex semine lini, cucumeris decorticati, fœnigræci, malua, aut lac cū rosaceo infundendum. Frequenter autem & in aquam calidam desideat æger, & indecocta relaxantia: nam hæc dolores mītigant. Atqui vbi vlcera iam pascendo serpunt, per catheterē in vesicam iniiciēda sunt, quæ depastionem sistere possunt. vt sunt acacia, hypocistis, alumen, malicoriū, gallæ, terra lemnia, bolus armenia, & similia. Quòd si verò sordida sint

vlcera, medicamēta infundēda sunt, quæ re-
 purgandi & abstergendi facultatē obtinent:
 velut est mulsa dilutissima, vel lac cum pau-
 lulo mellis, vel cū cucumeris semine decorti-
 cato. Si verò acrimonia consequatur & mor-
 dacitas, lac recēns mulctū cum optimo amy
 lo infundatur, aut Pompolyx, hoc est thu-
 ria, pluribus aquis elota & exiccata, atq; de-
 inde cum lacte diluta. Quū verò repurgata
 fuerint vlcera, adiuuare oportet quō ad cic-
 tricē perducātur, atq; id per inessus adstrin-
 gentes, & eiusdē facultatis emplastra, fomen-
 ta, & irrigationes. Cæterū si ad multum tem-
 pus exulceratio duret, tūc sanè & exacerba-
 tiones & interualla siue remissiones agros
 apprehendunt. Quapropter in exacerbatio-
 nibus quidem cataplasmata, fomenta, & irri-
 gationes, leniēdi vim habentia adhibeātur.
 Remissionis verò tempore iis quæ malū de-
 struere possunt, vtendum. Pectini itaq; rube-
 faciētia ac sinapi fini imponātur, ac victus ra-
 tione viribus reparandis apta vtendū. Quōd
 si nō mansuescat malum, crustas circa pubē
 infligere oportet, aut per medicamenta aut
 per ferrum, sinerēque vt per multū tempus
 vlcera se per effluxionem repurgēt. Nō ine-
 ptē verò medicamenta dolorem leuantia in
 potu exhibueris, si vehementes instēt dolo-
 res. In hūc sanè vsum cōueniūt pastilli de ha-
 licacabo, seu trochisci de alchichengi hodie

LEONHARTI FVCHSII

nominati, cum opio. In vesicam quoq; iniicienda, quæ dolores mitigare possunt.

DE HIS QUI RE VENEREA
VTI NON POSSVNT.

CAP. XLI.

viſtus.

vnguētū.

Simpli-
cia me-

Qui mariti existunt, at re venera uti cupiūt & debēt, ignaua autē & impotentia mēbra ob frigidā eorundem intēperie aut aliud malum habent, infernas partes exerceant, & cibis vtantur calefacientibus & bonum succum generantibus carnibus gallinarū, caponū, perdicum, phasianorum, iuuenū colūbarū, auicularū montanarū, passerum potiss. testiculis gallorū, & similibus. Edulia verò nō solū bene nutriētia, sed etiā flatuosa ipsiſ cōueniunt: veluti cicer, fabę, alica, bulbi, porri, pastinacę radix & semen, nuces pineę, amygdalę dulces, & similia. oua itē perdiciſ ad coitū excitant. Dormiant in mollibus lectis, legāntq; quę ad coitum cohortātur, lectiōnibus itē assideāt. Naturalia continuē ex oleis, vnguētis, aliisq; calefacientibus medicamētis confricent. In quē vsum hoc vnguētū vti licebit, quod ℞ oleorū liliorū alborū ℥ i s. de castoreo ℥ s. piperis, nigellę, pyrethri añ ʒ i. myrrhę ʒ s. euphorbi gr. iiii. cerę quod satis est, fiat vnguētū. Medicamētis etiā quę seminis multitudinē augere, & calefacere possunt, vtātur: qualia inter simplicia sunt cruce, sinapi, nasturtiū hortense, semen rapi,

vrticæ, ari radix, piper, satyriū, horminū, ani- dicamen
 sum, scylla, orchis: cuius quidem maior bul- ta coitū
 bus cū lacte potatus, tentiginē cit: minor ve- concitan
 rō cū aqua potatus, tentiginem remittit. Te- tia.
 ftes vulpis sicci triti bibiti, innocuā & mini-
 mē vanam membri tentiginem faciunt. Par-
 tes etiam scinci renes amplectentes, ad tenti-
 ginem pudendorum excidendam bibūtur.
 Pudendum cerui aridum vrito, & 3 i cū vino
 meraciore præbe. Inter composita isto vti li-
 cebit, quod R̄ confectionū dianthos, pliri- Eclegma
 sarcoticō, diagalangæ añ 3 iii. diasatyriū 3
 vi. nucum pinearum, amygdalarū dulciū, pi-
 staceorum añ 3 ii. satyrii 3 i. radices ari 3 i. se-
 minum crucæ, vrticæ, nasturtii hortēsis añ 3
 i s. caudæ scinci 3 s. nucis Indicæ 3 i. piperis
 longi, zingiberis añ 3 i s. scobis pudendi cer-
 uini 3 i. cum saccharo, & syrupo de menta
 quod satis est, fiat eclegma. de quo ante cœ-
 nam, aut ieiunis, per se, aut cum vino detur
 drachma vna, aut duæ.

DE SEMINIS PROFLUVIO.

CAP. XLII.

Gonorrhœa Grecè, seminis profluuiū La-
 tinè dicitur. Et est excretio seminis præter vo- γονορ-
 luntatem, citra pudendi tentiginē. Fit ob re- ροία.
 centricis in vasis seminariis facultatis imbe- causæ.
 cillitatem, aut ob aliud malū, quod semina-
 riorum vasorum partes eodē modo, quo ex-
 pultrix secundum naturam facultas mouet:

t iii

veluti in comitialibus & aliis violentioribus
 cōuulsionibus contingit. oboritur autē ali-
 quando etiā ex seminariorū vasorū fluxio-
 ne. Semen quod profluit, aquosum, tenue,
 citra appetentiā coeundi, & ut plurimū qui-
 dem citra sensum, quandōq; verò cum volu-
 ptate quadam promanans. Corruptitur sic
 patientibus sensim vniuersum corpus, ac gra-
 cilescit, præsertim circa lūbos. consequitur &
 debilitas multa. Et si pudendo nō intēto eue-
 nerit, retentricis in seminariis vasis imbecil-
 litatē sequitur. Si verò intēto pudendo conti-
 gerit, cōuulsioni quodā modo similis erit af-
 fectus. Nō solūm viris, sed & mulieribus ac-
 cidit, & in fœminis sanē egrē tollitur. Cura
 cōmunis est cū ea quæ in omni fluxione ad-
 hibetur. Primū igitur in quiete, paucō cibo,
 ac aquæ potu egros adseruare oportet. Dein-
 de etiā lūbos & pubē cōtegere lanis rosaceo,
 aut melino made factis. Neque verò ineptæ
 sunt spōgię poscā imbutæ. Sequentibus vero
 diebus cataplasmatibus, emplastris, & vnguen-
 tis ex palmis, cotonis, acacia, hypocistide,
 rhoë, & similibus suprā sæpe cōmemoratis,
 vtendū est. In fœsibus quoq; adstringentibus
 ex rubi, plantaginis, myrthi, & similiū deco-
 cto, vel etiā aquis. Cibis aut vtendū qui ægrē
 corrūpuntur, & difficulter permutātur, & re-
 siccādi vim habēt. Dandū etiam cū potu ac
 cibis, agni seu viticis ac canabis semē, præ-

Curatio.

o. parte
hæm

sertim tostū, rutæ itē semē & folia, lactucæ se-
 mē & caules, ac nymphaeæ (nenuphar hodie
 appellant) radix. In potu verò quotidie pro
 aqua cōmuni, aqua in qua ferrū sæpe extin-
 ctū est, præbeatur. Quid multa? omnē acriū
 rerū esum, & multi vini potu, & olerū exhi-
 bitionē vitare oportet. victus verò ratio vni-
 uersa resiccatoria & adstringēs constituēda
 est. Ea etiam medicamēta quæ semen extin-
 gunt, propināda, veluti est agni seu viticis
 semen, tostū & perfrictū, folia itē eius, & flo-
 res, venerē cohibere credūtur, nō comesta-
 tantum, sed in potu sumpta, & substrata. Por-
 tulaca comesta, & lactucæ semē potatum, &
 nymphaeæ radix & semē in cibo accepta, se-
 men refrigerando extinguunt. Ruta verò co-
 mesta calore suo semen corrumpit. calamin-
 tham autem assidue edentes generandi po-
 tentia priuātur. Ex iis atque aliis eius farinae
 medicamētis varia componi possunt reme-
 dia, hoc potissimum, quod R^x specierū diacu-
 mini, diacalaminthæ añ 3 i s. seminis agni,
 rutæ añ 3 i. calaminthæ 3 ii. seminis lactucæ,
 portulacæ 3 i. sacchari equali omniū pōdere,
 misce, fiat tragea, de qua detur 3 i. aut 3 i s. in
 vino austero diluto. Optimū etiā cēsetur, la-
 minā plumbeam lumbis supponere: multū
 enī refrigerare cōsuevit. In his verò qui plū-
 bi duriciē ferre nō possunt, cōsulere oportet
 vt ex prædictis herbis qdā arefactæ subster-

t iiii

water lib
 water
 wof

Semen
 extingue
 tia.

plumbea

Tragea.

nantur. Potissimum verò ad hunc vsum con-
ferūt viticis folia, & modica ruta ac calamin-
tha: maximè verò ipsæ rosæ. Profunt enim
hæc citra renū læsionem. vehementes nanq;
refrigerationes eorū quæ lumbis subduntur,
renes iniuria afficiunt. Ipsum etiā stratū non
valde molle sit. Decubitus porro vt plurimū
in latus fiat, vitatā formā decubit⁹ supinā, ne
lumborum arteriæ inde calefiāt. Post prima
autē morbi tēpora exercitiis egrū cōmittere
oportet, quib⁹ totū corpus, & præsertim par-
tes patientes cōfirmentur. Bonū fuerit etiā si
nihil prohibuerit, ad frigidā lauationē defu-
gere, quæ omnē morbū ex fluxione obortū
depellere consuevit, maximè si medicamen-
taria qualitate aqua sit prædita. conuenit itē
per interualla quædā iis quæ rubefacere, atq;
ea quæ in profundo sunt ad superficiē trāsfer-
re possunt, vti. Ceterū omnē de rebus vene-
reis cogitationem excludere oportet.

DE EXVLGERATIONE PV-
DENDI. CAP. XLIII.

Naturaliū ac pudendorū vlcera citra in-
flammationē oborta, medicamētis indigēt,
quæ vehemēter resiccant: cuiusmodi sunt ex
charta combusta, anethū vstum aridū, aloë
arida in puluerē redacta, præsens sanè reme-
diū: & pistolochiæ (quam aristolochiā rotun-
dam vocant) radix. Inter composita is puluis
potissimum conuenit, qui R̄ aloës 3 ii. gallæ

Puluis.

3 i s. sanguinis draconis, boli armenia, pompholygis, id est thutia añ 3 i. radices pistolochia 3 s. myrrhē 3 i. gummi arabici nominati 3 ii. aluminis vsti 3 s. misce, fiat pulvis. At si humidiora ac sordidiora ulcera euenerint, primum dilutiore mulsā, mox lacte caprino vlcus abstergēdum. Dein puluere iam dicto vtēdum, aut lapide hæmatite, aut thure, aut malicorio, aut lemnia terra, in puluerem redactis vtendum. Quod si simul inflammatio affuerit, hæc ipsa primum remouenda erit, linteis in aqua stillaticea rosarum, aut solani, aut portulacæ, albo oui adiecto, madefactis, & loco patienti admotis.

DE RAMICE. CAP. XLIIII.

Cele Græcis, ramex & hernia Latinis, ruptura Barbaris scriptorib⁹ dicta, variis fit modis, & per adiectionē varias accipit appellationes. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deuoluuntur, Enteroccele græcè, latine autem ramex intestinorum dicitur. Quando verò intestina suprà in inguinibus hæret, Bubonoccele Græcis, Latinis autē ramex inguinis vocatur. Quod si humor aliquis lētus in scroti parte colligitur, Hydrocele Græcis, aquosus verò ramex latinis appellatur. Quā autem caro dura intra testium tunicas incre- scit, Sarcoccele græcè, carnosus verò ramex latine dicitur. Quid multa? nomē semper à rebus opplentibus, ramicis genera accipiunt.

κῆλη.

Ramex.

εντερο-

κῆλη.

βυβωνο-

κῆλη.

ὑδροκῆ-

λη.

σαρκοκῆ-

λη.

ἐπιπλο-
κήλη.
κυρσοκή-
λη.
causæ.

causæ

Signa.

Hinc si omentum in scrotum descendat, Epiplocele, id est ramex omenti nūcupatur: Sic ubi venę ultra modum repletę glomerantur ac dilatantur, Cyrsocele, hoc est varicosus ramex nominatur. Ramices intestinorum & inguinis generantur, vel quod peritonęū plus æquo extenditur, vel quod frangitur, utrūq; verò ex violēta quadā occasione præcedēte, nempe ictu, aut saltu, aut clamore, aut ingentis molis sublatione accidit. Aquosus verò ramex quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa cōtingit. Ex occulta quidē quando adauētis vasis in scroto contextis, aquosa materia propulsa, & sanguini admixta, ad eas partes decubuerit. Ex manifesta autē causa, quādo propter percussione collisis aut fractis vasis, sanguis subinde defluēs ad aquosam substantiā trāsmutatur. Carnosus ramex itidē ex latente causa nascitur, testiculo fluxione experto, induratōque, aut ex ictu, aut imperita post ramicis succisione curatione. Notę utriq; ramici & intestinorū & inguinū communes, cōspiciuus enim in scroto aut inguine tumor, qui in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisq; occasionibus maior quā prius euadit, cōpressus tardē quidē recurrit, celeriter autē rursus deuoluitur. Peculiararia ramicis ad extensionē relati indicia sunt, quod non vniuersim, sed particulatim tēporis spatio, & ob causas quaslibet intestinū deuolua-

tur, tumor equabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutū est peritonæo constricto. Ex ruptura facti ramici signum est propriū, q̄ vniuersim ab initio intestinum deuoluatur, idque ob causas violentas durat: tumor immēse magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat. q̄ scilicet intestina extra peritonæum elabantur. Aquosus ramex ita dignoscitur, q̄ tumor sit dolore vacans, firmus, ac stabilis in scroto, quacunque tandē occasione non euanesces, sed in iis qui modicum continent humorem cedens: in illis qui copiosum habēt, nō item. Et cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: quum feculentus, aut sanguineus, aut rubicūdis, aut liuidus appareat. Carnosum ramicem color vbiq̄ sui similis cū duritia cōsequitur. si autem tumor in scirrhu coalescat, nullus nec color nec sensus adest: si maligni referat naturā, dolor vrget punctorius. Cæterum ramicem intestinorū & inguinum curamus hūc in modum. Aegro re-supinato diductis cruribus, intestina sensim reducere, ac reducta deinceps idoneis ligamētis retinere oportet. si verò reductioni minus obtemperēt intestina, emolliētia, ac inflammationē dolorēque leuantia & flatus dissoluētia fomēta, linimēta, balneaq̄; adhibēda: qualia sunt quæ ex malua, chamæmelo, anetho, seminibus lini, fœnigræci, carci,

aquosus

carnosus

Ramicis
intestino
rū & in-
guinū cu-
ratio.

Ceratū.

vicius.

Decoctū
glutinās

anisi, cumini & similibus componūtur. lana etiam succida, vino & oleo madefacta, loca dolentia fouenda sunt. reductis intestinis, conandum vt intestina idoneis ligamentis retineātur. In quē vsum cerata & emplastra sunt adhibenda: potissimū verò hoc, quod R^x picis naualis, mastiches añ 3 iii. thuris 3 ii. hypocistidis, sarcocollæ, acaciæ añ 3 i s. lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, aloës añ 3 ii s. boli armenię, symphyti radicis, gallarū, malicorii añ 3 iii. vi^ci quercini 3 i s. aristolochię vtriusque 3 ii. rhois, balaustiorū añ 3 i. sepi hircini § ii. terebinthę & ceræ quod satis est, gummi antea in aceto aut vino dissolutis, formetur ceratum, quod in pelle arietis impositum alligetur, nec ante septimum aut nonū diem soluatur. Interea eger in lecto maneat diebus triginta, & à cibis inflatibus abstineat, vino copioso, vehemēti motu, nepe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis: bibatq; decoctū, quod R^x pedis leonis, saniculę, herbę fortis, (quam cōsolidam sarracenicam vocāt) eupatorii añ m i. cynoglossi officinarum, polygoni, clematidis daphnoidis, plantaginis añ m s. radicis symphyti § s. radicis symphyti petræi 3 v. seminis myrthi 3 iii. balaustiorū 3 ii. foliorum lauri 3 i s. bulliant in vino & aqua iustæ quantitatis, quo ad tertia pars absumpta fuerit: dein colentur, & cū saccharo fiat potio delectabilis, de qua singu

lis diebus matutino tempore dētur ꝯ iiii. Cæ-
 terū maximè etiam annitēdū, ne aluus in-
 dure scat: ne scilicet si nimio conatu stercora
 excernantur, simul intestina iterū deuoluan-
 tur. vtendum quoque cōuenienti, vt antea di-
 ximus, deligatura, præcipuè si occasio motū
 præciperet. Porro aquosus ramex per ea que
 calefaciunt & exiccant medicamenta curan-
 dus, vt est farina fabarum, baccæ lauri, semē
 lini, dauci, althææ, & id genus alia, de quibus
 in cap. de Ascite, & reliquis aque inter cutem
 generibus abundè dictū est. Chirurgicā præ-
 dictarum, omniumq; aliarum ramicum spe-
 cierum curādi rationem lib. 6. cap. 62. & se-
 quentibus copiossimè tradit Paulus: quā vt
 hic tractemus, non est nostri instituti. quare
 ad vteri pathemata progrediemur.

Ramicis
 aquosi cu-
 ratio.

DE SUPPRESSIS MENSIBVS.

CAP. XLV.

Mulieribus quibusdā menses supprimun-
 tur, vel naturaliter, vel præter naturam. Si na-
 turaliter, hinc colligere licebit, quod mulier
 nulla inde molestia vel totius corporis, vel
 vteri afficiatur, ætatis itaq; ratione plurimis
 menses quartodecimo anno fluere incipiūt,
 paucissimis ante tertium decimum aut duo-
 decimum: plerisque autem post quartum de-
 cimum erumpunt. desinunt verò aliis anno
 quinquagesimo, paucis autem vsque ad sexa-
 gesimum durāt: steriles etiā mulieres, in vte-

Causæ.
 Quibus
 naturali-
 ter menses
 suppri-
 mantur.

Quibus
præter
naturam
menses
detinen-
tur.

ro habentes & saltrices, naturaliter non purgantur. Nā quicquid in eis recrementi est, nimia exercitationis vehemētā absumitur. & ut summam dicā, mulieres calidioris temperaturæ, validisq; exercitiis utētes, & agrestes, parum aut nihil per mēstrua purgātur. Nonnunquā autem præter naturā menses nimia vel pinguedine vel gracilitate supprimi solent. Pingues enim exanguiore reliquis sunt, minimasque venulas habēt: quique illis inest paucissimus sanguis, ferē in pinguedinē trāsit. Graciliores verō ob diuturnū aliquē morbū extenuatæ, nihil prorsus supernacui sanguinis cōtinent. præterea mēses non defluūt, quibus sanguis vel crassus, vel lēvis, vel per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares, aut sedē. aliis etiā, q̄ thorace sanguinē cietauerint, aliis q̄ dissecta vena ultimā sanguinis inanitionē tolerauerint, menses suppressi sunt. sed & reliqua excretionū genera idē sæpe effecerūt. ut sudoris multitudo, assidui vomitus, alui p̄fluvia ac pustularū omne genus quæ in cute efflorescunt. sic præter has omnes causas menses supprimuntur ob acutos maximosq; morbos, & ob alimenta, quæ vel paucitate, vel multitudine sua excesserint. A paucio enim alimento paululū quidpiam confestim expirat: à multo verō meatus obstruuntur, & excretio intercipitur, sæpe etiā in ore vteri calli oborti, aut carnis excresecē.

tia, aut pinguedinis copia purgationē men-
 struam impediūt. Quibusdā etiam cicatrices
 vlcerū, quæ in vtero præcesserūt vasorū ora, à
 quibus sanguis in vterū ferebatur, obstruxe-
 runt. Nōnullis post abortū vteri ore exulce-
 rato, ac deinceps ad cicatricē ducto, obstru-
 ctio ac cōpactio superuenit, quæ sanguinis
 per vterū excretionē aufert. curæ quoq; per-
 tinaces, formidōq; immodica, & ingēs mœ-
 ror mēses intercipiunt. Frigida denique aut
 alia vteri intemperies mēses remoratur. Sup-
 pressa mēstrua totius corporis grauitas, nau-
 seæ, fastidia, & horror inæqualis cōsequuntur.
 dolores præterea circa lumbos, femora, col-
 lū, sinciput, & fundamenta oculorū existūt.
 Itē febres ardētes, & vrinæ nigricātes, cū ru-
 bra quadā sanie: perinde ac aquæ, ex qua nu-
 per mactatæ carnes ablutæ fuerūt, fuliginem
 quis miscuisset, quibusdā etiā vrina aut diffi-
 culter reddit, aut omnino supprimitur: cau-
 sarum verò diuersitas magna ex parte de ser-
 monib⁹ egri cognosci potest. Frigidioris au-
 tem tēperature fœminas ex iis potissimū di-
 gnoscemus, q̃ somnolētiore, ad omnēmq;
 motū segniores sunt, ac colore candidiores,
 seu plūbeæ, vrina aquosa, & aliis quæ iam sæ-
 pe dicta sunt. pituitam quoque iugiter ex-
 creant, & interdum etiā pituitosos humores
 euomunt. Calidioris autem temperaturæ
 notæ, iam commemoratis prorsus contrariæ

Signa.

Frigidioris tēperaturæ notæ.

Calidioris.

Plenitudinis. - sunt. Plenitudinis verò, quam obstructio cōsequitur, notæ ex aliis capitib. colligēde. quæ enim hac ipsa laborant mulieres, menstruorum tempore magis grauātur, dolorēsq; circa lumbos & pubem percipiunt, venæq; illis

Frigidioris temperaturæ curatio. in tumorem insignem eleuantur. ceterū si à frigidis ac crassis humoribus menses supprimuntur, cibos calidos & extenuātes, de quibus iam sæpe est dictū, exhibebimus. Vinū etiam fuluū, odoratum, & antiquum vt bibant præcipiemus. exercitia quoque, & alia quæ corpus calefacere, crassosque ac lētos humores incidere & extenuare possunt, præscribemus. Si plenitudine laborauerit mulier, & nihil aliud phibeat, à sanguinis missione curandi ratio inchoanda erit. Secāda verò vena malleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus. neque inutile erit, crurib⁹ cucurbitulas affigere. Sin plenitudo nulla fuerit, purgatione vtendū, humoribus tamē antea ad expulsionē preparatis. In quē vsum

Decoctū hoc decoctum exhibeatur, quod R^x radicū acori, iridis, oreolini, asparagi añ ʒ i. seminū apii, fœniculi, rusci, anisi, dauci, ammi, vrticæ añ ʒ i. calaminthæ, absinthii añ m s. organi, abrotani, artemisiæ, pulegii, asari añ m i. hyssopi m i s. cinamomi electi ʒ i s. bulliāt singula in aqua iustæ quātitatis, quoad tertia pars absumpta fuerit. dein excolētur. & saccharo sufficienti adhibito, adiiciātur syrupi de ca.

amintha, de hyssopo, de marrubio añ 3 i s.
 misce, fiat potio: qua hausta, purgatoriū su-
 matur medicamentū aliquod nimirū hiera-
 picra, eclegma diaphœnicôn, indi, catapo-
 tia de agarico, de benedicta, aut similia. à
 purgatione exercēdæ mulieres, potissimum
 obambulationibus, & inferiorū frictionib⁹.
 Fomentationes denique, inunctiones, & bal-
 nea ex chamæmelo, artemisia tenuifolia, mē-
 tastro, & aliis quę in decocto paulō antè me-
 morata sunt, oleis de lilio, rutaceo, & simili-
 bus parata, adhibenda. Post hæc medicamē-
 ta, quæ suppressos mēses euocāt, protinus, vt
 scilicet adhuc calido & soluto corpori occur-
 rentia vires suas ostēdant, exhibenda. In quę
 vsum conferunt myrrha, castoriū, baccæ lau-
 ri, rubea tinctorum, piper, salvia, ruta, sabi-
 na, casia, & alia quę suprā cōmemorata sunt.
 vnicē autem hoc cōfert, quod R̄ castorii 3 i. *Mēses cō-*
 mēsttri in puluerē redacti 3 s. vini antiq̄ aut *nocātia.*
 mulsę ʒ iii. misce, & à balneo calidum propi-
 nato. Benefacit etiam decoctum pulegii, arte-
 misię, rute, cumini, dauci, saluie, anethi, am-
 meos, fœniculi, inulæ, & similibus. calamin-
 thæ etiam in puluerē redactæ 3 ii. aut sabinæ
 3 i. in vino aut mulsâ pota. mirificē conducūt
 pastilli de myrrha. Absinthites autem vinum
 per totius curationis decursum bibendū. *Pesi.*
 Pesi. sis etiam in vterū demissis, necessitate sic exi-
 gente, vtendū: ex quorū numero hic est, qui

R^x triphere magne citra opiū 3 i. farina erui,
nigellæ, rubeæ tinctorum, artemisiæ, pulogii
añ. 3 i s. succi rutæ 3 ii. misce, fiat pessus, qui
cū lana vel œsipo supponatur. Et hic, qui R^x
myrrhæ, bdellii, styracis añ 3 i. calaminthæ,
abrotani, absinthii añ 3 i s. radicū acori, ru
beæ tinctorum añ 3 i. feminis nigellæ, rutæ
aridæ, baccharum lauri añ 3 ii. sabinæ 3 i. ca
storci 3 s. Redigantur singula in pulcrē, &
cum melle, aut triphera, aut mithridati anti
Metren- doto quod satis est, formetur pessi. Mettré-
chytæ. chytis etiam vtendū. in quem vsum vtero in-
fundimus olea calida: irinū nimirū, liliaceū,
Suffitus. laurinū, & similia. Suffitis etiam ex styrace,
galbano, thure, bdellio, radice aristolochiæ,
artemisia, nigella, gariophyllis, cinamomo,
Fomēta. & similibus paratis vtendum erit. Fouendus
quoque vterus odoratis fomētis, maiorana,
serpillo, calamintha, chamæmelo, pulegio,
artemisia, radice iridis, & similibus in olla
decoctis: quā operculo perforato operire o-
portet, arūdinēq; aut aliū canalē foraminī
infertum vndique circumlinere, vt deinde se-
Inseffus. des mulier excepto canali foueatur. Prode-
rit etiam, vt mulier huic decocto vsq; ad vm-
bilicū infideat, & īde pessos paulò ante me-
Calidio- moratos sibi admoueat. Caterū calidiores
ris tempe & plurimū exiccate mulieres curantur, si q̄
raturę cu maximē humectetur vberiore humidiorēq;
ratio. cibo ac potu: quales sunt qui ē carnib⁹ agni,

hœdi, è piscibus teneras carnes habentibus, auibus altilibus, & similibus parantur. vino vtendum cādido, non admodum antiquo & diluto: balneis item dulcium aquatū. & vt in pauca rem contraham, victus ratione ea vtendum, quæ hecticis adhibetur. Reliquæ curationes ex suis petantur capitibus.

DE REDVNDANTIBVS MENSIBVS. CAP. XLVI.

Redūdare mēses in mulieribus dicimus, quando vltra cōsuetum tempus purgationis magnā copiā effluxerint. Tempus autē vnicuique purgationi statum & ordinatum nō est. multis enī ad duos trēsve dies, haud paucis vsque ad quintum profluit, aliis etiam ad septimum vsq; , rarò ad duodecimum purgatæ sunt. Fit ob fracta aut aperta vasa, vel magna, vel parua. Amplioribus vasis ruptis aut apertis, cōfertim sanguis profluit. minorib⁹ verò apertis, sensim, nec magnā copiā promanat. Ab erosione si accidit, tū non solum paulatim, verum etiam cum maximo dolore effluit. Porro quū immodicè promanāt menses, color fœdus consequitur, pedes molli tumore attollūtur, corporis robur prosternitur viciatur ciborū tum appetitus, tū concoctio: atque in totum omnia, quæ immoderatā sanguinis vacuationē siue ex hæmorrhoidē, siue alio quopiā sanguinis fluore euenientem sequi consueverunt. In primis igitur artus &

Causæ.
Signa.

Curatio

5. Aph.

Medica-
menta
mens
constrin-
gentia.

Pilulæ.

extrema corporis ab alis & inguinibus, vin-
culis excipere oportet. cucurbitulas etiam le-
ues magnas subter mammillas, iuxta Hippo-
cratis sententiam, affigere conuenit. cibus &
potionibus austeris & adstringentibus uten-
dū. Afsis autem potius quàm elixis vescatur
egra: carnibus potissimum, quibus suapte na-
tura deficcandi facultas inest, vt auium mon-
tanarū, & agrestium animalium. motu & vi-
no abstinendum, & pro eo adstringenti potio-
ne utendum. Medicamenta adstringentia sim-
plicia in potu propinanda, hæc sunt. balau-
stium, hypocistis, acacia, coralli, lyciū, terra
lemnia, galla, polygonum, symphytū vtrun-
que, hæmatites, calices glandium, plantago,
oxyacantha, & similia. Composita, syrupi ro-
faceus, myrthinus, pastilli de succino, & terra
lemnia. Itē hæc catapotia, quæ & terre lem-
niæ, boli armenia, thuris, mastiches, gallarū
añ 3 ii. sanguinis draconis, hæmatitis añ 3 i.
cornu cerui vsti 3 i. hypocistidis, acaciæ, co-
rallorum rub. añ 3 s. balaustiorum, rosarum
rub. añ 3 ii succini 3 i. cum syrupo myrthino
formetur catapotia, de quib⁹ 3 i aut 3 is. pro-
pinabimus. Extrinsecus vngueta, emplastra
cerata, & epithemata adstringentia, vtero ad-
hibeantur: qualia multa suprā in capitib. de
Dysenteria, diarrhœa, & licenteria dicta sunt.
Inseffus etiam ex decocto prædictorum me-
dicamentorum parati conueniunt. item quæ

vtero iniiciuntur: in quem vsum plantaginis
 succus mirificè confert. Succus item polygo-
 ni, aut solani, aut hypocistidis, aut acaciæ, &
 similes. pessi quoq; vtilis sunt, qualis est qui **Pessulus.**
 & thuris, balaustrorum, gallarum añ 3 i. gū-
 mi arabici, acaciæ, succini cornu cerui vsti
 añ 3 ii. boli armenii 3 ii. singula redigantur in
 pollinè tenuissimū, & lana rosaceo intincta
 excepta, in mulieris pudendum immittantur.
 Porro fluores alii vteri diuturni, rheumatif- **Curatio**
 mos vocāt Græci, qui interdum rubri, inter- **floris**
 dum albi, interdū pallidi, sæpe etiam aquosi **mulie-**
 sunt, eodem ferè modo curantur: nisi quod in **bris.**
 rubro fluore primum, si ætas & alia permise- **Rubri.**
 rint, ad sanguinis missionem vertimur. Nā &
 multa sequeretur incōmoda, si cōfestim san-
 guinis impetum localibus remediis reprime-
 re conaremur: nempe hydrops, neruorū aut
 oris vētriculi, vel capitis pathemata. Ablatio
 nem verò sicut in iis qui sanguinem excreāt,
 partiri oportet, vt paulatim prolixiori tēpo-
 re auersio fiat. Secunda verò erit in cubito ve-
 na: dein iis quæ antea cōmemorauimus, vtē-
 dum. Fluore autem albo infestāte in princi- **Albi.**
 pio quidem resistendum non est, vt aliena è
 corpore excernantur. neque præter rationem
 erit, si quod pituitam purgat medicamētum
 adhibeas. toti etiā corpori auxilia quæ citra
 manifestum calorem exiccant, ad mouenda,
 vt frictions, vnctionesq; ex melle. superio-

rū verò præcipuè partiū exercitationes, vt vo-
cis, cōueniunt. medicamēta quoq; crassos &
pituitosos humores extenuātia, vrināque du-
centia, vt asarum, fœniculum, apium, & simi-
lia danda. vtero autē moderatē adstringentia
applicanda, abstergentibus etiā vtendum, ne
scilicet ab humore trāseunte vlcus inferatur.
Aqua igitur calida iugiter sanies abluenda;
dein rosaceum, aut myrthinū, aut melinum
oleū, & alia quæ prædicta sunt, admouenda.

DE VTERI SUFFOCATIONE

CAP. XLVII.

- Suffoca-
catio.** Strangulatus seu suffocatio vteri, ad supe-
riora eiusdem recursus est. Græcis *ὀσφικὴ*
πνίξις dicitur. superiores ac principatum obti-
nentes partes in passionis consensum perdu-
cit, nempe carotidas, cor, cerebrique mēbra-
nas. Fit ob retenta menstrua, cohibitum se-
men, vt copiosè Galenus lib. 6. de patiētibus
locis cap. 5. ostendit. Hæc enim flatuosam
quandā refrigerationem, vt inquit Aëtius, in
vtero excitant, quæ subinde cordi & cerebro
communicatur. contingit etiam refrigerato
vtero, quo tempore menstruæ purgationes
effluunt, vel ob difficilem quempiam obor-
tum, vel vbi quis sanguinis eruptionē ab vte-
ro repētē sistere properauerit. Accidit patiē-
tibus, cum accessio propinqua est, torpor
mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei
pallor, aspectus mœstus. Quum verò iam
- Causæ.**
- Signa.**

instat strangulatus, inclinatio ad somnum, desipientia, detentio instrumētorum sensus, vox obmutescit, crurāque contrahuntur, pulsusque parui & debiles fiunt, sæpe & penitus abolentur. Cū remittit, mox illæ rubescere incipiunt, oculi attolli & aperiri. Humiditas etiam quedā à locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac intestina immurmurant, ipsēque vterus paulatim laxatur, atque sic ipsis mens, sensus, & motus redit. Cæterum passio iuxta circuitum mouetur, sicuti comitiales: idque vtero, vt diximus, repleto, aut seminali, aut alia quæ in eo putrefit materia. Mulae rursus se à morbo recolligunt, nonnullæ verò in ipsis accessionibus subito pereunt. id quod accidit, vbi pulsus crebriores & inordinati fiunt, ac subinde in totum abolētur. Postremò frigidus & modicus humor superficiē irrorat. porrò malū hoc hyeme & autumno magis infestat iuniores, ad venerem procliuēs, steriles, præsertim si vi medicamentorum tales factæ fuerint. In accessionibus igitur extrema deligare oportet, cūmq; deligationibus crura tota, totūq; corpus perfricare & veluti animo deficientes recuperare. Naribus foetida admoūenda: verbi gratiā, funiculus luccernæ extinctus, castoriū, galbanū, pix liquida, lanę lacinięq; cōbustæ, & alia eiusmodi. cucurbitulas quoq; inguinibus, & imo ventri cū multa flamma & leues affigere conue-

Curatio.
Quæ in
accessio-
ne faciē-
de.

nit. Quòd si accessio prológetur, etiam quæ
 flatibus educēdis vtilia sunt, sedī supponere
 oportet. Hæc autē ex cap. de coli doloribus
 petenda veniunt. In vterum vnguēta & olea
 odoratissima infundere oportet, vt est ama-
 ricinū, & quod spicaceū hodie appellatur, iri-
 num & similia. Hęc etiā obstetrix digitis ca-
 piēs, vsq; ad os vteri immittat, leniter ac mul-
 tum defricans, vt eo irritamento crassus hu-
 mor excernatur. Præter hæc omnia mulier
 maximis vocibus excitetur, propriūmq; no-
 men inclametur. Hoc tēpore ea etiā sunt ad-
 mouēda, quæ sternutationes excitant: vt ca-
 storiū, struthiū (condīsi barbari vocāt) & pi-
 per. Neq; inutile erit, si infusionses ex deco-
 cto baccarum foliorūmq; lauri, pulegii, cala-
 minthę, artemisię, marrubii, sabinę, althę,
 chamęmeli, serpilli, iridis, aristolochię, & fœ-
 nigreci parētur. Infusionū tamē tēpore cere-
 bri curā non omitemus, sed rosaceo & aceto
 caput irrigabimus. vbi accessio quicuerit, ad
 vomitū cogātur. omnes enim vomitus leuat,
 sed eas præsertim quæ à cibo infestantur. In
 tertio die lumbis & iliis cucurbitulæ cū scari-
 ficatiōe applicētur. A septimo die purgatio-
 ne vtendū ex hiera de colocynthide, aut cata-
 potiis de agarico. Mox ad castorii potionē
 veniemus, quod iugiter potum ab hoc malo
 protinus liberat. dādum autem singulis die-
 bus ad drachmæ pōdus, interdum cū mulsā,

Que post
 accessio -
 nem agē-
 da.

interdū cum artemisię decocto, nunc cum vi
no tenui. hoc etiam tempore infusionsibus &
pessis mollientibus ex adipe anserino, styra
ce, mastiche, amoniaco, & similibus cōfectis
vti licebit. vterus etiam iis quæ calefaciendi,
flatūque educendi vim obtinent, sufficien
dus. vtēdum autem hoc potissimum, qui R^x Suffitus.
pastillorum gallię & aliptæ moschatae añ 3 i
s. styracis 3 iii. gariophyllorum, maceris añ 3
i. ligni aloës 3 ii. cinamomi electi, foliorum
lauri añ 3 ii. ladani 3 ii s. reductis singulis in
pollinem subtilissimum cum stacte, quā sto
racem liquidum appellāt, sunt trochisci. Ci
bo interea & potu paucis admodum conten
ta sit mulier, totaque victus ratio exiccatoria
sit. atque hæc ad accessiones proficiunt. In Totius
totius verò corporis curatione, potissimū si corporis
malum diuturnum fuerit, plerunq; à sangui
nis missione, præcipuè si mēstruæ purgatio
nes detineantur, auspicandū. deinde ad pur
gationem ex hiera picra transeundum. per
acta euacuatione cucurbitulę leues quidem,
sed cum multa flamma affigendę. Nec inuti
liter sinapismi, & dropacismi, ex euphorbio
pyrethro, pipere, & sinapi confecti applican
tur. Non parum etiam recta victus ratio opi
tulabitur, nepe deambulationes matutinæ,
gestationesque vel in curru, vel naui, vel iu
mento. A gestationis motu vociferatio, & le
ctio clara, modulata, concinna utilis est: vn.

victus.

Victus.

Etio præterea, frictio, & exercitatio ex congruis interuallis repetita, eisdem conueniet. balneum aquæ dulcis rariùs, & non nisi fordidum abstergendarum gratiâ adhibendum. Balneis verò naturalib. vti, optimum est.

DE VTERI PROVIDENTIA.

CAP. XLVIII.

**Procidē-
tia.**

Procidere vterum dicimus, quando ita evertitur, vt exteriùs emineat. neq; enim vterus, vt imperiti suspiciātur, à suis solutus propaginibus totus decumbit. nā si ita procideret, restaurari minime posset. Sūt verò procidendi vteri causæ multæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit, membranisque vterum continent & vicinis partib. connectunt, ruptis, hoc malo corripitur. accidit etiā vt procidat vterus in difficili partu, propter secundæ extractionem, quam vterus illi adhærescens sequitur. item ob inertem & imperitam fœtus extractionem, vel iſtum, vel immensi ponderis eleuationē, vel animi affectus, puta filiorum amissionem nūciatam, aut hostiū accessum, vel ob periculosam nauigationem, aut eiusmodi aliquam causam, omni eo quod concretum est soluto, vtero etiā simul collapsa. Aut ob resolutionē, aut partium (membranarum nimirum & musculorum) imbecillitatem, vt in senescētibus maxime accidit. Procidit sæpe ob humoris pluri ac tenacis defluxū, partiumq; frequen-

tiā laxatis ac solutis appēdicib⁹. procidit ve-
rō potissimum secundū os eius, & quod pro-
cidit ouo struthiocameli simile est, maioris
tātū & minoris ratione differens. Signa satis
manifesta sunt, & causarū diuersitas facile de
ægotātis aut assidentiū sermonibus cogno-
scetur. Quū itaq; recēs adhuc malum est, stu-
dere oportet, vt vterus inseratur, ac in suū re-
ponatur locum. In principio siquidē facile
repositioni paret, & rectē locat⁹ perseverat,
præcipuē si ætas conuenerit. nā in prouectio-
ribus vterus quidē reponitur, sed rursus qua-
libet leui causa relabitur. Cōuenit igitur, du-
ris stercorebus primū euacuatis, vrināq; in
vesica collecta excreta, quo vter⁹ vndiquaq;
sit liber, & neq; ab intestino recto neq; à ve-
sica cōprimatur, ægrā supinā figurare, vt co-
xas habeat sublimiores, poplites flexos, cru-
ribus inuicē dilatatis ac diuaricatis. deinde
prolapsam vteri partē oleo tepido, vel buty-
ro, vel malua, althæa, fœnigræci, seminis li-
ni, aut similiū decocto fouētes, conuolutam
lanā præparabimus, figura & crassitudine si-
nui muliebri proportionalem, tenui & puro
linteo exterius circundatam: ac deinceps in
succum acaciæ, vel hypocistidis vino dilutis
mersam vtero inferemus, & citra violentiam
ac sensim totū quod procidit sursum torquebi-
mus, quoad integer in sinu tumor excitetur,
& vter⁹ in propriū reponatur locū. Extrinse-

Signa.

Curatio.

cùs autem pubem spongia in posca expressa operiemus. mulier iacebit extēsis adaptatissime inuicem cruribus, vt alterum alteri incubat. tutius tamen erit, pedes simul vinciri, fasciā vsque ad gēua deducendo. Deinde cucurbitę cum flamma copiosiore, vmbilico & vtrisque ilibus affigendæ. Naribus odorata iugiter admouenda. Tertio die lana adhuc in sinu persistēte, mulier in vino nigro austero modicē tepido, aut in decocto myrthi, rubi, malicorii, & similium insidebit. his peractis sursus supina, accliuib⁹ coxis, locabitur: sublataq; ē sinu priori lana, altera in vicem prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasinata & emplastra à foris imo ventri imponātur ex palmulis, polētia, malicorio, lenticula, & similibus. Cerata etiā ex mastiche, ligno aloës, ladano, thure, iūco odorato, acoro, nuce moschata, gummi arabico, tragacantha, & cuiusmodi medicamētis parata cōueniūt. singulis verò tribus diebus hæc vsque ad perfectam curationem permurentur. Toto etiam curationis tēpore mulier motum, & ea quæ sternutamenta excitant, euitet. vt autē naribus odoratissima sunt adhibenda, sic vterus ab infernis fœtidis rebus suffiendus est. Cibi boni succi, & vina odorata offerenda, venter quoque leniendus. ne si cū difficultate sit egerēdū, simul vterus procidat. obseruandum tamen, ne nimium ven-

Viſus.

ter subducatur, exoluitur enim, relaxanturq;
propinque partes, & vteri loca procidunt. Por-
rò si pars prolapsa diuturnitate tēporis pro-
pter incuriā putruerit, ob assiduāmq; urinæ
irrigationē & sordē inhærentem exulcerata
fuerit, amputandū aut inurēdū quod inutile
fuerit, nullius metu periculi, erit. cōstat enim
totū vterū putrefactum quandōq; amputatū
& ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

DE MOLA. CAP. LIX.

Myle, hoc est mola, induratus est tumor,
interim in vuluæ ostiolo, interim in toto vte μύλη.
ro ipso prominēs, ad tactum ferē lapidosus.
vel vt Galenus lib. 14. Ther. meth. definit, est
caro informis. nomē à motus difficultate &
grauitate assumpsit, quam sentiūt quæ malo
hoc afficiuntur mulieres. Fit à seminis mulie Causæ.
bris, & plurimi sanguinis menstrui in vtero
retentione & affluxu, quem calor immodi-
cus cogit, ac in carnis forma transmutat. Cō- Signa.
sequitur hoc malum tumor durus cum hypo-
chondriorum contractione, corporis gracili-
tate, decoloratione, appetentiæ deiectione,
mensiumque suppressione. item mammillæ
intumescunt, vt cōceptionis quibusdam per-
initia suspicio suboriatur. Tēporis verò pro-
gressu discernuntur. molam enim pūctionis
sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea
motus vllus, sicut in cōceptione, percipitur.
Nonnullæ verò præbent aquæ inter cutem

- suspicionem: à qua tamē distinguitur, quòd tumor durus sit, nec sicut in hydrope manus aut digitorum impulsui cedat, aut tympani modo sonum edat. Nonnunquam tamē tempore procedēte iecur refrigeratur, & hydrops superuenit.
- Viātus.** Primū omniū alimenta boni succi offerenda, ac vini potioni vtēdum moderata. mulier motu non vtatur vehemēti, is enim fluxionem commouet: sed gestationibus & deambulationibus, pedes etiā decubēdo elatiores habeat. Quòd verò ad curā dirationē attinet, principio in plenitudine vena cubiti incidenda, ac subinde purgatione per cataportia foetida vtendū. corpore vacuato cataplasmata, fomenta, infusiones, pessi, vnguēta & cerata quę relaxandi vires habēt, adhibēda: qualia sunt quę ex althæa, malua, chamæmelo, meliloto, fœnogræco, semine lini, & similibus parantur. conueniet in hūc vsum vnguentum dialthææ, aut emplastrum de meliloto, diachylōn simplex ad mouere: vel hoc quod R̄. oleorum amygd. dulcium 3 iii. liliacei 3 ii s. pinguedinis anseris, gallinæ añ 3 i s. mucositatis seminis lini, fœnigræci añ 3 i. amoniaci, bdellii añ 3 ii. radicis althææ, seminum nigellæ, dauci añ 3 ii. ceræ quod satis est. fiat vnguentum, gummi dissolutis prius in vino. Pessi quoque subiiciendi ex butyro, adipe porcino, medulla ceruina, passulis, caricis pinguibus, seminibus lini &

scenigræci confecti. Post hæc quæ menses euo-
care possunt, propinanda medicamenta. in
quem usum præter ea quæ in cap. de Suppres-
sis mensibus commemorauimus, conuenit **cōfectio.**
hæc confectio, quæ R̄ specierum diacinamo-
mi, diagalangæ, diacumini añ 3 s. specierum
diambæ ð i. dialaccæ ð s. cinamomi electi,
hyperici, calami odorati, asari, radicis acori,
seminis anisi añ ð i. seminis rutæ, zingiberis,
artemisiæ, marrubii, dictamni, saluiæ añ ð s.
sacchari § vi. dissoluti in succis artemisiæ &
hyperici, fiat confectio in morsulis. de qua
quotidie dentur 3 ii. aut 3 iii. Proderit & hunc
pessum subiicere, qui R̄ radicis asari, acori,
rubeæ tinctorum añ 3 ii. seminum rutæ, ni- **Pessus.**
gellæ añ 3 s. maioranæ, nucis myristicæ, ga-
riophyllorum, baccarum lauri añ 3 irfabinæ
ð i. castorei, euphorbii, añ ð s. Redigantur
singula in puluerem, & cū terebinthina resi-
na formentur pessi. Mirificè etiam cōfert uti
balneis naturalibus, potissimùm si malum
diuturnum fuerit.

DE INFLAMMATIONE VTERI.

CAP. L.

Vterus plurimis de causis inflammatur,
nempe ex ictu, mensium retentione, abor- **Causæ.**
tu, vlceratione, concubitu metas rationis
excedente, sellæ nimis duræ in se sessione, lon-
gissima intentissimâque deambulatione, sæ-
pe & transpiratione ob frigus prohibita.

Signa.

Hanc monstrant vteri, pubis & lumborū dolores, febris acuta, dolor capitis & radices oculorum, brachialis, digitorum & colli cōuulsio, & in aduersum declinatio, stomachi ex consortio dolor, oris vuluæ conuiuentia, pulsus exigui crebrique. Si lāguīda fuerit inflammatio, haud valido vteri dolore afficiūtur. Sin vehemens, & ipse totus pulsatilem dolorem percipit. Vniuerso sanē inflāmatione laborāte, vndiquaq; parte aut eius inflāmatione obsessa, in ea dolor magis intēditur. Nā si posteriora ipsius solūm laborēt inflāmatione, dolor lūbos magis vexabit: durūmq; stercus detinetur, quoniam intestinum rectū comprimitur. Si priora, dolor pubem occupat, & vrine stillicidium, aut difficultas, vesicā pressā, excitatur. Lateribus autem inflāmatione correptis, inguina tendūtur, & crura grauantur. Posteriore verò vteri parte in-

Curatio.
venæ sectionio.

flammata, in vmbilico dolor potissimum cū tumore infestat. Quum autem os vteri inflāmatio affigit, in abdomine dolor est, digitōq; immisso os occurrit durum rigidūque. In principio itaque curationem aggressi, si neque ætas, neque habitus corporis, neque anni tempus obstiterit, neque inflammatio post abortum, aut immensam sanguinis euacuationem superuenerit, venam poplitis secabimus ex Galeni decreto, qui in lib. de curandi ratione per venæ sectionem inflāmatio-

nē vteri à venis in crure sectis iuuari scribit.
 A Egram in domicilio obscuro, & moderatè
 tepido collocabimus, quietem imperantes,
 ac crura eius ab omni motione prohibētes.
 deinde artus & extrema perfricabimus. In
 cibo, qui quantitate modicus sit, vtatur ægra
 ptisanæ cremore, & ouis sorbilibus. Potus sit
 decoctū cinamomi aut hordei. Extrinsecus
 lana ex oxyrhodino madefacta, pubi & lum
 bis imponatur. Palmulæ etiam, aut mala co
 tonea, in vino decocta, & rosaceo admixta,
 applicanda. cataplasinata quoque ex farina
 seminis fœnigræci, lini, meliloto, plâtagine,
 lentibus polygoni, portulacæ, sedo, & simi
 libus cōfecta adhibenda. idque potissimum
 si erysipelatis naturam inflammatio sortita
 sit. Lana cū rosaceo aut melino oleo, aut suc
 co portulacæ aut sedi madefacta, in signum
 vteri immittenda. At vbi inflammatio decli
 nare cœperit, ad ea veniemus, quæ quadan
 tenus remittendi discutiendique vires habe
 ant. A Egrotam igitur in fœnigræci, althææ,
 se. lini, maluæ, interdū artemisiæ, marrubii,
 & saluiæ decocto vsque ad lumbos sedere iu
 bebimus. Pubi etiam & lumbis hordeaceam
 farinam cum fœnogræco & semine lini in
 mulsâ elixatam, aut caricarum decoctum il
 linemus. Pessi quoque subiiciendi ex bu
 tyro, medulla ceruina, adipe anserino, galli
 næ, & similibus confecti. Reliqua denique,

Pessi.

quibus emolliendi facultas inest, adhibenda:
de quibus iam sæpe dictum est.

DE STERILITATE REMO-
VENDA. CAP. LI.

- Causæ.** Sterilitas aut viri, aut mulieris ratione
accidit. A viro est, cum semen eius vel ferui-
dum, & veluti torrefactum: vel frigidum, te-
nue, aquosum, languidum, quale decrepito-
rum est: vel crassius quàm oportet emittitur
vel quòd viri semispadones sint, penè inque
breuissimum habeant, vt in vuluæ recessum
semen iaculari nequeant. Quod etiam inter-
dum nimia obœsitate contingit. obœsi enim
tam ventricosi euadunt, vt semen ad profun-
diores vteri partes iaculari non possint. Mu-
lier verò sua ipsius ratione non concipit, q̃
vterum habeat vel calidum & igneum, vel
frigidum & humidū, vel squalentem & ari-
dum. Nam vt Hipp. ait, Quæcunq; frigidos
& densos vteros habent, non concipiunt. &
quæcunq; præhumidos obtinēt vteros, nō
„ concipiunt: extinguitur enim in eis genitu-
„ ra. Et quæcunq; siccos magis & torrefactos
„ nam ex defectu alimenti corrumpitur semē.
„ Cæterum crassæ admodum & obœsæ, haud
concupiunt, quod item etiam Hippoc. iis te-
statur verbis, Quæcunq; præter naturam
5. Aph. 46. non concipiunt vtero, iis omentum os vteri
„ comprimit, & priusquam extenuentur, non
„ concipiunt. Graciles denique & macilentæ

nō concipiunt: aut si concipiūt, statim abortiūt, eodē Hippocrate teste, qui sic scriptum reliquit, Quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerūt, abortiunt priusquam crassescant. Quædam etiam non concipiūt, eo quod vterus earum debilis est, vel angustus, vel brevis, aut quod vasa eius obstructa clausaque sint, aut cicatricis superuentu excæcata, aut quod vteri cervix in obliquū ducatur, aut quod os eius vel nimis angustum, vel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt: calidius siquidem temperamentum viri facilè apprehenditur ex pilorum copia, potissimum verò nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circūstant, suprâ quidem vsque ad media femora. Petulca etiam est hæc temperatura, & ad libidinem etiam prona: statim verò satiatur. Frigidius temperamentum monstrât partes circūpositæ testibus glabræ. Neque etiam hoc temperamento præditi ad libidinem proni sunt. Vteri verò caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, & cum dolore deferuntur, vt genitalia interdum mulieris exulcerentur. sed & quæ educūtur, nigriora sunt. Hæc etiam temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorē vteri temperaturā mōstrat menstruorū suppressio, stupor in pube, lumbis & cruribus.

bus obortus. veneris etiam vsum aspernātur,
 & os vteri contractum habent, hoc tempera-
 mento præditæ. Humiditatis verò vitio fœ-
 cunditatem frustrari indicat, si in coitu hu-
 more admodū perfunduntur, & si iis fuerint
 tenuia copiosaque menstrua. Siccitas vteri
 contrariis planè deprehenditur notis. Cō-
 munitur quidem ambobus congruit, & viro
 & mulieri, vniuersum corpus cōseruare pro-
 bē temperatum, laboris, cibi, balnei, & reli-
 quorum omnium mediocritate. Viri igitur,
 qui ob deprauatam viuendi rationem semen
 corrūpunt, ad magis compositum salubrio-
 rēque victum conuersi, geniturę fœcundi-
 tatem acquirunt. Mulier autem neque ingen-
 ti labore defatigetur, neq; prorsus ociosa sit.
 hoc enim superuacuis excrementis molē cor-
 poris replet: illud sanguinem desiccāt, & pur-
 gationes absūmit. Potu & cibo concoctu fa-
 cilibus vtatur, & quos ventriculus probē su-
 peret, atque conficiat. Illud verò potissimū
 circa rectam viuendi rationem est obseruan-
 dum, vt nec vir, nec mulier obcēsi reddantur.
 Qui enim tales fuerint, liberis procreandis
 inepti sunt, eo qđ genitalib⁹ mutuò se cōtin-
 gere nō possunt, & paucum semen emittāt.
 Porro conuenit etiā, vt iis qui liberis pro-
 creandis operam dare cupiunt, quædam cō-
 sueta, esūq; aut potu grata ante cibū offeran-
 tur, quæ veneri excitadæ & semini generan-

Curatio
 commu-
 nis.

do aptissima sint: qualia existunt quæ calefa-
ciunt, & moderatè inflant. vinum itaque in
hunc usum modicè sumptum, aquæ præfer-
tur. Sine enī Cerere & Baccho (vt ille ait) fri-
get venus. Ex oleribus vtendum cruce, hor-
minio, erisyno, & aliis quæ in cap. de iis qui
re venerea vi non possunt, commemorau-
mus. Ruta, calamintha & mentha omnino
vitanda. calamintha enim & mētha etsi plu-
rimum semen, imbecillum tamen & langu-
dum gignunt, ruta verò prorsus corrumpit.
Cæterum si mulier vitio quodam humorum
non cōcipiat, eas purgantem medicamento va-
cuare, & proba victus ratione emendare ex-
pedit. Priuatim verò mulieribus conueniet, **Curatio**
curam eorum quæ sunt circa vterum, quàm **mulieris.**
fieri potest maximam habere, & vt iis men-
ses sine omni impedimento promanent.
Quum igitur propinqua est per menses pur-
gatio, cibi potusque quantū fieri potest, me-
diocritatem curæ habebunt, & quippiam ex
iis quæ purgationē irritare ac stimulare pos-
sunt, assument: quorum copiam ex cap. 45.
huius Libri petes. A purgatione menstrua,
optimum ac opportunissimum concipiendi
tempus est. Quoniā (vt Hippocrates inquit) **6. Epid.**
post menstruam purgationem iam dextra, **Par. 7.**
iam verò sinistra vteri pars aperta est. Porro **Aph. 24.**
vteri intemperiem frigidā per fomenta, sus- **Curatio**
sus, & alia quibus calefaciēdi vis inest, cor- **frigidæ**

intempe rigere oportet, vt sunt quæ ex artemisia, pu-
rici vteri. legio, salvia, ruta, aniso, cumino, acoro, & si-
milibus parantur. castorium etiã bibere pro-

Curatio derit, & alia adhibere quæ in cap. de Men-
calidio - sibus suppressis dicta sunt. Calidiorem verò
ris intem vteri intemperiem per ea quæ refrigerant &
perici. humectant emendabimus: cuiusmodi sunt

olera quidem, lactuca, malua, cucurbita, por-
tulaca, atriplex, aliique cibi similes. vinum
album & dilutum, somnus, & dulcium aqua-
rum balnea. Lumbis etiam ac pubi refrige-
rantia adhibenda sunt: vt solani succus rosa-
ceo admixtus, qui etiam lana exceptus in v-

Humi-
dioris. - teri sinum vtiliter imponetur. Quæ ob vteri
humiditatem non concipiunt, aridioribus
alimentis vti oportet, plurimum exerceri, ac
in superioribus perfricari, & euacuationis
auersionisq; gratiã interdum pransas, inter-
dũ ieiunas euomere, & cibi parsimonia de-
ficari, carnesque potius tostas vigentium ge-
tate animalium comedere, vinũque potes
meraciũs; sed parcius bibere. Arida præter-
eà fomenta crebro adhibenda. Profuerit &
vulvæ adstringentia apponere: qualia sunt,
rosarum, foliorum rubi, gallarum, rhois ob-
soniorum, myrthi, polygoni, malicorii, & si-
milium decocta. Id autem nisi totum corpus
antea purgatum sit, faciendum haud erit. Sic-
cieio-
ris. - ciorem vterum contrariis curare oportet, bal-
neis aquarum dulciũ, inunctione & alimen-

nis humectantibus, vino diluto, non nimis
 veteri. Quod si à crassioribus humoribus cō
 cipere mulier impediatur, si quidē rodentes
 fuerint, mulierem probè purgare couenit
 hiera picra, aut sero lactis: & victu exquisi-
 tiori, cibisque boni succi vtendum. Pituito-
 sos verò humores laboribus plurimis, sudo-
 ribus, vomitu, vel per inferna purgatiōe ab-
 sumere oportet, aliāq; omnia quæ in cap. de
 Suppressis mensibus commemorata sunt. Iā
 verò flatus quoque vteri conceptionem im-
 pediunt. quibus primò cibi parcitate mede-
 bimur: dein iis quæ flatus discutiunt, vt est
 cuminum, ruta, anethum, apii semen, & simi-
 lia, quæ sæpe iam commemorata sunt: eaque
 partim potanda, partim extrinsecus adhibē-
 da sunt. Clausum vterum aperiemus inie-
 ctis clysteribus odoriferis, fomentisque &
 infussionib⁹ ex fœnogræco, semine lini, mal-
 ua, & id genus aliis. Postcā ad validiora per-
 gemus, vt artemisiā, calamintham, pule-
 gium, & maioranam. Quibus os vteri nimiū
 hiat, iis victus aridus, fomenta sicciora, me-
 dicamenta adstringentia, qualia in curatio-
 ne humidioris intemperiei dicta sunt, con-
 ueniunt. Peruersiones vteri mollientibus fo-
 mentis dirigemus: id enim fomenta maxi-
 mē possunt. Sed & mollientes pessuli vtiliter
 supponētur. Castorium etiam ē posca bibi-
 tum, vtero auerso conferre solet. Quæ hic

Curatio
humorū.Curatio
flatuum.Curatio
clausi vte-
ri.Curatio
aperti v-
teri.Curatio
peruer-
sionis.

desideratur, ex aliis petendum capitibus erit. nos enim hic capita tantum rerum perstringere volumus.

DE DIFFICILI PARTU.

CAP. LII.

Causæ.

Difficilis partus, aut vicio parientis, aut fœtus, aut secundarum, aut extrinsecus aduenientium accidit. Parturiētis quidem, si crassa obœsaque sit, aut animo pusillo & dolorum inexperta, aut vterus totus exiguus, aut inflammationem vteri, aut alterius partis habeat, aut alio quouis morbo laboret: aut naturaliter imbecillis sit, vt fœtum propellere nequeat: aut ante tempus pariat. Itē si os cervicis vteri obliquum fuerit, aut eidē caro aliqua ob vlcus quod præcessit adnata sit. At fœtus vicio, si vel inusitatae magnitudinis existat, vel exiguus, & modicę grauitatis, vel magni capitis, vel monstrosus: verbi causa, biceps: vel mortuus, qui nihil opis parturienti præster, aut intumescat: vel viuus quidē, sed imbecillis, vt forās non possit progredi. vel si gemini vel plures fuerint, & repēte omnes simul colo vteri impingantur. vel si figuram naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura fœtus prodeuntis est, prima quidem in caput, manibus super femoribus porrectis & extensis, & caput in neutrā partem declinās, sed rectā ad os vteri dirigēs. proxima huic, vbi in pedes manibus super utroq;

Natura-
lis situs
fœtus
prodeuntis.

femore extensis recta defertur. Aliæ omnes præter has duas, à natura abhorrent. ut si caput in dextrâ aut sinistram vteri partem inclinat: vel si altera, aut vtraque manus exeritur, crurâque interius à se inuicem diducuntur: aut si fœtus altero pede prodit, altero interius retento: aut si duplicatus alicui vteri parti innititur. Ob secundas, partes redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus sit propter tenuitatem abrumpatur. humore siquidem qui in utero collectus fuit, vacuato, infans præ siccitate ægrè elabitur. Ab externis etiâ causis difficultas oritur parienti. aut frigore, quod uterum desat, & meatus angustiores reddit: aut calore immodico, qui vires dissolvit. Cause externæ ex parietis & Signa. assistentium sermonibus cognoscuntur. Debilitas quoque parientis, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitatis cognitionem venimus. Fœtus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur. qui si mortuus fuerit, à motu prorsus cessat, ventris frigiditas adest, atque dolor iuxta umbilicum grauis, spiritus exhalatur fœtidus, faciei color prauus. Magnitudo fœtus ex parentum corporis constitutione, ac ventris parientis mole coniicitur. Crassities secundæ inde colligi potest, quod prædictorum signorum nullum adsit, & parturiens robusta, facilisque fœtus motus

Curatio fit. Ceterū obcesam mulierē in lectulo pronā, hoc est in caput propendentē, & vultu in terrā deiecto figurare oportet, flectentē inclinātemve genua ad femora, quō vter⁹ ad abdomē tendēs, ē directo oris sit. Digitis verō pinguedinib⁹, verbi grāiā butyro, oleo, axūgia anatis, gallinē, & similiū delinire os oportet, & sensim dilatare. Timidā verō hortari conuenit, in expertem dolorū partus admonere expedit, vt validissimē spiritū cōprimat ac cōtineat, & ad ilia validiore conatu protrudat. Si autē ex adstrictione, fœtūsq; veluti coarctatione pariendi oriatur difficultas, laxatione opitulandū, infundēdo largiter oleū dulce & calidū. item decoctū fœnigræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiā oua, q̃ leniēdi facultate prædita sint. Deinde & pubē cū abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxāte medicamento fovere oportet. Proderit etiā infessionibus ex cōmemoratis rebus paratis vti. Insuper laxationes balneis aquarū dulciū moliri oportet, nisi febris, aut alia quædam occasio impedierit: mouerēq; parientem gestatione in sella, in aëre mediocriter calido. Quod si inflammatio, aut alius quispiam morbus vterum infestauerit, huic etiam ex propriis capitibus succurrēdum, ac prospiciendū erit. Imbecilla cum iis quę reficiunt, & robur addūt cibis & potibus refocillāda. Vbi infans præmagnus fuerit, ea adhi-

hēda quæ dilātare & laxare os vteri possunt.
 Si verò præter naturam figuratus fuerit, natu-
 ralem reddere figuram decet, partim pellen-
 do, partim adducendo, partim flectēdo, par-
 tim in rectum agēdo. Et si manum pedēve
 præmiserit, non attrahere membro præhen-
 sum oportet (magis enim firmatur ac impin-
 gitur, vel luxatur, vel abrumpitur) sed digitis
 humero vel coxæ fœt⁹ innixis, rurs⁹ id quod
 prominet, in cōuenientem locum diducere.
 Porro si cum oris vteri compressione totius
 infantis indecora fuerit figura, sursum prius
 ipsum ab vteri ore sublimē detrudere consi-
 liū est; deinde prehensum iterum ad os diri-
 gere. Si autem gemini aut terni, plurēve fue-
 rint, ac ceruicem vteri obsederint, reliquos
 propellere ad fundū vteri oportet, & eū qui
 magis paratus videbitur, prius educere. ve-
 rùm si nō procedat, q̄ infans mortuus sit, aut
 caput nimis magnū, vel aliam ob causam, ad
 fœtus extractionem seu sectionem, quā Gre-
 ci Embryoelciam appellāt, veniēdū est. Eam ^{ἐμβρυο-}
 autem copiosissimē Aëtius lib. 16. cap. 23. & ^{ελκία.}
 Paulus lib. 6. cap. 74. tradunt. Porro si fœtus
 tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior
 quàm vt rumpi possit, dissecanda erit. Qui-
 bus autem humor in tunicis contentus, ante
 congruū tempus effluerit, ita vt loca exa-
 ruerint, ouorū albuminibus cum maluæ aut
 fœnigræci decocto excolato, aut ptisanæ cre-

Puluis o- more tepido perfundemus. Medicamentū
 primus verò quod in vniuersū omnes difficulter pa-
 ad diffi- rientes iuuat, est hoc, quod R^x cinamomi ele-
 cultatem Et 3 ii. myrrhę, casię lignę vocatę añ 3 i. suc-
 partus. cini albi 3 i s. misce, fiat puluis, de quo in po-
 Secundæ tu vini odoriferi detur drachma vna. Porro
 eductio. fœtu excusso frequenter accidit, vt secūda in
 vtero firmiter adherescat: quod vbi euenit, tū
 interdum os vteri apertum, interdū clausum
 reperitur, secūdināque ipsa nonnunquā vte-
 ri fundo adhuc cōiuncta, nonnunquā seiun-
 cta est. Si itaq; os vteri diductū fuerit, & secū-
 da quę inibi relicta est, alicui parti vteri orbi-
 cularim ac pilæ modō cōuoluta inhæserit, fa-
 cilē educitur. manu siquidem sinistra calida,
 pinguisque illita in fundū demissa, secūdam
 sublabētem extrahere oportet. Si autē fundo
 vteri sit cōnexa, demissa simili modo manu
 calida, & pingui inuncta apprehensam secun-
 dam trahemus; non tamen in rectū, vt vterus
 procidat: neque violēter admodū, sed leniter
 ac placide primū in obliquū diducemus, huc
 atque illuc circumagētes: deinde paulō vali-
 dius attrahemus. hoc enim pacto obsequun-
 tur, & à connexu solūtur. Quod si vuluę os
 clausum fuerit, perfusionib. vtemur, & sini-
 stræ manus digitis leniter aperire & paulatī
 dilatare conabimur. Quod si non successerit,
 mulieris pubi fomenta, perfusiones, vnguen-
 tāq; emollientia & relaxantia adhibere con-

uenit. Si robusta fuerit, eo tēpore etiā sternu-
tamēta ex castorio, pipere, & similib. cōfecta
narib. admouēda sunt. Hinc est quòd Hippo-
crates. 5. aph. 49. sic scriptū reliquerit: vt se-
cūda prōcidat, sternutatoria apponito, & na-
res apprehendito & os. Portiones deniq; ali-
quæ earū quæ menses prouocant propinan-
dæ. Quæ quidē omnia primo, aut altero die
peragēda sunt, prētereā suffitu vtendū, deco-
ctis in olla artemisia, iride, sabina, pulegio,
calamintha, & similibus, olla sellæ supposi-
ta, cui mulier vestimētis vndiquaq; circūse-
ptæ infideat. postea si os vteri apertū iueneri-
m⁹, manu inserta, secūdā, vt diximus, extra-
here conabimur. At si nō obediat, dilaceran-
da nō est. haud multis enim postea dieb⁹ pu-
trefacta, & in saniem soluta excidet. Quia ve-
rò grauitate odoris & caput replet, & stoma-
chum euertit, odoramenta iugiter suffiēda
sunt, quæ possint his malis aduersari, & secū-
dam subducere. Ad quos vsus excellūt carda-
momum, bdellium cum sabina, thus, styrax,
ladanū, lignum aloēs, & huiusmodi iisdem
etiā, ea quæ menses ducunt, propinanda.

DE ISCHIADICIS. CAP. LIII.

Ischiadici, hoc est coxendicū dolore affe-
cti, propriè dicuntur, quibus dolor circa iun-
cturam (quam Græci *coxion*, Latini coxā vo-
cant) accidit. Fit ob crassum pituitosūmq; hu-
morem, qui in coxarū articulo cōcretus infi-

Ischiadici.

Causa.

Signa.

det. Ideoq; hoc malum assidue cruditates, & immodicus rei venereę vsus, aliquādo etiam deambulationes cōcitatiores, & hēmorrhoides suppressæ, & vomēdi cōsuetudo intermissa, & purgationes mēstruæ, aut etiā alię familiares excretiones impeditę, & exercitiorum neglectus conciliant. Antecedit autē, & quasi auspiciatur hoc vitium aliquādo quidē vicinorū musculorū dolor, & maximē lumborū: aliquādo verò ab ipsa coxa initiū fit. iam verò quandoq; etiā contingit, vt coxæ dolore sublato, circa poplitem solum afflictio hęreat: aliis autē iuxta talū, quibusdā verò totū

Curatio.

crus æqualiter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur. Initiū igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione. Et si quidē humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnib⁹ vena secāda in poplite aut talo interna, aut etiā cubito, Galeno lib. 10. de cōpo. med. secundū locos. cap. 2. teste: idq; in latere affecto. Sin à pituitoso atq; crasso humore malū oritur, à purgatione ei⁹ humoris auspicianda curatio. In quē sanē vsū clysteres crebri exhibendi erūt, in hūc vel simile modū parati. R^x centaurii minoris, saluiæ, verbasculi odorati, rutæ, iuæ arthriticæ hodie officinis dictę, añ m i. radicis acori ꝯ i. stœchadis 3 iiii. sc. anisi, sc. fœniculi añ 3 ii s. agarici optimi 3 ii. polypodii 3 v. decoquantur in aquā iustę quātītatis, donec tertia pars

clyster.

absorpta fuerit: dein R̄colaturę xiii. hierę
 picrę s. eclegmatis indi 3 i s. oleorū liliorū
 alborū s. ii. rutacei s. i. vitellos ouorū numero
 ii. salis 3 i s. misce, fiat enema. Auxiliatur etiā vomitus.
 vomitus ischiadicis, atq; magis utiq; q̄ eua-
 cuationes infernē per ventrē, ut qui reuellāt
 deorsum repentē humorē. Faciēdi itaq; sunt
 vomit⁹ in principio ab accepto cibo, postea
 verò etiā per vomitoria medicamēta, initio
 factō à mediocribus. In quib⁹ autē vehemēs
 humorū coactio densatione, quę egrē dissol-
 ui potest, à medicis intēpestiuē acribus phar-
 macis vtentibus facta est, his cucurbitula q̄ cucurbi-
 maxima cū scarificatione affixa auxiliatur. tæ.
 Caterū medicamentis fluxū reprimenti- Adstrin-
 bus in coxēdicū dolore nō vtemur. Quū in gentibus
 profundo coxa sita sit, sanguis ex vicinis & medica-
 ambiētibus venis ac musculis ad illā impel- mētis nō
 litur. Mitigatoriis igitur in principio medi- vtendū.
 camētis opus est in hoc dolore, quę neq; re-
 frigerent multū, neque fortiter calefaciāt. ut
 enim ea quę refrigerant, ad coxā impellūt:
 sic quę vehemēter calefaciunt, aliā amplius
 materiā ex adiacentibus partibus attrahūt.
 Porro post venę sectionē, aut per purgantia Acria
 medicamēta vacuationē, ad acria medicamē quando
 ta, non antē veniēdum est. Si enim quis prius adhiben-
 quā corpus euacuet, acria medicamēta ad da.
 patientem particulam adhibeat, ægrē cu-
 rabile malum reddet, vtpote multitudine

ibidem indissolubiliter cōdēsata. præter alia enim crassa & viscosa fit, & ob acrium medicamentorum caliditatem & siccitatē non dissimile quippiam affationi perpetitur. Patientē igitur locū primū ex oleo rutaceo irrigare oportet. postea verò efficaciora admouenda medicamenta, quæ scilicet sensim calefaciāt, & materias ex alto ad superficiem attrahere possint: qualia sunt, oleum vulpinum, de piperibus, costinum, vnguentum arragon, marciatō, salvia, ruta, folia lauri, sambuci, radix ebuli, pulegium, sabina, opopanax, bdelliū, ammoniacum, & similia: ex quib. fomenta, vnguenta, emplastra & cerata componi possunt. Quare primum spōgia in decocto iuniperi, aut saluę, aut foliorū sambuci madefacta, loco patienti iterum atque iterū imposita, hoc vnguento subinde vtēdum erit, quod

vnguentum.

Ceratum

R̄x vnguētī marciatōn 3 iiii. oleorum irini, liliacci añ ̄ s. succi rutę, succi iuæ hodie nominatę añ 3 ii. mellis 3 i s. saluę, pulegii, piperis añ 3 s. pyrethri, staphysagrię añ ̄ i. cerę quod satis est. fiat vnguētum. Proderit etiam huius cerati vs^o, quod R̄x oleorū costini, vulpini añ ̄ i s. olei de piperib. ̄ s. opopanax, bdellii, styracis añ 3 iiii. radicis bryonię, nitri, foliorum sambuci añ 3 ii. aristolochię, (quam rotundā hodie nomināt) rutę añ 3 i s. euphorbii ̄ i. gummi dissoluantur in acerrimo aceto, & cū cera & terebīthina resina quod satis

est. fiat ceratum. quod si malum adhuc remo-
retur, clysteribus denuo utendum erit, & post-
ea cucurbita quam maxima cum plurima fla-
ma coxae affigenda, vulnuscule etiam altioribus
per scarificationem impactis. Quod si vero ne-
que sic malum finitur, ad purgationem, vomitum, &
alia quae supra dicta sunt, redeundum est. His
peractis, ad dropaces veteribus nominatos,
& ad medicamentorum adurentium usum veniendum.
inter quae non postremum locum obtinet, herbae
hiberidis radix recens, aestate effossa, & dili-
genter tusa, ac veteri axungia modica excepta,
iuncturae coxae & universi cruri imposita, &
alligata. Sic vero ad motam incubere finito,
mulieribus quidem non infra duas horas, viris au-
tem quatuor horarum spatio, si possibile sit id
perferre. Excitat enim tumores cum ardore &
rubore, veluti sinapism^{us} facere solet. Post in
balneum inducito aegrotante: in quo ubi modi-
cum exudaverit, in solium ob fervorem mordaci^{us}
desidere iubeto, idque fortiter perferre cogito
(morsum enim cum ardore in principio infer-
re consuevit) deinde educito. ferme enim sem-
per, ut testatur Aetius, quavis ab aliis fuerint
importati, sua sponte pedibus ingrediētes exi-
bunt. A balneo ad oleum multum, paucum admodum
vinum admisceto, & coquassata illinito: ac hu-
more cum aspero pano deterso, crus ipsum cum
levissimis lanis cooperito. Et sane consuevit
hoc ipsum praesidium nullo alio inde auxilio

Aduren-
tia medi-
camenta

y

vicius.

indigere. Quòd si tamē aliquādo vestigium
mali relinquatur, vicienis diebus interpositis
rursus eodem præsidio utaris. interiectis autē
diebus, ceratum suprà descriptū imponi po-
test. inter adurentia medicamenta hoc etiam
locum obtinet non extremū, quòd ℞ Mellis
anacardini, fermēti añ 3 i. c. arharidū abiectis
alis 3 ii. aceti quod satis est, misce. & hoc quod
℞ euphorbii, nitri añ 3 ii. saponis, calcis vi-
uæ añ 3 i. mellis anacardini quod satis est ut
ad mellis crassitudinem omnia cōmixta re-
deāt. Cæterū quod ad vicius rationē attinet,
cibus sit mediocriter tenuis, & cōcoctu faci-
lis. exercitia perficiātur de ambulationibus,
cōtinuis flexionibus, saltationibus & cursu.
Aliū etiā semper probè solutam habere ex-
pedit. Quòd si verò vitium longiùs duraue-
rit, vstionē in tribus aut quatuor locis adhi-
bere oportet, ut docet Paulus lib. 6. cap. 76.

DE PODAGRA ET ARTHRI-
TIDE. CAP. LIIII.Podagra
arthritidis
causæ.

Podagra & arthritis mala eiusdē sunt spe-
ciei. Differunt itaq; nō toto genere, sed locis
patiētibus. In utroq; enim, articulorū est im-
becillitas, & humor à natura alienus ad hos
ipsos cōfluens. Quapropter si in pedibus cō-
stiterit hęc fluxio, podagra appellatur: Si ve-
rò reliquos artus occupauerit, Arthritis, id
est articularis morb⁹ nominatur. Generāt au-
tem hoc malū cruditates, immodicus rei ve-

nereæ vsus, vehemens & cōcitatio deambu-
 latio, stationes diutius productæ, equitatus
 creber, familiares excretiones suppressæ, &
 cōsuetorum exercitiorū intermissiones. mœ-
 rores autē, curæ, vigiliæ, & reliquæ animi af-
 fectiones hoc malū suscitāt. Nōnunq̃ etiam
 colicus dolor perperā curatus causa est, cur
 arthritis sequatur: quēadmodum testātur ea
 quæ lib. vi. Epid. par. 4. aph. 3. scribit Hippo-
 crates, inquit: cuidam intestinum colō, vbi
 articulari morbo corripiebatur, dolore ferē
 vacabat. Postq̃ verò ab eo sanatus est morbo
 plus doluit. vt plurimū verò aptitudines ad
 hoc malum à parentib. in filios ac posteros
 transferuntur. Sed humor superās, qui iūctur
 ris sese inserit, vel sanguine⁹, vel biliosus est,
 vel pituitosus, vel melācholicus, interdū etiā
 ex humorū cōmistiōe malū cōtrahitur. Hu-
 morū autem discrimina iis deprehēdi notis
 possunt. Sanguineus siquidem humor si mul-
 tus fuerit, plenitudinem efficit, & tumorem
 ingentem, non venarū modò, sed totius par-
 tis patiētis circa cutem, eūmq; rubentē. Qui
 hoc modo patiuntur, neq; refrigerantia neq;
 calfactoria valde præsidia adhiberi sustinēt.
 vrinæ eorū fuluæ sunt, & mediocri præditæ
 crassitudine. venæ etiā in his copioso susce-
 pto sanguine replentur, & in tumore attollū-
 tur. Aetas verò apta iuuetutis. Edulia præcesse-
 rūt boni succi, & copiosè nutriētia, neglecta.

Signa.

Sanguis
nei deflu-
xus.

Biliofi.

exercitiorum. Tempus verò, in quo affliguntur, ver. Biliosum defluxū color subflauus, & subrubeus testatur. itē caloris sensus dolorisque lancinātis modo acris. item humor in cutem subito sine euidēti tumore erumpens. Refrigerātibus medicamētis sic afflicti gaudent, & iuantur: à calidis autē offenduntur. Febris in ipso accessionum statu accedit, validāque siti conficit, vrina sic patientiū subfulua, quandoque etiā acris, curæ autē ingentes, & irē, & vigiliæ, & fatigatiōes, & in summa victus ratio bilē procreans, præcedere solet. Aetas, temperamentum, & tempus, calida & sicca ad eum defluxum apta sunt. At si

Pituitosi.

pituitosa fuerit fluxio, ad digitorum oppressionem cauius sit tumor, & sublaxus & moderatus, color dolētis membri albus. Aetas hoc modo magis afficitur senilis, tēperamentum humidum & frigidum, consimilis ambiētis status, & tempus hybernum. vrina tenuis est, & aquosa. præcedit otium, & victus ratio, quæ pituitosum humorē progignit. Si ex atra bile sit fluxus, quod rarò tamen contingit, color tumoris nigrior est. Aetas quæ magis hūc fluxum generat, est vigore inclināte, temperamentū frigidū & siccū, tēpus autumnī, regio frigida & sicca, aëris cōsimilis status, victusq; atram bilem gignens. Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, protinus sanguis mitti debet, nō solum semel, sed iterum

Atræ bilis influētis.

curatio sanguinei.

atq; iterum, detractiōe paulatim repetita. Si enim venæ sectione omiſſa, repellentibus medicamentis fueris uſus, magni mali autor eris. ex ignobilib. enim partib⁹ ad principes, & vitæ neceſſarias ſanguis repulſus irruet. Secāda eſt autē vena in brachio inferna ē directo cruris influxione infeſtati. Quod ſi verò manus dextra dolore infeſtetur, venā in dextro crure ſecamus iuxta poplitem aut talos. Tum verò potiffimum ſanguinis miſſio tendanda erit, cum quempiam malum hoc primū inuadere cœpit. Qui enim ſæpius huiuscemodi deſluxione ſunt cōſlietati, plus noxæ q̃ auxilii ex ſanguinis detractiōe ſentiūt, præſertim ſi corpore ſint imbecillo ac frigido. Poſt miſſionem ſanguinis patienti parti.

Localia.

Localia. cula remedia adhibere oportet, quæ neque valde refrigerant: hæc enim humores cogūt, ac cōdenſant: neq; immodicè calefaciūt. hæc ſiquidem caloris ratione ad partes patientes plus attrahūt. Quapropter aceto veteri cū roſaceo partem patientem rigare oportet, præſertim ſi in alto herere dolorū cauſa videat̃. Etenim acetum propria ſua tenuitate uſq; in altū progreſſum, expeditā roſaceo viam exhibet, quod natura ſua dolores lenire poteſt. Si in ſuperficie dolor cōſiſtat, per vini & olei uſum magnopere iuueris: æſtate quidē tepidorum, hyeme verò calidorū. Deinde etiā cataplaſmatis vtendū, quæ dolores lenire poſ-

y iii

sunt, ex farina fœnigræci, hordei, fabarū, lupinorum, chamæmelo, & similibus. Oportet autē ea omnino semper esse calida; quod cōmodè fieri potest, si assiduè permutētur, & lana forinsecus contegātur. Nō parū proderit & hoc, quod R^x lactis caprini § vi. vitellos o-
 uorū numero ii. olei rosacei § i. croci 3 s. medullæ panis quod satis est vt medicamētum cataplasmat^{is} formā accipiat. Hęc itaque terantur donec vniantur: & vnita tādē imponātur. Potest etiam fieri ceratum ex oleo rosaceo, aceto, resina, cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, & similibus. tale enim repulsoriam vim propter crocum & acetum obtinebit: concoctoriam verò, discussoriā, & moderate resiccantem, rursus ob crocū, & aliorum commixtionem. Cēterū cibos eis exhibere oportet, qui extenuant, & minus nutriūt: quales sunt olera. carne autē, nisi sit volucriū montanarū, abstineāt, piscibus petrosi vtantur. vinū, si fieri potest, ex toto circūcidendum. nam hęc ferè vna ratio est, qua sanitas cōsequi potest. Quam cum ex milibus hodie à vix vnus sequatur, nihil mirum paucos, ad podagra modū esse qui ab hoc morbo hodie liberētur. In vicē vini vti opertet decocto cinamomi, anisi, & similium aut potione ea quæ hodiernis tēporibus Hippocras corrupta voce nominatur, cuius præparationem pete ex capite de Resolutione. A fructib. & venere ab-

sineant. Aluum etiam facile subeuntem ha-
 bere oportet. Et si quidem officio suo spōte
 sua non fungatur, simpliciore aliquo clyste-
 re eluatur. Quod si verò ob bilis influxū do- **Biliosi**
 lores excitentur, tum his communis scopus, **fluxus.**
 humoris affligentis est euacuatio: quæ tum
 per vomitum, tum per ventrem fieri debet.
 Per medicamenta itaque bilem ducentia cō-
 fidenter purgandi sunt sic afflicti. dein vsq;
 ad vigorem apponenda medicamenta, qui-
 bus refrigerandi & adstringendi facultas in-
 est: qualia sunt quæ ex semperuiuo, rosæ vi-
 ridib. rumice acuto, solano, plantagine, & si-
 milibus iam sæpe commemoratis apparan-
 tur. In hoc influxus genere interdū ob dolo-
 ris vehementiam iis, quæ stuporem induce-
 re possunt, medicamentis vtendum erit. In **Stupefa-**
 quem sanè vsum conuenit adhibere medica- **cientia.**
 mētum quod suprà descriptū est, ex lacte ca-
 primo, medulla panis, croco, & oui vitellis:
 cui feminis papaueris 3 iii. aut 3 iiii. aut opii
 3 i. admixta sit. Profunt hac ratiōe cicutæ fo-
 lia & hyoscyami adhibita. Sed animaduer-
 terdum erit, vt quum in feruentibus dolori-
 būs fuerimus, ad stupefacientium vsum coa-
 cti, postea refoueamus partes per ea quæ cā-
 lesfacere possūt. Nisi enim hoc fecerim⁹, de-
 biles & intēperatas redditas partes perpetuo
 flori obnoxias reddemus, & quæ in actio-
 nibus facilè offendantur. calorifica verò sint
 y iiii

victus.

Pituitosi
fluxus.

origanum, satureia, sinapi, piper, & eiusmodi. Porro adiuuare etiam oportet sudorū exclusionem, corpus calefaciēdo & fricādo: ita tamen, ne patientes iocos contingamus. Præbenda quoq; in potu ea quæ urinā ciēt, talia enim bilem per lotiū euacuare consueuerūt. Soporem quoq; inducētia, quod fluores ab ipsis resiccētur: atque id maxime, si post corporis purgationē exhibeantur, cōferre solēt. Cibi iis dandi refrigerantes, nō tamē humectātes: humiditas enim auget fluxionem. Famem & inediam ne tolerēt: nam bilē acriorem reddunt. Ex fructib. pomis adstringētib. & mespilis & aliis quæ refrigerant & simul fluxus cohibēt, vtantur. A vino prorsus abstineāt, vt priores. Qui ob pituitæ influxū laborāt, horum curationē à pituitæ euacuatione auspicanda. Euacuatur autem humor pituitosus pervomitibus quidem, nihilominus tamen & per ventrem infernè. vtilior verò in hoc malo p̄ inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo magis, si iuxta omnes corporis articulos flux⁹ cōstiterit. familiarior enim pituitę via, & minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiorem ventrem violenter attracta non vacuetur, periculū inducit. Quapropter tutius est, vt ad infernam excretionē ducatur. Ante tamen purgantia medicamēta, ea quibus incidendi & extenuandi facultas

inest, exhibenda, ut hac ratione ad purgationem crassi humores præparetur. Si euacuatio per purgationes fieri non potest, tum inedia & fame utendum est ad plures dies. natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt, iuxta hoc Hippocraticum, Corporibus carnes habentibus humiditas, famem adhibere conuenit, fames enim corpora siccatur. Neque absurdum erit, si clysteribus, & medicamentis urinam cientibus vacuentur. Cæterum extrinsecus medicamenta quæ dolores leniunt, & quæ discutere & moderate resiccare possunt, adhibenda, de quibus paulo supra diximus. His vero in morbi principio aliqua quæ adstringendi potentia prædita sunt, commiscere oportet. Post principium autem, solis discutientibus utendum. Mâsuetissimum verò, hoc est, Althææ nimirum folia cocta, tritum per se, tum cum polline, aut hordeacea farina imposita. Radix etiam cocta in aqua mulsa, trita & imposita confert. Et hoc unguentum, quod Olei laurini, irini añ ʒ i. adipis suilli veteris, butyri añ ʒ iii. medullæ ceruinæ ʒ ii. resinæ terebinthinæ ʒ v. galbani in aceto dissoluti ʒ i. hyssopi, radicis althææ, scæfæni græci añ ʒ ii. ceræ quod satis est, fiat unguentum. Porro quæ ratione nutrimenti præbentur edulia, natura sicciora sint, & minus nutriat: ut est oryzæ succus, & eiusmodi. carnes tamē auium montanarum assæ haud in-

7. Aph.
60.

unguentum.

victus ratio.

Atræ bi-
lis fluxio
nis.

commodant. capparex ex aceto mulso miri-
fice profunt. vinum præbeatur quàm mini-
mum, tenue, fulvum, & vetus. Qui atræ bilis
fluxionib⁹ molestatur, ii venæ sectione, aut
purgatione sunt euacuandi: venæ sectione,
quando sanguis atræ bile infectus est: purga-
tione verò, quando ad atram vergunt bilem
ægotantes. Si verò ambo hæc simul redun-
darint, non vnum aliquid ex prædictis adhi-
bere suffecerit, sed præfectâ venâ, deinde pur-
gante medicamēto vtendum: quod ipsum &
in aliis passionibus duplici euacuatione in-
digentibus erit faciendum, vt lib. 2. Parado-
xorum abunde monstrauius. In principio
autem morbi, & in ipso vacuationis tempo-
re, reprimentibus, & sensim simul calefacien-
tibus vtendum est. Post euacuationem verò
his quæ sensim calefacere, attenuare, & discu-
tere possunt vtetur, de quibus suprà abunde
est dictum. Ceterum quoniam topi & du-
ri tumores subinde in articulis creantur: mo-
dò ob humoris, qui ad eos decubuit, crassi-
tiem terrestremque duritiā: modò propter
immodicum discutientium & resiccantium
medicamentorū vsum, sine earū quæ molliē-
di facultate pollent, mistura. Ad quos certè
depellendos ea quæ in cap. de Lienis duritie
dicta sunt, conferunt. Itē vetustissimus acer-
rimusque caseus cum suillæ carnis præpin-
guis & veteris decocto contritus, & superim-

Topho-
rum cura
tio.

positus. Ad hoc malum conducunt etiam ficus triti, & impositi. Item althæa bis cocta, auena, vrtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotani, buphthalmi marrubiūq; folia: ita ut singula prædicta cum pice & sulphure viuo permisceantur. Admiscendi etiam adipēs suillus, caprinus, vitulinus, & anserinus. Medullæ itē omnes, & alia quę emolliēdi vi prædita sunt. Balneum sanē, ne silentio transca-
 mus, post inflammationum remissionem o-
 mnibus podagricis cōmodissimum existit. ducat
 Dum lauant, spongiæ aceto & sale permi-
 x- tis madefactæ, locis patientibus circumpo-
 cis. nendh, ut à fluxione immunes permaneant.
 Lauare autem eos non semel tantum, sed ite-
 rum atque iterum in aëre per omnia mode-
 rato oportet. In aqua tamen calida non diu-
 tius morandum. Consultissimum itaque, ut
 aqua calida perfundantur. vtile etiam, ut to-
 tū corpus linteis siccis perfricetur. Præterea
 curati à podagra, hac se ratione à podagra
 deinceps tuebuntur. Si primū bis in anno,
 modò nihil sit quod idipsum prohibeat, san-
 guinem largē detraxerint, vere nimirum &
 autumnō. Dein si iisdē tēporibus, & crebrius
 etiam, medicamentis purgātibus vfi fuerint.
 Cibis etiā ut demāt, & à satietate sibi caucāt
 necesse erit. vtendum quoque cibis cōcoctu
 facilibus, & qui prompte in partes corpo-

Quomo-
do quis
à poda-
gra se tu-
catur.

- ris distribuuntur, & excrementis vacent, vino aut prorsus abstinendum, aut parcè utendum. Exercitiorum creber sit vsus, idque ante cibum. Labores enim, Hippocrate nostro teste, cibos præcedere debent. Et ut rē in paucis contraham, hoc perpetuò secum mulsitēt Hippocratis, ut breuissimum, ita saluberrimum præceptum: ἀσκησις ὑγίης, ἀκορὴ τροφῆς, ἀσκήνη πόνων: hoc est, Sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrū esse ad labores. Somnus etiam & venerea, ut idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorū partem attinet, sal minutim in oleo tritus, & articulis affricus, omnes qui se ab hoc malo vindicare volunt, magnificè iunat: nisi præter modum sicca intemperie sint præditi. eoque illitu & mane & vesperi per totū vitæ curriculum, utendum est.

LIBRI TERTII FINIS.

LEONHARDI FVCHSII DE
MEDENDIS FEBRIBVS
Liber Quartus.

DE DIARIA. CAP. I.

Diaria febris, Græcis ephēmera dicitur, quod ei⁹ vnicā sit accessio, vno magna ex parte die, ex ipsius saltē natura, circumscripta. Nec ab re adiectū est, magna ex parte. sunt enim febres aliquę, vt sunt quę ex dēsatione meatuum oriuntur, quę etā in tertium vsque diē extendantur, vt cap. secundo latius dicemus, nihilominus tamē diarię nominātur. Quauis enim de substātia ipsa talium febriū diarię vocabulum non sit, tamē clarioris simul breuiorisq; doctrinę gratia, cum eadem his sit quę aliis diariis, nō obstante quod nomē non sit idem, diarias etiā appellare licebit: ne scilicet præter tria prima febriū genera, (quorum vnum est in quo spiritus plus iusto incalescit, alterū in quo humor putrescit, & tertiū in quo corpus & solidę eius partes febrilem calorem vt habitū susceperūt) quartū excogitare necesse sit, vt copiosius Galen. lib. 9. Ther. meth. cap. 1. docet. Fit cū absq; vlla prorsus putredine spiritus præter naturā incalescit atque succenditur. Id quod fit ob

ἐφήμερα.

Diaria febris quæ.

Tria prima febriū genera.

causæ.

Signa.

densitatem cutis, vigiliam, cruditatem, tristitiam, timorem, iram, curas animi vehementes, vstionem à sole, refrigerationem, laesitudinem, famem, ebrietatem, & inguinum tumores. Signa verò quibus deprehenduntur diariæ febres, duplicia sunt. quædã enim cõmunia omnium diariarum : & hæc numero sex sunt. Primum quidẽ pulsus. omnes enim diariæ, Galeno lib. 3. de Prædictione ex pulsibus autore, in magnitudinem, celeritatem, crebritatẽque pulsus, quantum in ipsis est, mutãt. Exquisitẽ autem seruant eam quæ secundam naturam est, æqualitatem, mollitiẽ, & ordinem. Alterum, vrina: prima siquidem statim die vrina cõcocta apparet, & benẽ colorata. Tertiũ, caloris qualitas: quẽ in omnibus suavis & mitis existit. Quartũ, declinatio: quæ in singulis cum sudore, rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore accidit. Quintũ, defectus malignorum symptomatum. Sextum, quia omnes à causa extrinseca (quam primitiuam vocant) oriuntur. Quẽ singula copiosius recẽset Galenus lib. 1. ad Glauconem, cap. 2. & lib. 1. de Diff. feb. cap. 7. necnõ lib. 2. de crisi bus cap. 13. Quẽdã etiã sunt signa quibus particulatim quæuis diaria dignoscitur, quæ traduntur à Galeno lib. 1. de Diff. feb. cap. 11. & lib. 2. de crisi bus cap. ult. lib. 1. ad Glauc. cap. 2. Quare consulto iis omnibus omissis, ad curãdi generalẽ rationẽ

descēdamus: quę primū per victus rationem victus,
 perficitur: cuius quidem in omnibus diariis
 simpliciter appellatis communis intētio est,
 vt cibi boni succi, & concocti faciles, ac di-
 stributioni idonei præbeantur: vltis à sole
 quidē & iratis, qui refrigerant & humectant:
 refrigeratis, qui minus nutriūt, & moderatē
 calefaciūt: vigiliis, aut tristitia, aut nimia cu-
 ra confectis, qui humectant pariter ac som-
 nū conciliant: defatigatis, qui maximē nu-
 triūt. Cæterū in quibus corporis intempe-
 ries calidior & siccior est, hos in primo sta-
 tim accessionis insultu cibare oportet. nisi e-
 nim quis hanc naturā statim cibet, ocysime
 in ea diaria febris mutatur in acutā. Vinum
 omnib⁹ diariis simpliciter nominatis aquo-
 sum, albū, & tenne conuenit. nam præter id
 quod concoctionē iuuat, vrinas etiā & sudo-
 res prouocat. Sed vigiliis, aut curis, aut tristi-
 tia maceratis, vberius cōcedēdum: defatiga-
 tis, quantum conficere possunt. iratis tamen,
 nisi omnino ab affectu quieuerint, vinū non
 tutò datur: vt fufius Galen. lib. i. ad Glauco-
 nē cap. 3. docet. Porro curare oportet omnes curatio,
 diarias simpliciter dictas balneis, sic tamē vt
 eos qui ob lassitudinē aut inguinū tumorem
 febricitant, prius dulci tepidōque ac multo
 oleo suauiter perfricatos, ad dulciū aquarū
 balneū ducamus. Si vero eos qui inguinū tu-
 more febricitāt, in aëre balnei immorari ius

feris, haudquaquā nocebis. Reliquos omnes
quā citissimē oportet ab aëre semouere.
Qui ob vigilias, curas, tristitiam, atque iram
febricitant, eos quidem plurimū lauare sub-
inde non oportet. verū oleo magis nihil ad-
frictionis habente affatim perfundēdi, par-
cēq; fricati pro cōsuetudine lauādi sunt. A so-
lis vstione febricitātes, statim initio refrige-
ratiōe, & crebriorib⁹ balneis aquę dulcis, so-
lāq; exigui olei pfusione citra frictionē cu-
rare oportet. Sint autē quę refrigerāt capiti
admota, rosaceū quod salis expers sit, aliāq;
cuiusmodi quę lib. i. cap. 3. dicta sunt. Hęc
autem frigefacta deinceps lana excipienda
sunt, ac suspēsa in sublime manu exprimēdo
syncipiti instillanda, idque assidue donec
febris inclinauerit: postea in balneum æger
ducendus. Si quis ex frigore febriat, is quo-
q; ad balneum in febris declinatione est du-
cendus, capūtque ante & post lotionem iri-
no oleo aut nardino aut simili fouēdū. Qui
ob famē febricitant, declināte accessione ad
balneum ducendi sunt, plurimōq; oleo dul-
ci ac tepēte perfusi molliter perfricandi, diu-
tiūsque in solii calidi aqua continēdi. egres-
sis vires reficiendæ, inde rursus ad balneum
ducendi. vbi denuō egressi fuerint, seda-
ta balnei perturbatione aqua calida propi-
nanda, tum prisana cremor exhibendus, &
interdum ex albo iure pisces saxatiles. Si ob

crudelitatem febris diaria oritur, consideran-
dū erit an aluus lubrica sit, an adstricta. vbi
lubrica est, & ea tantum quæ corrupta fuere,
vacuata esse videntur, tum lauandum, tum
nutriendum in remissione febris: sed iis quæ
sunt circa ventriculum, prius consulētes. Sin
ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nūc
etiam in homine duret, vt virtus iam defessa
sit, satius est omissa lauatione cibare, sed con-
sulescentes prius iis quæ circa ventrem sunt. Cō-
suletur autem laborantibus, si modò vacua-
tio amplius non duret, irrigatione ventricu-
li ex oleo & absinthio, & aliis quæ suprà lib.
3. cap. 1. de imbecillitate vētriculi dicta sunt.
Sint autem ea quæ ventriculo imponuntur, Tepida
abunde calentia: quippe quæ tepida sunt, o-
maia ventriculi firmitudinem dissoluunt. Si li robur
verò omnino venter adstringitur, contra dissoluūt
eis hypochondriis, mox toto ventre, consi-
derandum, num cibus in gracile intestinum,
aut in colon descenderit. Si alimenta in ven-
triculo adhuc persistant, conetur æger pluri-
ma tepida aqua epota, immisso digito aut
penna, totum quod in festat, euomere. dein-
de fouendo hypochondria quiescere. At vbi
iam ad intestina alimentum descenderit, iu-
bendum vt decliui facie ac vētriculo recum-
bat: ventérque fouendus, ac somnus cōciliā-
dus. Post somnum ad educenda excrementa
glans supponēda, aut leui clyster e aluus mo-

uenda. Qui ex inguinum inflammatione febrem cōceperūt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed vlceri tantum ob quod inflammatio euenerit, intendentes declinante exacerbatione lauantur. Arcendi verò à vino omnes qui sic febricitant, tenuisque illis victus quousque liberentur, adhibendus. Haftenus quàm breuissimè potuimus febrium diariarum curationē prosecuti sumus: quam copiosius tradit Galen. lib. viii. Ther. meth. & in primo ad Glauconem.

DE DIARIA EX OBSTRUCTIONE MEATVVM. CAP. II.

Febris quę ex stipatione meatuum oritur, eiusdem nature est cum diariis, Galen. lib. 9. Ther. meth. teste: desistit enim post primam accessionē, si quis eam rectè tractet: ideoq; inter verè diarias nō obstante quod eius accessio interdum vltra vnū diem porrigatur, rectè cōnumeratur. Dicitur alio nomine synochus citra putredinem, aut diaria plurium dierum, vt ex loco Galeni iam citato sit euidentissimum. Accidit autem stipatio vel obstructio exilibus meatibus vel conuiuentibus vel etiā corpore ipso immoderatiùs densato, id quod à frigore, aut qualitate vel balnei vel medicamento acerba & adstringente, sole feruente, & aliis quę cutim siccare possunt, euenit. Quia vero propter stipationem intra corpus fumida fuliginosaq; excrementa de-

tinentur plurima, forâs autem quod de iis ef-
 fluit, exiguum est, fit ut febrē accendat. De-
 prehenditur primū tactu: neque enim densi-
 tas tactū exercitatum latere potest. Dein mo-
 tu caloris, qui primo quidē insultu mitis ap-
 paret: postea tamen ubi perdurauerit, acrior
 euadit. Tertiò ex vrina, quæ neque crassitu-
 dine, neq; colore à naturali multum est alic-
 na. Quartò ex tumore corporis, qui manet,
 nec collabitur. oculi etiā nō sunt concaui, sed
 prominentiores, & humidiores quàm secun-
 dum naturam. Quintò ex pulsu qui equalis,
 maximus, celer, frequens, & vehemēs existit.
 Qui ita laborât, si rectè curabuntur, iis san-
 guinis missio est adhibenda. tantūque san-
 guinis est detrahendū, quantū vires tolerant.
 Pro certo quoq; habendum (nisi iis qui hoc
 per naturā sunt habitu, id adhibeatur præsi-
 diū) fore ut vel suffocentur, vel certe syncope
 omnino periclitentur. corpore vacuato, post
 aut nutrimentum aut medicamentum, ex iis
 quæ detergeāt, exhibebis. Quæ autem hoc in
 febribus præstāt, in alimentorū ratione sunt
 ptisana & mulsa: in medicamentorum, oxy-
 meli, & quæcūque incoquere in mulsa licet,
 ceu calamintha, & hyssopum, & origanum,
 & serpillum, & iris, & apium. Verū hæc
 omnia iusto calidiora sunt, ideòq; febres ac-
 cendūt, ita utiq; ut vinum. oxymeli verò so-
 lum nec febres accendit, & strenuè deterget,

Signa.

Curatio.

Detergē-
tia citra.

calefa- sic ut ea quæ glutinosa crassaque sunt, dissol-
tionem uat, & meatus obstructos liberet. Tercio die
mane si videris minimū esse quod de febre
relinquitur, ac neque putredinis humorū in
pulsu nota subsit, neque in vrina cruditatis:
suspecta verò hora, qua primo die febris oc-
cupauit, extra meridiem sit ac præterierit, au-
daçter hominem quàm ocysime lauabis, lō-
gē ante sextam horam. Abunde tamen sit, si
intra tertiam horam lauationem compleue-
ris. Ad eundem modum si decimam horam
suspectam habueris, vsq; ad septimam laues
licet, quum tres æquinoctiales horas, quatu-
orve inter balneum accessionisque tēpus in-
terponi, abunde sit satis. Vbi in balneo cor-
pus incaluerit, oleo prius dulci tepido vn-
ctum, ac moderatissimū frictum, mox deter-
geri extrinsecūs abluique debet. Moderatif-
simum autem detergent erui farina, tū hor-
dei, tum fabarum. Post balneū præter aquā
quæ parū apii incoctum in se habuerit, nihil
his est offerēdum. Licet quod inter balneum
& suspectas horas spatium erit, triū ferè ho-
rarum coniiciamus. Si verò circa vesperā aut
duabus horis citius accessio innadet, tum la-
uisse mane licebit, tum cibasse, sed tantū pri-
sanæ cremore. Deinde si suspectæ horæ nihil
afferant, & lauare rursus si velit licet, & ciba-
re. Sin aliquid eueniat, & cōferendum id est
cum accessione quæ primo die inciderat, &

tum urinae consideranda sunt, tum etiam pulsus. Quae omnia profecto mediocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum & lauabis 4 die, & cibabis, ad iam dictas considerationes spectans, sperabisque nihil quinto die superventurum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarum genere non erit.

DE SYNCHO CVM PUTREDINE.

CAP. III.

Synochus Graecis, febris est in qua una accessio ab initio ad finem perpetuo manens, in multos porrigitur dies. vel est, quae omni mutatione magna usque ad iudicium caret. Latinis potest dici continens. Huius autem febris duplex ex natura. quaedam namque notae putredinis prorsus nullam habet, & haec ex diariarum febrium est genere, ut diximus cap. proximo, & synochus non putrida vocatur. de ea hic nobis sermo non erit. quaedam autem manifestam obtinet putredinis notam: haec est, de qua hic agitur, & dicitur synochus putrida. Febrium vero quae synochi seu continentes dicuntur, tres sunt differentiae. nam quaedam earum à principio usque ad finem aequali magnitudine perdurant, & dicuntur graece homotoni & acmaistici, hoc est in eodem vigore permanentes. quaedam semper augentur, & adiaciunt exiguum aliquid, Graeci anabaticos & epacmaستicos, id est incrementum suscipientes

σύννοχος.

Continens febris.

Differentiae tres

synochorum.

ἁκμαστικοί.

κοί.

ἰπακμα-

στικοί.

παρα-
 ματικοί. nominat. quædā paulatim diminuuntur, pa-
 racmasticos Græci vocāt, hoc est decrescētes,
 quemadmodū fusiū tradit Gal. lib. 9. Ther.
 meth. & lib. 2. de Diff. feb. cap. 2. & lib. 2. de
 causis. crisibus cap. 6. Putrida synochus fit ab iisdē
 causis, à quibus non putrida, nempe à vehe-
 mēti stipatione quæ intra corpus febrilē ca-
 lorē cohibet, & efficit vt in omnibus vasis, ac
 potissimū maximis, equabiliter humores pu-
 tre scāt. quæcūq; enim calida & humida sunt,
 difficilē inq; trāspirationem habēt, ea faciliē
 quoque putrescunt. Hinc est qd hoc genus fe-
 bris nec in gracilibus vel qui raro sunt corpo-
 ris habitu, nec in frigido corporis tempera-
 mento, nec in frigida ætate excitetur: sed æ-
 tate & temperamento calidis: ac præcipuē si
 & carnosus, & bono ac multo sanguine af-
 fluēs, & dēso corpore æger sit, aut etiam cali-
 dis excrementis refertus. Ex his itaque con-
 stat, qd sanguis qui in vniuersis vasis, præser-
 tim maximis circa alas & inguina existētib;
 æquabiliter exuberans putrescit, & synochi
 putridæ causa existat. Qui ita febricitant, iis
 & pulsus maximus est, vehemens, celer, cre-
 ber, & æqualis, haud secūs ac in synocho nō
 putrida, & vehemēs. constitutio etiā arteriæ
 nec durior quàm pro natura ē, nec mollior,
 celeritatis tamen & frequentię eò peruenit,
 quò febris ipsa magnitudinis. Atq; hæc qui-
 dem (vt diximus) ambarū cōmunia. alteri ve-

rò de qua nunc agimus priuātīm putredinis
 insunt notæ, idq; tū in vrina, tū pulsu, tum ca-
 loris nigrata qualitate. Curādi ratio vt in sy- Curatio.
 nocha non putrida, à sanguinis missione au- Sanguini-
 spicāda. Et valida existente virtute, nulloque nis mis-
 alio insigniter repugnante, sanguis vsque ad sio.
 animi deliquiū auferendus. Maximū enim
 hoc, Galen. lib. 9. Ther. meth. autore, vbi va-
 lentes vires sunt, synochi febris remediū est.
 Primū nāq; in cōtrarium statum agitur cor-
 pus, celerrimē ex animi defectu refrigeratū.
 Hoc verò nemo inuenire potest, neq; q̄ ipsis
 egris, neq; quod naturā quē animātes guber-
 nat, iucūdius vtiliūve sit. Postmodū in eius-
 modi corporibus necessariò superuenit alui
 deiectio, nō nunq̄ etiā bilis vomitio. quas res
 statī à toto corpore sudores excipiūt. Quòd Qñ frigi-
 si verò curare aliquando ægrotum cogēris, da adhi-
 cui nō solū antea secāda venæ remediū præ- benda.
 termisū est, sed nūc quoq;, vel per medicorū
 ignorantia, vel ipsius laborātis propinquo-
 rūq; eius timiditatē, procedēte tēpore mitte-
 re sanguinē prohiberis, ad frigidam exhibē-
 dam accedes: sed diligenter antè discernens,
 quantū ex ea nocumētū cōtingere possit. Nā
 si id aut exiguū erit, aut nullū, offerenda po-
 tui est quē prorsus sit gelida, quātū bibere æ-
 gro libet. Quinimo magis id audebis, si fri-
 gidæ potioni insueuerit. Sin magnū timetur
 incōmodum, ab hac quidem abstinendum,

Frigida
quibus
incōmo-
dat.

atq; aliis auxiliis quib⁹ obstructio eximatur,
& abundantia vacuetur, & febris feruor de-
ferbeat, vtendū. Quæ singula è suis locis tibi
petēda erūt. Porro incōmoda quæ frigidam
portionē intēpestiuē immodicēq; exhibitam
sequuntur, hæc sunt. Primū, quia lentos cras-
sōsq; humores, siue obstructiones, siue putre-
dinem, siue phlegmonē, siue erysipelas, aut
scirrhu, aut œdema creauerint, attenuari di-
gerique prohibet. Quoties igitur ex iis fe-
bris accēditur, ad eorum vacuationem frigi-
da data non conducit. Ad præsens tamē non
parum adfert leuamen, propterea quod iam
accensam febrem extinguit: verū quū cau-
sa eius adhuc permaneat, aliam denuo accē-
di febrem est necesse, atque eā quæ præcessit
nonnunquam difficiliorem: propterea quod
densatum ex frigida corpus est. Alterū incō-
modum est, quod multas laborantis imbecil-
las particulas, siue ita se ex naturali intempe-
rie habeat, siue ex vitio adscititio, lædit. Sic
compertum est aliis gulam adeo vehemēter
esse læsam, vt vix deglutirent: aliis ventricu-
lum, vt vix concoquerent: aliis ipsum ventri-
culi os, aut iecur, aut colon, aut pulmonem,
aut septum trāsuersum, aut renes, aut vesica,
aut tale quippiā aliud à frigido percussū,
ad propriā actionem infirmum esse redditū.
Nonnulli autem ex intēpestiua immodicāq;
eius portione, non multo interposito tēpore,

nec postmodum, sed illico difficultate spirandi, & cōuulsione, & tremore correpti sunt, ac toto (vt semel dicam) neruoso genere læsi, vt itaque in pauca rē contrahamus, quibuscūq; in principe particula tumor aliq̃s phlegmonodes, aut œdematodes, aut scirrhus cōstitit, iis frigidā offerre non oportet: sed nec iis quibus obstructio putridūve humor nō cōcoctus incommodat. Quod si verò euidentes percipis absque iam dictis tumoribus cōcoctionis notas, neque pars aliqua tēperamento adeò frigido fuerit prædita, vt in hanc noxa procūbat, audacter frigidam dabis. quippe solidarum animalis partium natura roborata, prætenuatis iā humoribus opponitur: ita vt qui viles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidē ad se trahat, inutiles vel per vētre, vel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigide assuetus eger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iā edoctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare. omnino nāque si quod frigidū adeò esset, vt ab hac offēderetur, per sanitatis id tempus euidenter offensam suam ostēdisset. Ex iis perspicuum fit, cōtinētium **Epilog^o**
 febrium maxima remedia esse hæc duo, san **curatio-**
 guinis detractionem, & potionē frigidā. **nis.**
 rū illa nullo non tempore, modò vires sustineant: hæc quum & in pulsu, & vrinis cō-
 ditionis euidentes cernūtur notæ. febris autem

Victus
ratio.

est maxima. victus ratio hæc potissimum sit. His quibus secta est vena, post duas à sectione horas ptisanæ cremorem exhibebis, quicquid tamenque imperabis. vbi à somno excitati fuerint, rursus ptisanæ cremor præbendus. In hac victus ratione usque ad tertium diem persistendum. Animaduertendum tamen in synochis febribus tum alendos esse egros, quo tempore sani consueverant, & vbi maius leuamentum sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si vires robustæ fuerint, & vigor morbi statim expectetur, tenuissimo victu, & eo qui iam dictus est, utendum erit: sin contra vires imbecillæ fuerint, haud sine ingenti dispendio victus tenuis exhibetur. ergo in cibis offerendis virium robur diligenter perpendendum. Hæc de curatione febris continens putridæ sufficiant. plura si desideras, nemo desiderio tuo rectius satisfacit præter Galenū, qui libro 9. Therap. methodi hanc ex professo & copiosissime docuit.

DE CONTINUIS FEBRIBUS. CAP. IIII.

cōtinua
febris
quid.

causa.

Cōtinuæ febres sunt, quæ non desinunt ad infebricitationem, remissionem tamē in singulis accessionibus habēt. Differūt igitur à synochis, quod scilicet hæ nullam prorsus feruoris remissionem obtineant, vnicāque illis sit accessio, quæ ab initio ad finē usq; perpetuò manet. Fiunt propter humores qui in-

tra vasa putrescunt: hâcque ratione ab inter-
mittentibus differunt, in quibus humores eas
excitâtes per singulas corporis partes disper-
guntur. quò fit vt delationis impetu ipsæ per
se ipsas expurgentur. Nullum certius indicium **Signa.**
februm continuatum est, quàm quòd nulla
illarum ad infebricitationem perueniat, do-
nec ex integro desierint. Atque à synochis fa-
cile discernuntur per remissionem, quam in sin-
gulis accessionibus obtinet. Sunt autem febrium **Differē**
continuarum tres differentiae, quæ iuxta hu- **tia tres**
moris in venis putrescentis diuersitatem pro- **februm cō**
creantur. Si enim flaua bilis putrescat intra va- **tinuarū.**
sa, tertiana continua, quæ alio nomine caufos **καυσος.**
Græcis, ardēs verò Latinis nominatur. Sin pi-
tuita, quotidiana continua: veluti si atra bilis,
quartana continua nascitur. vnde liquet, conti-
nuas febres idem habere genus cum intermit-
tentibus. cum tertiana quidē exquisita, exqui-
sita ardēs: cum quotidiana verò, ea quæ quoti-
die quidē facit accessionem, sed nunquā desi-
nit ad infebricitationē. cum quartana illa quæ
quouis die inuadit, sine vlla intermissione.
Porro quum continuæ febres ex putridarum **Curatio.**
sint genere, necesse erit vt qui illas curare vo-
let, putredinem inhibeat. Ita duæ statim se in-
ditationes exhibet, quarum altera à febre, al-
tera verò à putredine sumit. Atq; à febre rur-
sus duæ, scilicet vt portio febris quæ iā accē-
sa est, percuretur: quæ verò in generatiōe est,

inhibeat. Aliq̃; duæ à putredine, vt & quod putredinis iam factū est, sanemus, & quod in generatione adhuc est, sistamus. Porro quod in generatiōe est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoque aliæ duæ indicationes nascentur, tum vt quod retētum est vacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur. Sanè prohibebitur iis præsiidiis, quæ obstructioni medentur. Huius rursus obstructionis quod iam occupauit, sanandum est: quod futurum est, propulsandum. At curabitur quidem obstructionis quod iā factū est, per ea quæ obstructa liberāt. propulsabitur quod futurum est, si affluxū obstruentium succorū cōpescamus. vnde satis liquet, quod vltimum in ipsa resolutiua methodo est inuētum, id primum omnium in curatione esse peragēdū. Quum itaq; particulatim rem expendentibus, quin que sint in febribus continuis à quibus indicationes colligūtur, febris nimirū, putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum destruentium copia, à postremo curādi ratio auspicanda erit. Copia itaque humorū requirēte vacuationem, principio, si valida fuerit virtus, tempus & ætas, atque alia consentiāt, sanguinem mittere oportet. vacuata multitudine, ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisque iis quæ obstructiones tollere possunt vtendū. verūm quoniam horum plerāq; calida sunt, metus

Venz se-
tio.

est, ne tum putredinem, tum febre augeat. Itaque iis quæ citra calorem liberare ab obstructionibus valeant, utemur. Qualia verò hæc sint, diximus suprà, capite nimirum secundo huius libri. ubi autem quæ obstruunt deterfa dissectaq; sunt, per aluum, urinas, & sudorem ea vacuare têtandum. Quum verò materiæ, quæ hæc efficiat, etiam calide sint, necesse est interea tum putredinem tum febre augeri. Quare quoad licet, id agendū, ut quæ minus calefaciat materia deligatur. aut si qua inueniri potest quæ nō calefaciat, quæadmodum in hoc casu balneum, utique ea petenda est. balneū verò id posse Galenus lib. tertio de tuenda valetudine iis verbis docet: Dulcium cale ,, factarum aquarum, si tepidiores sint, vis hu ,, mida & frigida est. Et paulò pòst: Balneū si ,, probè adhibeas, duras tensasq; partes emol ,, lit, excrementū, putréq; si quod intus ad cu ,, tē hæret, euocat. His itaq; peractis, & deter- ,, sis iis quæ cuti impacta fuerūt, atq; adeò ob- ,, structione ac impedita perspiratione amota ad putredinis curationem veniendū est. Hoc itaq; tēpore etiam vires roborare, quò & pu- ,, tredinē superent, & succos concoquāt, stude- ,, bimus. Putredinē etiā sanabimus, si id quod iam corruptū est, omni ratione vacuabimus: quod reliquum est, moderatis motibus & re- ,, frigerante perspiratu, ad exactam mediocri- ,, tatem reducemus, ac vacuationem eorum

per urinam, deiectiones, vomitū, ac sudores molimur. Vltimò ad febris curationē progrediendam, quæ quidem per refrigerantia fieri solet. omnis enim febris, quæ febris est, humectatio refrigeratioque remedia sunt. Quemadmodum autem horum quodq; recte fieri debeat, partim antea dictum est, partim etiam in sequentibus commemorabitur.

DE ARDENTE FEBRE. CAP. V.

καύσος.
causa.

Ardēs febris est, quæ Græcis (ut suprà quoque dictū est) καύσος vocatur. Estq; ex genere continuarum. Fit, quando flava bilis in venis putrescit, atque adeò cum tertiana intermittente, eo quòd ab eodē procreetur humore, communicat. Differt autem, q̄ in hac per totum corpus bilis defertur, in ardēte autem febre flavæ bilis humor in vasis vnà cum sanguine continetur. atque ob eā etiam causam in ardente febre singulæ accessiones ad infectionē non perueniunt. Quando verò in iis bilis etiā vehemētius agitur, & à natura inualecente compellitur, tunc rigor superuenit, & febris soluitur. Id quod Hippocrates ī Aphorismis iis inuere verbis voluit.

4. Aph.
58.

Signa.

” A febre ardente habito, rigore superueniente, fit solutio. Dignoscitur verò iis notis. Lingua eorū qui hac febre affliguntur, arida fit, crassa, aspera, & nigra: vētriculi erosio, sitis intolerabilis, vigiliæ, nonnunquā etiam delirium eodē infestat. Deiectiones etiā pallide sunt.

Quod ad curadi rationem attinet, prima fe- Curatio.
bre ardente laboratium praesidia sunt, ut de-
cumbat in frigido loco ad suauem auram ex-
posito, à qua purus diffletur aer, culcitra etiā
molli, quae frequenter sternenda est. Stragula
tenuissima sint, & minimè sordida. quae assi-
duè mutantur, habeatque lectus insignem la-
titudinē, ut ad diuersas subinde partes mem-
bra calefacta trāsserri cōmodè queāt. Tum
aer ignauior flabello excitetur: pectus ac sto-
machus foueantur palmulis cū rosaceo, aut
oleo cotoneorū tritis. cōueniunt & alia refri-
gerantia medicamēta, ut sunt palmītes, inty-
bum, polygonum, plantago, ramēta cucurbi-
tae, lactuca, oxalis, folia vitis, & similia. Suda-
riolum quoque tenue complicatum, oleoq;
& aqua calentibus madefactū, stomacho &
pectori applicetur: id enim febriū ardorem
mirum in modū sedat. lana quoq; quantum
manu capitur, aqua & oleo rosaceo calefa-
ctis imbibita ē sublimi in pect^o expressa fer-
uoris vehemētiā facilè obrūdit. Hec autē ca-
lida esse oportet. nā tepida membrorū vigo-
rem exoluunt. Nec frustra in ardētissimis fe-
bribus etiā acetum admiscebis. Cibi offeren-
di sunt, quibus refrigerādi & humectādi vis
inest: qualis est lactuca, cucurbita, cremor pti-
sang, & similes. Potus sit decoctū cinanomi,
aut omphacium. & si assueuerit eger, post ci-
bum frigidam deglutiendā dato, quantū est,

Tepida
membro-
rū vigore
exoluūt.

cochleare vnū, aut duo: vel cū decocto hor-
dei misceantur iuleb, vt vocant, violarū, rosa-
rum, & iis similia. succo prætereà solarū rosa-
rum stomachum recreabis: atq; alias refrige-
rationes machinaberis, virentibus vitis, rosa-
rū, nymphææ, violarum foliis & floribus, so-
lum sternendo, & aquam frigidam sæpius ir-
rigando, riuulósque aquarū moliendo, quæ
Venæ se- ex propinquo suauiter instrepant. Inter ini-
tio. tia verò statim, si ætas, tempus, virtus, & alia
eiusmodi permiserint, venam incidere oportet, vt ex capite præcedēte etiam satis liquet.

Epithe- Epithemata verò & reliqua refrigeratiā in
mata principiis & incrementis accessionum non
quo tem- sunt adinuenda: hoc enim tempore corpo-
pore ad- ris affect⁹ adhuc ambigit, & calor viscera ob-
hibēda. fider: quapropter adhibita calorē in profun-
dum repellendo, maioris nocumēti occasio-
nem præstant. igneus enim calor intus repres-
sus, vehemētiori rursus ardore excitatur: sed
in vigore, calore iam per vniuersum corpus
explicato. tum enim residuum caloris præter
naturam circaviscera derelictū, promptē ex-
tinguetur. Hinc egri melius spirare incipiūt,
& leuiori siti infestātur. Quidam etiam rori-
do efflāte vapore deliniti, somnū capessunt.
Sint autem epithemata eiusmodi, quæ R. suc-
ci rosarū, lactucę añ ꝑ iii s. succi intybi dome-
stici ꝑ ii s. aceti optimi ꝑ i s. santalorū omniū
Epithe- añ 3 i. capburæ gr. iiii. misce, fiat epithema.

Porro instante totius morbi vigore, & nullo
 eorum quæ dicta sunt cap. 3 prohibente, dan
 da syncera frigida. In curatione siquidem fe
 do dāda.
 brium ardentium, horū alterum fieri necessa
 riū est, si perfectè morbus solui debet: aut bi
 liosos humores excerni, aut eosdē extingui.
 Excernūtur itaq; per venæ sectionē, sudores
 vomitiones, & aluum. Extinguuntur autē fri
 gidæ potu, quo ardētissimæ febres nō rarò ex
 toto curātur. Ceterū balneū his solū vsui est,
 qui citra tumore inflammationi aut erysipe
 lati consimilem, ardenti febre laborāt, in vri
 nisq; apparuerint coctionis signa. Aeger qui
 lauacro frigido vti vult, sit iuuenis, carnosus,
 tempus quoque æstiuum, ac constitutio anni
 calida & sicca: nec eo vtatur nisi ī febris vigo
 re: idq; maxime faciat, si frigidæ lotioni as
 sueuerit. Moderatori verò existēte febre, ro
 bustaq; virtute, simul cū coctionis notis, con
 ferūt dulcis tēperatæq; aquæ balnea: hæc enī
 refrigerant & humectāt, vt diximus. Ex vn
 ctionibus chamæmelinū oleum etiam, si cō
 tinens aēr frigidus sit, conuenit. Materiæ ex
 qua remedia ardentium febrium cōponun
 tur, copiam ex sequentibus petes capitibus.

Balneū.

DE EXQUISITA INTERMIT
TENTE. CAP. VI.

Tertiana quidē febris intermittēs exqui- Tertiana
 sita est, quæ ex flaua bile per sensiles corporis exquisi
 partes delata oritur, & sui ipsius naturā purā ta.

A

atque sincerā seruat, & dignoscitur iis notis.
 Signa. In biliosioribus naturā corporibus consistit,
 & vigēti ætate, tempore æstiuo, calidis & sic-
 cis regionibus, similique; aëris cōstitutione, vi-
 ta etiā laborib⁹, vigiliis, curis, ac foliis feruo-
 ri addicta. Ad hæc in eo quoq; facile tertia-
 na exquisita accenditur, qui cibis ac potioni-
 bus calidis & siccis antea vsus est. Hæc etiam
 statim ab initio inque singulis accessionibus
 rigorem vehemētem affert: qua vna ratione
 ab ardente febre, vt antea commemoratū est,
 Quarta - differt. A quartana verò rigore in hoc distat,
 næ rigor quòd corpus pūgere, ac veluti vlcerare videat
 quo di- tur: cum quartana refrigerationē habeat si-
 fter à ri- millimam ei quę hyberno tempore sentitur.
 gore ter- Tertianam itaque febrem non contingit fie-
 rianā. ri sine rigore vehementi, pungente ac vulne-
 rante carnē. Quartana verò, neq; primo die
 statim cū rigore inuadit vehemēti. nam pro-
 grediente ipsa atque aucta, vnā etiā rigor au-
 getur: sensusque egrotantiū non est quasi co-
 rum qui punguntur, sed potius qui refrigerā-
 tur, & veluti ad ossa vsq; molestatur. Est quo-
 que in tertianis pulsuum exactus ordo & æ-
 qualitas, qui tamen ad vehemētiam, magni-
 tudinem, & frequentiam in accessionū incre-
 mento excitatur. Præterea & sitim in vigore
 inuehit, ac hominem exurit, vt abiectis vesti-
 bus æger denudetur, amplēque & frequenter
 spiret, exuffletq; veluti flāmam, frigidāq;

potandā flagitet. calor equaliter subinde per totū corpus extenditur, nihilq; magis thorax quā extrema calent. Et si manū inieceris, occurrit primum plurimus ac mordax calor, & cū aliquo veluti vapore elatus. nō multo tamen postea à manu euincitur. Et iam bibendi tēpus adest ægrotādi. vbi verò portione fuerit recreatus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit, sudoris nuntia. Bilis etiam vomitio superuenit, aluiq; soluitur, & biliosum mingunt. præterea ad integritatē infebri citationēve desinit, vbi accessiois tempus horarum nō plurium duodecim expедierit. nam hoc tempus lōgissimum est in veris tertianis. Quæ singula fusiū explicat Galenus libro 2. de crisib. cap. 3. Tertianum autem exquisitā, vt quæ ex flaua bile cōmota inualescat quā maxime fieri potest, refrigerare ac humectare oportet. is enim humor inter omnes qui in corpore sunt, calidiōrque sicciorque existet. Ager itaque decumbat in loco frigido ad auram suauem, vt cap. 5. etiam dictum est, exposito. Solum etiam spargatur frequēter aqua frigida, aqua stillatitia rosarum, violarum, & similium. Humi etiam sternātur folia salicum, vitis, flores rosarum, violarū, nenupharis, ac eiusmodi. Cibis vtantur ægri, quibus humectādi & refrigerādi facultas inest. ex oleribus quidem atriplici blito, malue, lactuca, cucurbita, lapatho, inty-

Tertiana ex-
quisita
curatio.

A ii

bis, & similib⁹. Ex aliis verò ptisanę succo, & piscibus saxatilibus. Ex volatilibus, quę mol libus constant carnibus. Quę verò talia non sunt. eorum alis: testiculis quoq; gallorū, suil lĩsque pedib⁹ & cerebro. Porcellorum etiam si dederis carnem liquefactā, nihil nocebis. Sed & ova ad sorbendum sunt offerēda, p̄sertim vitelli eorū: nā hi facilius quā pars alba concoquuntur. Ex fructibus permittendum, vt illos degustēt qui nō omnino ad cōcoquendū difficiles sunt. Abstīnēdū autem à melle, sinapi, salitis, omnib⁹sq; acribus. A vino verò, antequā morbus cōcoquatur, omnino arcendus eger. Interim bibat decoctū cinamomi, aut hordei, aut hoc quod R̄ zula pii violacei 3 iiii. decoctionis cinamomi lib. i. misce, fiat potio. Cæterū vbi cōcoqui cœperit morbus, dandum est ab initio vinū tenue, aquosum, & paucum: vbi verò iam prope est vt morbus solvatur, amplius est offerēdum. Quod ad somni rationē attinet, in accessione non est dormiendū, sed vigilādum potius, vt sanguinis, spiritus, & caloris naturalis ad interiora motio impediatur, atque adeò in contrariū & ad exteriora retrahatur. aliàs enim febres vix dissoluuntur, & ad consistēdi tempus tardissimè perueniūt, fluxionēque multiplicātur. Finita accessione somnus non improbatur. Exercitia & omnes vehēmentiores motiones cauendæ, ne cū Hero-

Potus.

In accessione nō dormiendū.

dico, cuius Hippocrates meminit, ægrotâtes interimamus. Animi perturbatiões, ira potissimum, timor, mœstitia, & similes, fugiendæ. Non solum verò prædicta victus ratione, sed medicamentis etiã refrigerare & humectare cõuenit. Quapropter hæc aut cõsimilis potio haurienda erit, quæ R̄ florũ violarũ, boraginis, rosarũ añ m i. florũ nymphææ m s. intybi hortẽsis vtriusq; (endiuiam & scariolã hodie vocãt) lactucæ vtriusque añ m i s. passularum purgatarum § i. prunorũ damascenorum numero xi. seminum intyborũ, lactucæ, portulacæ, cucurbitæ añ 3 iii. radicũ cichorii 3 vi. Decoquantur singula in duabus libris aquæ fontanæ, donc tertia pars cõsumpta fuerit. dein colẽtur, & colatus humor saccharo dulcescat, & cũ oui candido clarificetur, atq; adiiciantur syrupi de intybo domestico latifolio, zulapii violacei añ § ii s. fiatq; potio. Aut si potio ægrotanti displicet, detur hoc eclegma, quod R̄ conseruæ violarũ, boraginis, rosarũ, nymphææ, cichorii añ § s. diaprunorum non solutorũ 3 vii. diarhodôn abbatis § i. specierum diatria santalorũ 3 ii. cum zulapii violaceo quod satis est, fiat eclegma. Non negligenda prætercã biliosi humoris, si res ita exigat, vacuatio: sed eum sanè qui ad stomachũ cõfluit, per vomitũ educere oportet. Quæ uero ratione sit ciendus, in superiorib. libris est annotatum. Eũ aut: m qui ad inferiora repit,

Decoctũ
alterans.

Eclegma.

Euacuatio.

A iii

- alui deiectionibus elicere oportet: hoc quidem & sponte fieri solet in tertiana exquisita. Alius itaq; mollientibus clysteribus exinanienda est: qualis est qui R^x maluæ vtriusque, herbe violarum, mercurialis, intybi domestici, angusti folii, hoc est scarolæ, añ m i. seminum portulacæ, melonū añ 3 ii s. Decoquantur in aqua iustę quātītatis, quoad tertia pars absumpta fuerit. Colaturę adiciatur casię fistularis recens extractę ℥ i. olei violacei ℥ iii. salis cōmunis 3 i s. misce, fiat clyster. Per urinam quoq; & sudores diuertere oportet. Urina igitur potionibus, in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocāda. Et si coctionis notæ apparebunt, iam tutò absinthiū dabis: quòd alioquin summum est ventriculi remedium, vbi bilis hunc infestauerit, si præsertim ex ipsius coma quantū sufficiat accipies, melicrato intinxis, Sudorem verò hoc vel
- Clyster.**
- Absynthium.**
- Sudorem prouocans.**
- consimili medicamento euocabis, quod R^x radicū apii, asparagi, cichorii, añ ℥ s. seminum oreoselini, fœniculi, rusci, smyrnii añ 3 ii. ciccerū nigrorū 3 iii. anethi m. s. Decoquantur singula in aqua fontana iustę magnitudinis, colētur subinde, & colatus humor saccharo dulcescat, & adiciantur oxymelitis compositi ℥ ii. & fiat potio. Aut singula iam dicta redacta in puluerē exhibeantur, qualibet vice 3 i. aut 3 i s. cum oxymelitis ℥ iii. Id ipsum verò in declinatione accessionis, aut die qua æ-

ger à febre liber est, faciendum erit. In hunc
 vsum proderit inunctio ex oleo chamæmeli-
 no & anethino, ac similibus. Balnea quoque **Balneum**
 calida ex aqua potabili profunt, tū quia ali-
 quid bilis educūt, tum etiam quia sua quali-
 tate plurimū iuuant. Nā huiusmodi bal-
 nea humectant, & potentia refrigerant. Ma-
 rinæ autem aquæ, & salæ, nitrosæ, aquæ sul-
 phuræ, plus quidem bilis educunt: sed mul-
 tō minus, quā potabiles, profunt. Præstat
 verò neque ipsas vtilis dicere, quandoquidē
 plus qualitate nocent, quā euacuationibus
 iuuent. Semper autem oportet contrarias **Cōtrariæ**
 qualitates illis quæ præter naturam inualue- qualita-
 runt opponere: quum hoc multo plus iuuet, tes illis
 quā quomodolibet euacuare. Hæc igitur quæ præ-
 in balneis intentio sit, vt corpus madeat & ter natu-
 humectetur atque idcirco neque nitrum, ne- rā oppo-
 que salem, neque sinapim inspergere oportet nendæ,
 at plurimum oleo calido perfusos ægros ad
 aquam perducere, ac madefacere. Et si in ea
 natate voluerint, quandiu potuerint permit-
 tendum. Atqui balneis admodum delectan-
 tur, si etiam bis in die lauari permiseris, non
 aberrabis, vt Galenus perspicue libro 1. ad
 Glaucon cap. 9. docet. Verū illud semper
 in memoria habeto, vt id in tempore faciāt.
 Si verò signa iam coctionis ostendantur, tūc
 etiam si sæpius laueris, nihil deliqueris.

A iiii

DE TERTIANA NOTHA. CAP. VII.

Causa
Signa.

Tertiana notha fit, quando bilis maxima ex parte pituitę miscetur. Hinc est quod non singula signa, vt in exquisita, purę bilis naturam præ se ferat. In ea etiã accessionis tēpus duodecim horas excedit: neq; etiã, vt exquisita, septenis circuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipsa spuria tertiana coctiōis notæ apparent, neq; tantus etiam in vigore calor. Accedit q̃ non finiatur, vt exquisita, sudoris copiã. Viētus ratio nō sit in vniuersum in hac febre, quæ refrigeret atque humectet: sed aliquid quoque assumat quod calefaciat & incīdat. præiacet enim crassior, neque adeo calida bilis. Plurimū igitur ea laborantes iuuat ptisanæ cremor, adiecto piperis modico, vel hyssopi, vel origani. Sorbitiones etiam concoctu faciles dandæ sunt. Porro cum accessionis tempus longius sit, atque adeo integrum diem duret, non sanè quotidie, sed alternis tantum diebus cibum exhibere oportet. hac enim ratione ne morbus augeatur cauebimus. Verum curandum etiam vnicē, ne ægrotantis vires, quæ longiori tempore debent laborare, prosternantur. Quapropter difficile admodum est seruare vtrūque, quoniam inedia quantum profunt ad morbi coctionem, tantum vel plus officiunt viribus: cibi verò quantum ægroti robur adaugent, tātum coctiones impediunt. Quare in-

Viētus.

edia quidem, vbi valentiores fuerint vires,
 & morbus concoctu difficilis fuerit, vtendū.
 largiori verò cibo, vbi vires sint imbecillio-
 res, neq; morbus concoctu contumax. Potus
 fit decoctum cinamomi, aut hordei, in quod
 (vt dictū est) aliquid hyssopi aut origani in-
 iectum sit. Quies etiam conducit. Quod ad **Curatio.**
 curandi rationem attinet, si sanguinem mit-
 tere opus est, neque hoc omittendum, sed ab
 initio statim adhibita etatis, temporis, regio-
 nis, habitus corporis, & similium distinctio-
 ne: tantumq; sanguinis detrahendum, quan-
 tum præsens exigit status. Clysteres quoque **Venæ se-**
 non admodum molles iuuant, qualis est qui **ctio.**
Clyster.
 R̄ maluæ, mercurialis, foliorum violarū, ori-
 gani, hyssopi añ m i. cartami p. ii. coquantur
 singula in aqua iustæ quantitatis. Colaturæ
 adiciantur benedictæ laxatiuæ vocatæ, hie-
 ræ picræ añ 3 iii. mellis rosacei 3 vi. oleorum
 violacei, chamæmelini añ ̄ i s. salis cōmunis
 3 ii. fiat clyster. Ceterum danda etiam deco-
 cta, quibus ea insunt quæ citra plurimā cale-
 factionē & exiccationem incidere & vrinari
 ciere possunt. cuiusmodi est id, quod R̄ radi-
 cum apii, fœniculi, cichorii añ ̄ i. intybi do. **Decoctū.**
 mestici vtriusque, origani, hyssopi añ m i. la-
 tuæ m i s. seminum quatuor frigidorum
 communium añ 3 i. seminum fœniculi, apii
 añ 3 i s. Decoquatur in aquæ lib. 2. donec ter-
 tia pars absumppta fuerit. Colatus humor dul-

- Purgatio** cœscat saccharo sufficiēti, & oui albuminib⁹ purificetur, ac subinde adiciatur syrupi acetosi simplicis, mellis rosacei colati, oxymelitis simplicis añ ꝑ i s. & fiat potio. Posthæc ea quæ vêtrem placidè subducunt sunt exhibenda, vt dilutum rhabarbari, eclegma de psilio, indi appellatum: & alia eiusmodi, quæ bilē cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris sunt annotata. Post septimum diem iugiter decoctū comæ absynthii dandum est. Mu'tos quoque iuuat oxymeli se solo potum. Vomitus autem à cibo adco' itis quibus hæc febris perdurauerit utilis est, vt multi, Galeno libro 1, Methodi medendi ad Glauconem teste, hoc vno præsidio statim fuerint curati. Hypochondria quoq; calidis fouēda sunt medicamētis, vt scilicet flatus, qui ea distendunt, discutiantur. Cōuenit verò hoc potissimum fomentū, quod R^x florum chamemeli, meliloti, anethi m i. absynthii m s. rosarum rub. p. i. seminum fœ nigreci, lini añ 3 iii. Bulliant singula in aqua sufficiēti, donec tertia pars cōsumatur. Dein spōgia in hac madefacta, hypochondria foucantur. Poterit etiam ventriculus hoc aut simili vnguēto inūgi, quod R^x olei mastichini, rosacei, chamæmelini añ 3 iii. Pulueris gariophyllorum 3 i s. ceræ quantum satis est, fiat vnguētū. Cæterum in tertianis non exquisitis, neque statim circa initia balneare expe-
- Vomitus**
- Fomentū**
- Vnguentum.**
- Balneum**

dit, sed quum primum notæ coctionis apparuerint.

DE QUARTANA. CAP. VIII.

Alterum genus febrium intermittētium est exquisita quartana, quæ ex solo atræbilis humore putrescente generatur. Hæc quidē non primo statim die cum rigore inuadit vehemēti, sed talis est qualis iis qui vehemēti gelu frigesūt. Progrediente autē ipsa atq; aucta, vnā etiam rigor augetur, inualescitq; quotidie vsq; ad totius morbi incrementum, sensusq; eius non pūgentis stimulantisve cūtem, sicut in tertiana, sed vehementem algorem inducentis, & tanquā ossa frangentis est. Pulsus ī ea satis tardi sunt ac rari, caloris motus, incrementum & vigor tertianis febribus contraria sunt. In ea enim humor paulatim veluti lapis aliquis, aut testa, aut os, aut tale aliquod huiuscemodi corpus frigidū & siccum succenditur. Vbi verò aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil fumidum, aut à se incombustū in accessione relinquit. Atque idcirco in hoc humore longiores sunt cessationes, quam in pituita, atque intermissio exquisitè pura videtur: quoniam hic quicquid atræ bilis fuerit accensum, exhauritur, atque dispergitur. Bilis præterea flauæ vomitus quartanam non comitatur. vrinæ, tan-

Causa.

Signa.

quàm per crassiorē materiam excolatæ, sunt
 tenues, albæ, & aquosæ. Adhæc in autumnō
 potissimum incipit, erraticis superueniens fe-
 bribus. Cæterum inspicienda & laborantis
 natura seu temperamentum, victus ratio quæ
 antecessit, regio, ætas, & alia eiusmodi. Si enī
 frigida & sicca fuerint, tunc certius quarta-
 nam futuram sperabimus, potissimum ubi co-
 tempore quartanæ febres populariter vaga-
 buntur. Porro quod ad curandi rationem at-
 tinet, quartana laborātes initio moderatè &
 leniter tractandi sunt, neque vllō forti medi-
 camento, aut euacuatione irritandi: nisi fortè
 sanguis vehementer exuperare videatur. tū
 enim sanguis auferendus. Et si venā incisā, de-
 fluēs sāguis niger ac crassior fuerit, audaciū
 mittendus est. Quod si verò flauus aut tenuis
 apparuerit, statim supprimendus. Venā verò
 secare oportet lienarem vocatam, aut quæ est
 in sinistro cubito, mediam. victum institue-
 re conuenit optimum, cum nimirum qui mi-
 nimè flatuosus sit. A suillis itaque carnibus ar-
 cendi sunt egri, atq; ab omnibus eduliis quæ
 viscida ac tenacia sunt, & tardum habēt exi-
 tum, atq; ab omnibus quæ refrigerāt & exic-
 cant corpus. vtendum vero est volatilibus
 montanis, quæ boni succi sunt, & non in pa-
 ludibus degūt. piscibus etiam qui molli car-
 ne tenacitate carente præditi sunt. Salsa etiā
 & sinapi in cibo, vt incidantur & extenuen-

Curatio.

Venæ se-
ctio.Victus ra-
tio.

tur humores, adhibenda sunt. Vino vtendum est albo ac tenui, & mediocriter calido. A frictionibus autem & deambulationibus, & aliis hominum consuetis studiis non sunt penitus prohibēdi. A balneis tamen si possunt, omnino abstinēat, frictionibus dūtaxat adhibitis. Et si breuis, nec admodum violenta quartanę accessio fuerit, nihil nocebit si diebus inter accessionē mediis ad consueta exercitia se transferant. Cæterum clysteribus quoque vtendum, à principio quidem molli-
Clyster.
 libus, postmodū verò acrioribus. Molles ex præcedēte capitē petes. paulo acrior hic est, qui R̄x malug, chamæmeli, mercurialis, foliorum violarum añ m 3 i. folliculorum senæ, polypodii añ 3 v. hæmionitidis m i s. Decoquantur in aqua iustę quantitatis. Colati humoris accipe lb i. & adice casie fistularis ℥ i. eclegmatis diasenæ ℥ s. olei communis ℥ iii. mellis rosacci ℥ s. salis gemmæ nominati 3 i. fiat clyster certis etiam diebus dandum medicamen quod diatriōn pipereōn vocatur. Imò recte fecerint ægrotantes, si quotidie piper cū aqua biberint, Galeno lib. i. ad Glauconem autore. Hæc quidem in principio & augmento potissimum sunt facienda. si verò in vigore morbi ægrotus esse videatur, tunc tenuiorem victus rationem adhibere conuenit, quàm antè vel postea. statim verò præci-
 piendum, vt in longum tempus quiescat, ac

visceribus prouidendū vnguēdo, illinēdoq;
his quæ mollire ac laxare possūt: qualia sunt
quæ ex farina hordeacea, semine apii, iride,
cumino, ruta, & iis similibus cōponūtur. in-
ter cētera verò hypochondrium finistrū hoc

vnguētū vnguēto erit vnguendū, quod R̄ olei de cap-
paribus 3 iii. oleorum irini, amygdalarū dul-
cium añ 3 ii. Seminis apii, cumini, radicis iri-
dis añ 3 i, ceræ quod satis est, fiat vnguentū.

vrinam Posthæc vtendum medicamentis quæ ciendi
cientia. vrinā vim obtinent. in quem sanē vsum mul-
sa propinanda, in qua anethum, aut ruta, aut
apium decoctū sit. mox si coctionis notæ ap-
paruerint, purgandum medicamentis, quæ
atram bilem euacuant: idq; non semel tantū,
sed sæpius, si fuerit necessarium. Qualib⁹ au-
tem medicamētis purgantibus vtendum sit,
libro primo in cap. de melancholia expositū
est. Laudat tamen præter alia Aëtius, vinum
dulce infusum in colocynthidis cauitatem,
sic tamen vt illi admisceatur quidpiam apii,
aut dauci, iucunditatis gratiā. Vtendū quoq;

vomitus. vomitu à cibo. Et si nihil prohibuerit, ellebo-
rus albus est exhibendus, primum quidem
permixtus raphanis: vt in superioribus ostē-
sum est libris. qđ si nihil fecerit, ellebor⁹ ip-
se. Quòd si quispiā ab elleboro abhorruerit,
hoc aut simili vti poterit, quod R̄ succi ra-
phani ʒ iiii. oxymelitis simplicis ʒ ii. misce,
ac tepidū bibendū exhibe. Qui verò nequeūt

euomere, hi per inferiora purgādi. A purgatione dandū medicamentum ē viperis, quod theriacam vocant: aut illi facultate simile. Quicūq; inter morbi initia, aut omnino ante vigore, aliquod ex iis medicamē exhibēt, quartanam quæ simplex erat, sæpius duplicē faciunt, aut omnino maiore difficiliorēque. Ex duplici autem triplicem, vel prorsus ambas maiores difficiliorēque reddunt.

DE QVOTIDIANA. CAP. IX.

Quotidiana febris intermittēs ex pituitæ putredine, per sentiētes corporis partes à natura detrusa, ortum habet. Dicitur amphimerina græcis, quod amborum diei scilicet & noctis particeps sit. singulis enim diebus accessiones facit, quæ ad infebricitationem ac integritatem non desinunt, occupantq; ferè decem & octo horarū spatium. His verò potissimum signis dignoscitur. Haudquaquam cū rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quàm rigor occupat. pulsus, quum primum accessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, parvus ac debilis. neque verò in augmento motus velocitas, magnitudo, atque vehementia quotidianis adsunt. calor non tam acris ac vehemens, vt in tertiana: neque enim adurit ægros, neq; multū & crebrò spirare cōpellit, ac veluti flāmā ex ore efflare, vel frigidā ex-

petere : sed humidus ac fumosus cum multo
 vapore commixtus. A Egrè quoque accendi-
 tur, ac longum consumit tempus, dum inua-
 lescendo peruenit ad summum. Minimè de-
 nique qui sic febricitāt, sitiūt: quòd non dū-
 taxat lingua, imò totum corpus. in hac febre
 humidissimum sit. Urinæ in quotidianis vel
 albæ, tenues, & aquosæ: vel crassæ, aut turbu-
 lentæ. Nullus omnino sudor in primis dieb⁹
 erumpit, neq; vnquā exacta febriendi quies
 attingitur. Vomitus etiam pituitosi iis acci-
 dunt: & quæ per aluum excernuntur, frigi-
 diora & humidiora, crudiora, aquosiora, &
 pituitosiora sunt. Vniuersum quoque corpus
 in hisce febribus plenum crudis humoribus
 inuenitur. Cæterum quotidiana febris humi-
 das pituitosāsve naturas maximè infestat.
 Hyemis quoque tēpore, humida & frigida
 constitutione, senili ætate, & puerili, his deni-
 que qui ocio plurimo dediti sunt, crapulis,
 ebrietatibus, balneis assiduis, post cibū præ-
 fertim vtuntur, quotidiana febris facilè acci-
 dit. Quæ singula indicia Galenus fusiùs lib.
 1. ad Glauconem cap. 7. & lib. 2. de Diff. feb.
 cap. 4. atq; lib. 2. de Crisib⁹ cap. 5. prosequi-
 tur. Victus ratio in hac febre in vniuersum
 fit incisoria, ideòq; ad ea capita recurrendū
 erit, in quibus qualis sit ista victus species, à
 nobis in superioribus libris sæpe traditū est.
 Primis quidē diebus aluus clysteribus mol-

Victus
 ratio.

liētibus eluēda est. Dein oxymelite vtēdū & aliis quæ vrinā elicere possunt. Cōueniūt igitur decocta ex radice apii, oreoselini, iridis, fœniculi, & similibus antea sēpissime cōmemoratis, cū syrupis acido cōposito melle rosaceo, de duab⁹ radicib⁹, & aliis quib⁹ incidēdi & extenuādi facultas inest. Circa statū verò de vētriculo est habēda sollicitudo, p̄sertim de eius ore. Quare ante cibū hoc vēdū vngueto, quod R̄z olcorū mastichini, absinthini, nardini añ 3 ii s. mastiches, gariophyllorum, ligni aloēs añ 3 s. cinamomi 3i. cū cera quod satis est: fiat vnguentū, quo vētriculus inūgatur. Deinceps iubēdū est, vt egri à raphano & cibis assumptis vomāt. His etiā vtendū medicamētis, q̄ pituitā subducūt: qualia multa in p̄cedentibus libris cōmemorauimus. Hæc pro curatiōe febris quotidianæ, quæ rarò ad modum accidit, sufficiāt. Nam quæ hic desiderātur, in p̄cedentibus abūdē docuimus.

Vnguentum.

Vomitus

DE HECTICA FEBRE. CAP. X.

Hectica febris appellatur, quando calor p̄ter naturam nō solum in spiritibus & humoribus, sed iam in partibus etiā solidis cōsistit. Hectica verò dicitur, vel quòd firma ac fixa sit, ac difficulter soluatur, quemadmodū habitus: vel quoniam habitū corporis cōprehendat. Sic enim vocare cōsueuerunt, solidas partes humidis distinguentes. Hecticæ autē febres duplici modo generantur, primū ma-

Hectica quid.

Hectica cur dicitur.

Hectica habitus corporis.

Causa.

B

gna quidem ex parte ex ardētibus febribus,
 quæ tantum protrahuntur, vt longitudine tē-
 poris humorem in corpore cordis cōtentum
 absumant: vel fieri potest, vt eius adhuc ma-
 gna portio reſeruetur. illæ verò non tantum
 heſticae ſunt, ſed etiā *μαρασμώδης*, hoc eſt,
 tabida. Quæ autem manente adhuc humidi-
 tate generantur, vbi corpus cordis occupaue-
 rint, hinc maxime accēduntur, haud ſecus q̃
 lucernæ flāma ex ellychnio. Atque hæc vnā
 quidem febriū heſticarū generatio. reliqua
 eſt quum ſtatim inuaſerint, ſimilem primū
 ſui ortū diariis facientes, aut ex mœrore, aut
 ira, aut laſſitudine nimia, vnā cū ſolis feruo-
 re natae. Haſce igitur febres non eſt admodū
 difficile curare. At quæ ex ipsis in tabem mar-
 corūve, qui Græcis dicitur *μαρασμῶς*, ex in-
 ſcitia medicorū peruenerunt, vbi iam exqui-
 ſitè cōſiſtunt, & non adhuc incipiūt, haſ non
 modò curare difficile, imò etiam impoſſibi-
 le. Earū enim natura calida & ſicca eſt, vt ta-
 le aliquid patiatur cor, quale lucernæ funi-
 culus, quū plurimum peruſtus fuerit. Nā qui
 ita torrefactus eſt, frangi tur & diſſoluitur, at-
 que ex ariditate cōtinuitatē amittit, adeò vt
 etiā ſi copioſum oleum ſuperinfundas, flāma
 abundantior nō poſſit accēdi. ſemper enim
 parua & imbecilla ī ipſa palpitāt, ac cōtinuè
 fit minor, donec ex toto extingnatur. Talis
 quidē eſt febris, quæ omnino *μαρασμώδης*,
 hoc eſt tabida exiſtit. Heſtica verò, q̃ in ma-

*μαρασ-
μῶς.*

rasmū incidit, cognitu promptissima atq; facillima existit. nā priusquā pulsum atq; calorem tactu perpēdas, videbis oculos immodi signace concauos, veluti quibusdā quasi scrobibus recōditos, exhausta iam vniuersa in ipsis humida substātia, ita vt ossium quib⁹ palpebrę cohærēt eminētię conspiciātur. sordes quidē in ipsis aridæ apparēt, & quidā squalidus affect⁹, qualis maximè uest his qui toto die sub solis ardore iter longū per pulcrem fecerūt. Flos etiā ille vitalis perit, cutisq; in frōte arida distēsaque est. palpebrę frequenter veluti somnolentę conueniunt, verūm passio eorū somnus nō est, sed potius vigilandi impotentia. Cōtabuere quoque carnes quę in tēporibus sunt, vt collapsa videantur, & cōcaua loca. Quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? nam si denudatū ventrem inspexeris, neq; intestinū, neq; visc⁹ ullū superesse tibi videbitur. Hypochondria sursum ad thoracē conuelluntur. Quod si eos tāgere libear, cutis quidē apprimē arida est: quā si digitis apprehendens extenderis, instar corii cuiusdam consistit. rullus tenuis, durus, debilis, & frequēs. Caliditas quū primū man⁹ admouetur debilis est, paulò pōst acris & rodens erūpit: & magis, quū amplius tangendo immoraberis. maxima quoque erit hæc & minime anceps nota: adhibito cibo calor incēditur, pulsusq; magnitudine ac velocitate intē.

ditur. Tādiu autē hectica febris dicetur, quā diu nativa humiditas reseruatur. vbi verò ambigitur, ne nihil amplius humoris superfit, Curatio. absoluta iam tabes est. Hecticas verò febres priusquam ad tabem deueniāt, omni conatu refrigeramus. Sūma itaq; curationis in refrigerando ac humectando collocatur, tam his quæ extra admouētur, quā iis quæ intra sumuntur. Aër igitur inspiratus frigidus sit & humidus. Etsi natura talis nō sit, arte paretur, vt dictū est suprā cap. 6. de curatione tertianæ. Cibis vtēdum iisdem viribus præditis: ptisanæ nimirum cremore, pane modico in aqua frigida macerato: carnibus hœdi, phasianorum, volucrum montanarum, testiculis galorum, carnibus caponum, ouis sorbilib⁹, caseo recēti salis experte, piscib⁹ petrosis lactuca, intybis, cucurbita, spanachia, malua, & similibus. Cerasis, prunis, malis punicis, melonibus, ficubus, & eiusmodi lac etiam mirifice iis prodest, modo alia febris ab humorū putredine orta non cōplicetur. Quæ verò ad huius exquisitam exhibitionē sunt necessaria, vt alia multa huic instituto cōuenientia, tradit Galenus lib. 7. The. meth. Potus sit aqua frigida moderatē sumpta, aut decoctū cinnamomi, aut vinum aquosum, tenue. Cōuenit deniq; hecticis sæpius die cibū accipere, vt nimirū hac ratione caueant ne vna vice magnā ciborū copiam ingerant. Motū immodicū, & quicquid vires resolvere potest, deuitēt. Cæte-

rum medicamēta purgantia illis qui hectica febre laborāt non sunt propinanda. Sed si alius plus æquo adstricta fuerit, leuib. ac alteratib. clysteribus, adiecta casia fistulari, hanc abluere oportet. Intra corp^o exhibēda medicamēta refrigerātia ac humectātia: qualia inter cōposita hodie vsitata sunt, syrupi violaceus, de nymphæa, de intybo domestico, acetosus, & similes. Itē cōfectiones diarrhodōn abbatis, diatragacāthę frigide diapapaueris, similēsq;. Ex simplicibus succi lactucæ, portulacę, intybi & papaueris. Inter ea verò q̄ ex-
 trisecus admouētur, balnea huic morbo ob-
 noxiis quouis tēpore idonea sūt. balnea quidē aquarū dulcium, ad quæ sanè ægrotus in lectulo, aut sindone deportetur. Aquā verò tēperatissimā esse oportet: in qua etiam moderatē cōmorādū, ne scilicet quippiā ē propria humiditate hauriatur. tantū abest vt in ea sudare debeat. Sunt qui in aqua decoquendas herbas aliquot esse putent: violas nēpē, maluas, lactucas, flores nymphææ, & iis similes. Nōnulli itē pedes vitulinos, & capita agnina, quoad ossa carnib^o separētur. Cauendum etiā, ne perfundatur caput. Vbi itaq; satis iā in balneo cōmoratus fuerit, mox hinc educus, in frigidā semel tot^o tingatur, ne vel breuissimo quidē spatio illic moratus. Hectica siquidē febricitātes, qui ad balneū accedunt, Galeno li. i. o. The. meth. teste, nisi in frigidā

Balnea.

B iii

Linimen
tum.

Epithe-
mata.

sint dimissi, nihil iuuatur. Protinus autē ubi extractus fuerit, alter paratā habens sindonē ipsi iniciat, ac deinde aliā. tū in lectulo collocatus, primū spōgiis detergeatur, deinde mollibus linteis. nec cōmittēt qui eū detergebūt, vt violētius eū cōtrectēt, sed quoad fieri potest blādissimē. Quid multa? eā sanē curā, si fieri potest, oīnino in balnei vsu adhibeāt, quā Galen. loco iā citato requirit. Post hāc quidē oleis frigidis, & aliis humectādi facultate prāditis inūgēdus erit. Inter cētera verō hoc cōuenit, quod R̄ oleorū violacei ℥ s. de cucurbita 3 iiii. butyri recētis salis experti, pinguedinis porcine 3 i s. misce, fiat linimētū, vt vocāt. vel adiciātur muscositatis tragacāthæ 3 ii, medullę cruris vitulini 3 iiii. ceræ quod satis est, & fiat vnguentū. valet etiā oleū nymphae, de papauere, & rosaceū, quod Galeno lib. 3. de simp. med. facul. cap. 16. arētia corpora mirificē humectare potest. Vbi vnctus fuerit, tū vestib° amict° rursus super lectulo, aut sindone in locū ubi cibāt reducēt & nutriēt. Proderit etiā cor atq; iecur epithematis refrigerare & humectare: qualia sunt hęc quæ R̄ aquæ stillatitiæ violarū nymphae lactuce añ ℥ iiii. aceti optimi ℥ s. rosarū rub. santalorū omnium añ 3 i. specierū diamargaritōn 3 s. capthurę gr. iiii. croci 3 s. misce, fiat epithema, qđ cordi adhibeatur frigidū. Aliud quod R̄ aq̄ stillatitiæ, intybi domestici, rosarū añ ℥ iiii.

lacticae § ii. aceti § i. specierū diarhodōn ab-
 batis 3 i s. rasuræ eboris 3 s. caphuræ 3 s. misce
 fiat epithema, quod iecori admoveatur. Con-
 ferūt hecticis etiam medicamēta quæ odore
 suo refrigerāt & humectāt, ut sūt flores nym-
 phææ, caphura, violæ, rosæ, & similia. Plura
 etiā ad institutū faciētia reperiet studiosus in
 cap. de Phthisi seu tabe. Et certè in hectices
 curatione vnicè studēdū, ut corpus nō solum
 per ea quæ intra corpus sumūtur refrigerem⁹
 & humectemus: verū etiā per ea quæ extrinse-
 cūs admouētur, olei potissimū inunctionem.
 Quātū enim hoc ipsum foris adhibitum ad Pollio
 corporis ac viriū cōseruationē cōducatur, cele. Romul⁹.
 bri Pollionis Romuli exēplo docemur. Hūc
 enim centesimū iā annū excedentē, Plinio li.
 22. cap. 24. teste, quū Diuus Augustus hospes
 interrogaret, quānam ratione maxime vigo-
 rem illum animi corporisq; custodisset, ille
 respondit: Intus mulso, foris oleo. Hęc quidē
 ad rectè curandas febres sufficiunt. præclare
 enim officio nostro defunctos nos esse puta-
 mus, quòd methodum quā breuissimè po-
 tuimus indicauerimus. Remedia autem par-
 tissimè attigimus, quòd ea nullo labore me-
 dicinæ non prorsus rudes, ex superioribus li-
 bris tribus, si plura desiderāt, petere possint.

LIBRI QUARTI ET VLTIMI
 FINIS.

B iiii

HIPPOCRATIS COI DE ME-
DICAMENTIS PURGATORIIS
libellus, nunquam prius in lu-
cem editus.

I V N I O P A V L O C R A S S O I N -
T E R P R E T E .

*Cur medicamenta purgantia non teme-
re exhibenda.* Cap. 1.

M E D I C A M E N T O R U M P U R -
gantium opera non qualia censen-
tur existunt, ab eodem enim medi-
camento aliqui modò purgantur, modò non
purgantur. interdum & alia, quàm quæ con-
sueverit, educit interdum immodicè purgat,
nonnunquam & quæ oportet præstat. Quare
non potest quispiam hisce fretus medicamē-
tis, ea temere propinare: siquidē & cibi nos
alentes, medicamenta existimādi sunt: minus
tamen quàm antedicta. homines nanq; hisce
rectè vescentes, secunda valetudine fruuntur:
minus rectè, laborant: intēperanter, ceu sine
ris à medicamētis euacuantur. Igitur iam pa-
tet, & cibos ipsos esse purgātia medicamēta.
minus tamen, segniúsque, quàm sincera me-
dicamenta, ceterum his segniiores, nobisque
familiares, & quotidie in corpus intrantes, te-
merè ac negligēter exhibiti, homines pertur-
bant, in morbósque præcipitant: atque vt se-

mel dicam, qui incōsideratē cibos dederit, ni-
hil commodi, nihil opis est allaturus.

Quæ quibus medicamenta dāda. Cap. II.

Igitur ab initio biliosis, medicamentū bi-
lis purgatorium est propinandum: pituitosis
quod pituitā: hydropicis, quod aquam: me-
lancholicis, quod atram bilem educat. at si a-
lia ab iis purgas quæ purgare conuenit, non
purgas: quæ autem non conuenit, euacuabis.
quare vtrunque peccaueris.

Quæ præmittendæ interrogationes.

Cap. III.

Itaque aliquē aut suprà, aut infrà purga-
turus, cū prius interrogato, num aliās medi-
camentū purgatorium acceperit? num aluus
subducentibus medicamētis facilē soluatur,
velociterque obediat: aut cōtrā, adstricta sit,
ægrēque soluatur. Quod si facilem esse aluum,
lubricāque responderit, mollioribus mino-
ribusque medicamētis indigebit: sin aluus sic-
ca præclusa que sit, valentiora medicamenta
postulat. Idem præceptū & in vomitoriis me-
dicamentis obseruādum est. verum si neuti-
quam vomitoria subducētiāve medicamēta
sumpsisse se affirmauerit, tum demū scire o-
portet, quomodo sanitatis tempore se habue-
rit: num subducētibus facilis aluus patuerit,
num vomitoriis stomachus libenter morem
gesserit: num à crapula quapiam in alui pro-

fluuiū inciderit. omnia hæc sciscitari debes, vt recte ipsi possis consulere. Fœda est enim calamitas, eum, cui purgatoriā medicinam dederis, interficere.

Quibus morbis, quoue tempore exhibenda medicine purgatorie. Cap. IIII.

Vicunque sanè validis febribus corripuntur, his vsque ad febris remissionem purgatoria medicamēta ne dato, sin id nolis, saltem ne citra quartūdecimū diem: calidæ enim carnes ipsorum, & vētres, medicamentū retrahunt, nihilque purgatur. Tūc planè febris magis exardet, color permutatur auriginosique fiunt. agitata nāque bile, & nō detracta, neq; sorbere potest, neque bibere: sed auersatur omnia, & plerūque moritur. Cæterū si medicamentū vincit, ante meridiem nulla fit purgatio, à meridie fit immoderata deiectio, atque cōmoritur. quòd si diem hunc superstes sit, simulque cum purgatione febris tollatur, conualescit. Quamobrē purgatoria medicamenta in magnis febribus ne ore sumātur, præcipimus. at si ipsis opus fuerit, per clysteria iniicere, quoties volueris, expediet: id enim tutius erit. Hac itidem ratione, æstiuo tempore post canis ortum quinquaginta dierum spacio medicinam purgantem ne propinato, sed clysteriis vtor. idem nanque discrimen est.

Clysteres.

*Defensio medicine contra calumniatores.**Cap. V.*

Dicent autem aliqui, qui medicinam calumniātes artem esse negant, pridē multos non implorata mediciope ex morbis euasisse. Atqui ego istorum orationi fidem habeo, simul tam en fieri posse arbitror, ut quispiā nō viēs medico, ex medicina fructū percipiat: haud ita tamē, ut quid in ipsa rectum, quid non rectum sit, agnoscat. nam forte quadam ita sciplos curare possunt, ac si accitis medicis curati essent. Id verō præclarū indiciū est, medicinam nō solū artem, verumetiam eximiā esse artem: quādoquidem & ipsam funditus tollentes, per ipsam illā seruari videantur. Illud em̄ nouisse summa est necessitas, eos qui ex languoribus ad sanitatem restituti sunt, aliquid facientes aut nō facientes conualuisse. aut enim ieiunio, aut ciborū copia, aut largiore potu, aut siti, aut balneis, aut ab eis abstinentia, aut exercitationibus, aut ocio, aut somno, aut vigilia, aut omnibus his confusē vtētes, incolumes euasere. Atqui & ex auxiliū perceptione infuisse auxiliās, eos cognoscere necesse est: cōtrā ex noxa accepta, rē nocentē affuisse. nā quę iuuandi, quæ ladedi ingenio prædita sint, non cuiusq; est dinoscere. Itaq; si quid in ratioe victus, per quā sanat⁹ fuerit

Medicina eximiā ars.

HIPPOC. LIBELLVS

æger, laudare aut vitio dare cognouerit, omnia hæc medicinæ esse comperiet. Et mehercule offensiones non deterius, quàm adiuumenta, artem hanc esse testantur, iuuantia siquidem, recte administrata iuuerunt: nocentia imperitè adhibita nocuerunt. At vbi rectum, non rectumque, vtrunque modum habent, quomodo id artē esse negandum est? Illud nanque ego arte carere existimo, in quo nihil rectum est, neque non rectum: vbi autem vtrunque inest, quomodo id non artis opus, sed artis imperitiæ putandum est?

HIPPOCRATIS DE MEDICA-
MENTIS PURGATORIIS
FINIS.

RERVM HOC IN LIBRO MEMO-
RABILIVM PER CAPITA ET PA-
GINAS INDEX.

LIBRI PRIMI.

De Alopecia & Ophi- asi Cap.1.Pag.1.	De resolutione. 17.24
De dolore capitis. 2.3	De morbo comitiali. 18. 26
De dolore capitis ex ca- lore. 3.	De incubo. 19.29.
De dolore capitis ex fri- gore. 4.5	De melancholia. 20.30
De dolore capitis ex sic- citate. 5.6	De convulsione. 21.34
De dolore capitis ex ple- nitudine. 6.7	De tremore. 22.37
De dolore capitis ex bi- liosio humoribus. 7.9	De destillatione. 23.37
De dolore capitis ex pi- tuitosis humorib ⁹ . 8.10.	De lippitudine, siue o- phthalmia. 24.39
De cephalæa. 9.12	De suffusione. 25.41
De hemicrania. 10.13	De aurium dolore. 26.42
De vertigine. 11.15	De parotidibus. 27.44
De phrenitide. 12.16	De sanguinis ex naribus eruptione. 28.45
De lethargo. 13.20	De dolore dentiū. 29.47
De caro. 14.21	De aphthis. 30.49
De catocha & catalepsi. 15.22.	De fœtore oris. 31.50.
De apoplexia. 16.22	

LIBRI SECUNDI.

De columellæ inflamma- tione. 1.52
De angina. 2.52

INDEX

De tussi.	3.55	De lienteria.	9.90
De asthmate.	4.57	De dysenteria.	10.92
De pleuritide.	5.59	De tenesmo.	11.94
De peripneumonia.	6.60	De coli doloribus.	12.96
De cruento sputo.	7.61	De ileo.	13.99
De empyemate.	8.65	De lumbricis.	14.101
De tabe.	9.66	De hæmorrhoidibus se-	
De cordis palpitacione.		dis.	15.104
10.67		De pccidentia ani.	16.106
De syncope.	11.70	De rimis ani.	17.107
De lactis defectu.	12.72	De imbecillitate iocino-	
De lactis redūdātia.	13.73	ris.	18.107
De lacte in grumos con-		De obstructione iocino-	
uerfo.	14.74	ris.	19.110
De inflammatione mam-		De inflammatione ioci-	
marum.	15.75	noris.	20.112
		De ictero.	21.114
		De aqua iter cutē.	22.117
		De anasarca.	23.119
		De ascite.	24.121
		De tympanite.	25.122
		De intemperie lienis.	
		26.122	
		De lienis inflammatione.	
		27.124	
		De lienis obstructione.	
		28.126	
		De renib. cruentam urinā	
		excernentibus.	29.127
		De inflammatione renū-	

LIBRI TERTII.

De imbecillitate ven-	
tricoli.	1.76
De inflammatione ventri-	
culi.	2.78
De appetitu canino.	3.79
De bulimo.	4.81
De inflammatione ventri-	
culi.	5.82
De singultu.	6.84
De cholera.	7.85
De diarrhoea.	8.82

INDEX.

- 30.128
De calculo renum. 31.130
De renū vlceribus. 32.134
De diabere. 33.136
De vesicę calculo. 34.137
De sanguinis ex vesica eruptione, & grumis eiusdem. 35.138
De inflammatione vesicę. 36.140
De stillicidio vrinæ. 37.141.
De difficultate vrinæ. 38.142.
De suppressione vrinæ. 39.143.
De vlcerebus vesicę. 40.144.
De his qui re venera uti non possunt. 41.146
De feminis profluio. 42.147.
De exulceratione pudendi. 43.148
De ramice. 44.149
De suppressis mensibus. 45.151
De redundantibus mensibus. 46.154
De vteri suffocatione. 47.155.
De vteri procidentia. 48.157.
De mola. 49.159
De inflammatione vteri. 50.160
De sterilitate remouenda. 51.161
De difficili partu. 52.164
De ischiadicis. 53.167
De podagra & arthritide. 54.169.
LIBRI QVARTI
DE MEDENDIS
FEBRIBVS.
De diaria. 1.175
De diaria ex obstructione meatuum. 2.177
De synocho cum putredine. 3.179
De cōmūi, febribus. 4.181
De ardente febre. 5.183
De exquisita tertiana intermittente. 6.185
De tertiana notho. 7.188
De quartana. 8.190
De quotidiana. 9.192
De hectica febre. 10.193
FINIS.

